




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/2

1600 (2)
A


L XXXIII

ACQ LIBRA









42296

VALERII CORDI

Dispensatorium,

SIVE

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO;

Cum PETRI COVDENBERGII, &
MATTHIÆ LOBELII Scholiis, emen-
dationibus, & Auctariis.

Accessit hac editione, præter GVILIELMI
RONDELETTII de Theriac tractatum, emen-
datiorem; & FORMVLAS SELECTIONVM
PHARMACORVM, quorum post Val. Cordum
vltus passim receptus est, auctiores; alius FR.
DISSALDEI eiusdem argumenti Libellus.



LVGDVNI BATAVORVM,
Ex Officina IOANNIS MAIRE.
clo. lo. c. xxvii.

LECTORI.

Scias, benigne Lector, asteriscos sparsim in hoc
libello obuios, loca emendata, mutata, vel resti-
tuta denotare: Notis item his [] inclusa, illa-
strando contextui addita esse à P. Condenbergio,
& aliis.



3

Virtutum omni genere
Clarissimo viro,

D. GERARDO GRAMAIO,
Domino Vefaliae Comitiss,

ac Aërarii bellici Quæstori Statuum
dignissimo,

PETRVS COVDENBERGIVS S. P.

CVM VALERII CORDI de con-
ficiendis Pharmacis libellum Chri-
stophorus Plantinus prelo suo esset com-
missurus, rogavit me, ut, si quid haberem
quod editionem istam iuvare posset, cum
studiosis communicarem. Fuit enim opti-
mo viro semper propositum, ut quos libros
imprimit, non nisi emendatissime è sua
officina prodire sinat. Quamobrem, ut
le ipsius incredibili taceam diligentia &
sumptu; in omni disciplinarum genere
doctissimorum virorum opera utitur. Ego
però, etsi quæ iam olim in hunc Cordi li-
bellum (quem ego, quicquid dicat prefatio
anonyma, post obitum auctoris in lucem pro-
diisse, heredum vel amicorum curâ, certis
de causis persuasum habeo) annotaveram,

A 2

non

non essent apud me tanti momēti, ut ve
 semel de illorū editione cogitauerim; ta
 men nō potui nō homini mihi amicissimo
 & honesta petenti morem gerere. Quare
 vespertinas aliquot hac hieme horas; quā
 sola me quid scribere vel legere permitte
 bāt, libelli huius correctioni dedi; & ma
 ximo mendorum numero sublato, in suū
 quaque ordinem restitui; multis interim
 ipsius auctoris adiectis medicaminibus,
 quae haecenus hic fuerunt desiderata; ita
 ut operā me meā non malē posuisse cōfi
 dam: vbi à nonnullis haud immeritò no
 tatur, explicatē subiunctis id rationibus
 doceo; & nonnumquā ineptas quorundā
 reprehensiones refuto, quae solo nouitatis
 studiosine ullis rationibus vidētur innecta.
 Si quid autē à me erit omissū, copiosē &
 diligēter excutietur in magno meo huius
 farinae opere, quod fortasse aliquādo me
 dicis & pharmacopœis non minorem vo
 luptatē quā utilitatem adferet. Quòd
 verò illud nondū perficiā & publicē, ma
 ximas habeo & grauissimas consilii mei
 causas, tū quòd eorū fauore nō subleuer,
 quorum

uorū intererat curare ut tale quid dili-
genter præscriberetur; tū quod tēpora sint
iusmodi, ut plures fiāt alypta, quā ex-
erti Medici & Pharmacopœi. Qua de
e cū mecū cogito, nihil fero molestius,
uām gentis nostræ inscitiam; que cū
n aliis ferē rebus omnibus nulli sit natio-
i secunda, nusquam aequē peccat, quā
uod nostri ordinis hominib. sit iniquior.
Id verō pluribus verbis aperire non est
neceffe. Quis enim est vel mediocriter in
pharmacopoliis versatus, cui hoc non sit
notissimum? Magna spes erat præterea,
IOANNEM GOROPIVM BECANVM, non tã-
tū rei Medicæ, sed vniuersæ Philoso-
phia & antiquitatis peritissimum virū,
aliquid de Pharmaceutice scripturum.
quod utinam fecisset, Sed quia nunc om-
ni doctrina refertum opus, quod verē ve-
nerandæ antiquitatis planstrum quis ap-
pellet, præ manibus habet, nostris certē
rebus vacare non potest: ideoque nec hor-
tum, ut constituerat, colere. Id quidē ego
totis ferē viginti annis feci sedulo: & qui-
dem nūc maximis laboribus & impensis,

ad sexcenta exoticarum stirpium genera
in meo florere hortulo quotidie, etsi res
familiaris cum iactura & dispendio
maxima tamen cum voluptate cerno. Et
nisi cultor pauperis horti esset pauperior,
darem operā, ne quid mihi deesset, quo
nostra saltem tellus, licet summa cura,
ferre posset. Interea id quod possum ago,
quando quod volo non licet. Sperandum,
inquit Euripides, & ferendum. Ceterum,
ut ad institutum redeam, quæ in hoc
opusculo præstiti, illa tibi, Gerarde Gra-
maie, singularis omnium bonarum artium
patrone, dico dedicōque; partim ut obser-
vantiam erga te meam testificer, par-
tim ut hæc qualiacumque nominis tui
auctoritate munita, invidiam & calum-
nias tanto facilius ferant. Suscipies ergo
hæc, quæ tua est humanitas, benigno vul-
tu, quo Petrum Coudenbergium in tuā
iam pridem clientelam recepisti, & re-
ceptum constanter tueri pergis. Vale,
Mecenas optime. Ex officina nostra
pharmaceutica, Antuerpie, Kalend.
Martii clō. Io. LXVIII.

P. R. Æ.

PRÆFATIO
PRISCÆ EDITIONIS,
AD LECTOREM.

CUM Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratia Italiam periturus, obiter ad urbem nostram Norimbergam peruenisset, atque cum doctis quibusdam ac bonis viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque studiosè contraheret; inter cetera, quæ de bonis litteris atque re Medica, vtrò citroque inter eos familiariter, vt fieri solet, agitata sunt; mentio incidit Dispensatorii, quod ipse ex omni genere bonorum auctorum, cum veterum, tum recentium, de Pharmacorum omnium, quatenus in usu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumque constaret, illud iam antea in aliquot Saxoniae urbibus, præcipuis Medicis approbantibus, in usum publicum fuisse receptum, interimque tamen ab eo & locupletatū, & annotationibus eruditis magis atque magis illustratum; rogatus fuit à compluribus, vt illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etsi ad iuandam rem Medicam iam tum mirificè esset

A 4 accep-

accensus, pro sua tamen modestia atque prudentia, nonnihil subuerebatur, priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouendos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suum Senatui potius offert, tum demum in usum publicum assumendum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentia ac sollicitudine, officium illud Cordi perquam gratum habuit; librūque collegio Medicorū, Cordo præsentē, perlegendum & examinandum tradidit: vt si quid mutandū, adiiciendūve arbitraturi essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hactenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse; librum non solum in publicum edendum, verū etiam Pharmacopolis, vt eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de causa studiosius inuigilatum est, vt auctore interim in Italia, dum ad metam studiorum suorum quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius
exta-

PRAEFATIO.

extaret, quod ingenium eius & industriam
posteritati testaretur, eumque ab obliuio-
ne vindicaret.

Hoc igitur Valerii Cordi, candidissimi
& diligentissimi iuuenis monumentum
qualecunque, certè non pœnitendum,
studiose lector, obuiis vlnis amplectere: &
& si quid ex eo iuuaberis (iuuaberis au-
tem, nisi fallor, quàm plurimùm) am-
plissimo Norimbergensi Senatui, cuius li-
beralitate tibi cōmunicatur, gratias habe.
Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne
Auctorem mortuum inhumaniter calum-
niis impete: sed absolutiore opere in pu-
blicum edendo, illum vincere, & nomen
eius obscurare contende. Bene vale.

IOANNES POSTHIVS

D. MEDICVS GERMANVS.

*Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis,
Latus agens æui tempora verna sui,
Post obitum in multos transcripta fuere libellos;
Verùm his errores non tolerandi inerant:
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,
Miscendo fidâ pharmaca cuncta manu.
Dii tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,
Vt quod habes, ingens perficiatur opus.*

AS INDEX

INDEX SECTIONVM.

Pharmacopœum qualem virum esse deceat.
 Confectiones aromaticæ.
 Confectiones Opiatæ.
 Condita. Conseruæ.
 Syrupi. Rob. Lohoch.
 Lenitiua & Solutiua.
 Pilulæ. Trochisci.
 Olea. Vnguenta.
 Cerota. Emplastra.
 Præparationes quorundam simplicium.
 Ponderum ratio & notæ.
 Accesserunt Valerii Cordi De purgantium medica-
 mentorum extractione, ac Oleorum artificiosa
 distillatione (præter nonnulla pharmaca locis
 suis inserta) libellus.
 Epitaphium eiusdem Valerii Cordi.

APPENDICIS INDEX.

De Delectu, Collectione, Repositione, & Duratio-
 ne Simplicium, ex Iacobo Siluio.
 De Adulterationibus Simplicium medicamentorum
 cognoscendis, ex eodem Iacobo Siluio.
 Simplici aliquo absolutè scripto, quid accipien-
 dum, ex eodem Iac. Siluio.
 Diarium Pharmacorum parandorum, & simplicium
 legendorum, à Matthia Lobelio collectum.
 Nonnulla purgantia medicamenta composita,
 Matthiæ de Lobel.
 Succedanea, Quid pro Quo, vt vocât, ex Iac. Siluio.
 De Succedaneis, Lobelii, imitatione Rondeletii.
 Guilielmi Rondeletii de Theriaca tractatus, emen-
 datior & auctior.
 Formulæ Selectiorum Pharmacorum, post Cor-
 dum vſitatorum, auctiores.
 Pharmaconetes siue Pharmacitis Biblos, Fr. Dissaldei,
 Liber continens Pharmaca tam simplicia quàm
 composita, quæ in Officinis parata habere debent
 Pharmacopœi.

II
VALERII CORDI

SIMESVSII

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO.

*Qualem virum Pharmacopœum
esse deceat.*

MAGNUM præsidium humanæ imbecillitati in Medicina situm est, vt Homerus, omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa ποδὸν ἀντάξιον ἂν δῶν pronuntiasse videatur. Verùm huius laudis, vt nunc quidem Medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopœus sibi vindicat, cùm sit Medici quasi dextra manus; pericliteturque ipsius culpâ sæpè, non solùm ægri valetudo, verùm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama & existimatio; cùm ea quæ Medicus rectè præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vtitur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se

A 6

ant

aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopœum paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capessendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ non vulgariter tantum, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Namquum multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur; multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt; neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructus popularum ingeniorum, aut omnino,
aut

ut magna ex parte experts manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione
rerum minimè vulgari, aut protrita, earum
præsertim quæ propriè ad functionem eius
pertinent: cuiusmodi sunt Simplicia om-
nia, quorum descriptiones ex præstantissi-
mis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre
debet, donec exactam illorū cognitionem
hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò,
visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis
modis sæpe ac diligēter examinet, non so-
lūm vt falsa à veris, & adulterata à since-
ris; verū etiam vt præstantissima à me-
diocribus, & mediocria à degeneribus
discernere consuescat.

Est & alia causa cur tā diligenti examine
opus sit. quædā enim alioqui grata, & salu-
bria, ob insignē tamē acrimoniā in vasculis
æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu
tractata, tam tetrū ac horribile virus inde
cōtrahūt, vt gustu fiāt abomināda, & quā-
uis valenti vētriculo intolerabilia. Quare
hoc quoque scire debet, quo genere vascu-
lorū & instrumentorū, vnaquęque medici-
na sit coquenda, tractāda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa se-
quitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus,
semina, radices, debito tempore colligat,
& ritè reponat, ne vel parum efficacia sint,
vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem
omnem amittant.

A 7

Ha-

Habeat etiam ædes salubri loco fitas, ac variis reponendis conseruadisque accommodas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur: quam varietatē non quælibet domus præstare potest.

Facultates quoque saltem mediocres adsint oportet; in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & Medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam-optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque auarus, cauebit, ne cōpendii, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentiùs, quàm præstantissimas, paulo largiore cōparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coëmpitis & repositis, succedit industria compositarū ritè dispensandarum; vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligēdis, sed peritum Medicū consulat: quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiungat, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctū virum, vel Senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè præpa-

præparatam, debito ac præscripto tempore
fermentari sinat, antequàm eam in vsum
publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reii-
ciendis simplicibus atq. cõpositis, quàm in
hisdem reponendis & componendis. Debet
enim singulis mensibus, aut sæpius etiam,
omnia lustrare, & diligenter considerare, vt
corrupta, putrida, mucosa, exoleta, & quouis
modo inutilia, vel inefficacia reddita, reii-
ciat bona fide; nec in iis quærat suũ lucrũ,
quibus ægroto crearetur vitæ periculũ: sed
sit, vt diximus, animo liberali & magno;
cogitetq. parũ illud damnũ, fide sua iam
perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cùm indefessam diligentia
& animum sibi semper præsentem requi-
rant: hoc quoque obseruare conuenit,
ne sit alex aut similibus ludis deditus, ne
computationibus gaudeat, aut alioqui vi-
nosus, vel ebriosus, neque fœdis amori-
bus implicatus teneatur. Alea enim negli-
gentiam parit: ebrietas, errores, obliuio-
nem & stuporẽ inducit: turpis verò amor,
etiam veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit,
cui cum vxore rectè conueniat; liberosque
habeat, quos honestè educare studeat: hu-
iusmodi enim pignoribus obstrictus, va-
gas libidines detestabitur, neq. illis fomẽ-
ra sciens subministrabit: & posteritati suæ
consu-

cōsulens, bonam conscientiā seruare adnitetur; nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quodd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christū, charitas erga proximū, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si cūmquid per negligētiam in vitam aut valetudinem proximi peccaue- ro, iudiciū Dei non effugiā: quanto minū effugiam, si sciens ac prudens venenum de- dero, aborsum procurauero, aut aliquod aliud ingēs atque insigne flagitiū designa- uero? Et si humanitas eorū qui infirmos & ægrotos tantūm visitare solent, Christo adeò grata est, vt illud beneficiū in seipsum collatum esse affirmet; quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas rectè cōponere, tempestiuè ex- hibere: & non propter lucrum tantūm, verū etiam humanitatis respectu operam dare, vt melius habeant & conualescant?

Hęc & similia si cogitabit, vltro, ac sua spōte, erit humanus, placidus, affabilis, be- nignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos; nō enim in eorū ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac Deū omniū inspectore ac iudicē prę oculis habebit: qui rectè agē- ti longē maiora & beatiora præmia largie- tur, quā ab vlllo mortaliū persolui possint.

C O N-

CONFECTIONES

AROMATICÆ.

*

Aromaticum Garyophyllatum, descriptionis Mesuæ.

1. Garyophyllorum ʒ viij.
 Macis Zedoariæ Galangæ
 Cinnamoni Ligni Aloës Spicæ Indicæ
 Piperis longi Cardam. minoris ana ʒ j. *
 Rosarum ʒ iiij. Glycyrrhizæ rasæ
 Galliæ moschatae veræ ana ʒ ij.
 Folii [Sumatur eius loco Castalignea vera, aut
 duplex pondus Cinnamomi.]
 Cubebæ ana ʒ ij. Ambra ʒ j. *
 Moschi ʒ β. Sacchari optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

IN confectiõibus aromaticis ad saccharilibram unam, pendentem ʒ xij. accipiat ʒ j. specierum. *

MYROPOLE accipiant in confectiõibus libram continentem ʒ xij. & secundum hanc diuidantur *
 uncia, dragma & scrupuli. Scrupulus verò pendat grana electa xx. Nicolao præsertim.

GALANGÆ, id est, minoris Galangæ &
 rusa, saporis aromatici: nam assertur hodie noua
 que

quedam Galanga, magna crassa, foris subrufa, intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima, sine aromatica aliqua gratia: hac in nullas confectiones Galanga nomine inicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

A **SANTALVM** Machoziri, est species citrini Santali, odoratissima, & valde aromatica, tam gustu, quam odore: & affertur ad nos cum Santalo albo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam hodie usitato nomine Liquiritiam appellant.

B **FOLIUM** nondum allatum est ad nos in Germaniam; quare cum eo careamus, necesse est eius loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut Cassia lignea vera. Cum autem hac confectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folii vice Cassiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci appellatione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudenbergii Scholia.

A Santalum Machoz. est species, &c.] Santali citrini duas reperiri species, cum Cordum dicere Franciscus Alexander in suo Apolline miretur, nos easdem quoque iisdem aceruis à Lusitanis Antuerpiam aduectas interdum observauimus. Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem accedente, ignaris quandoque impositur) inter vulgarem optimam, ex pallido rufescentem, odoratam ac aromaticam: Alteram verò prorsus luteam,

team, aut quasi croco tinctam, odoratissimam,
 & valde aromaticam tam gustu quam odore,
 ut & Cordus ait; atque insuper unguinosam,
 sed eam admodum raram. De hac itaque specie
 cum Cordum hic locutum esse existimem: non ea
 propter tamen id ipsum quartum Santalum dici
 debere putamus, ut Franciscus sinistrè colligit:
 haud secus atque nigri Piperis species plures cum
 sint, magnitudine, duritie, pondere atque acre-
 dine differentes, illorum aliquod quartum Piper
 esse dici non possit. Ceterum de Santalis plura, ea-
 que magis indubitata, quam à quoquam hactenus
 scriptitatum est, qui cupit, Garcia ab Horto de
 Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusi-
 tanico in Latinam linguam à Carolo Clusio con-
 uersum, consulat.

Folium.] Foliū tribus nervis distinctū, lauri- B
 no simile, quod Folii Indi nomine in officinis passim
 prostat, Folii in medicamentis locum non incom-
 modè obtinere possit, dum genuinum adferatur,
 haberi què abundè queat. De hoc quoque pluribus
 Garcia libellus.

VENTRICULVM & cor cōfortat: nauscam
 & vomitum sedat; & valet contra putre-
 factionem in partibus ventriculi. Mem-
 bra verò nutritionis calefacit, ac ventosi-
 tates dissolvit & carminat.

Aromaticum Rosatum Gabrielis,
descript. Mesue.

R. Rosarum rubrarum 3 xv.

Gly-

20 CONFECTIONES

Glycyrrhizæ rasæ 3 vij.
 Ligni Aloës Sātali Machoziri ana 3 iij.
 Cinnamomi electi 3 v.
 Macis Garyophyllorum ana 3 ij. β.
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ ana 3 ij. 3 ij.
 Nucis moschatæ Cardamomi
 Galangæ ana 3 j.
 Spicæ Indicæ Ambræ griseæ ana 3 ij.
 Moschi 3 j. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam
 cum simpliciter Cardamomum scribunt auctores,
 minus Cardamomum, id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur cor-
 rupto vocabulo, Musci; pus illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque
 nutritioni deseruiantibus instrumentis
 succurrit. Ventriculi humiditatem, om-
 nemque in eo putredinem emendat: con-
 coctionem iuuat; & ex morbo conua-
 lescentibus auxiliatur.

Dianisum D. Mesua.

℞. Anisi electi 3 xx.
 Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana 3 j.
 Carei [i. Carui] Macis Galangæ Fœniculi
 Zingiberis Cinnamomi ana 3 v.
 Macropiperis Melanopiperis Leucopip.
 Calaminthæ Pyrethri
 Casiæ lignæ veræ ana 3 ij.
 * Cardamomi minoris Garyophyllorum
 Cubæ

Cubebærum Spicæ Indicæ
Croci ana ʒ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur,
Masticis.

CASIA lignea vera debet accipi, quæ nuper
cepit afferri; figura Cinnamomi, gustu aliquan-
tulum lubrica, & Cinnamomi emula: at non ille
parvus cortex saporis insipidi ac styptici, ut hacte-
nus factum est.

CRASSIUS flatibus in ventriculo natis,
eiusdemque perfriktioni succurrit. Pitui-
tam in eo crudam absomit; tussi que diu-
turnæ potest.

Diambra D. Mesue.

R. Cinnamomi Doronici
Garyophyllorū Macis Nucis Moschatæ
Folii [aut succedanei eius] Galangæ ana ʒ iij.
Spicæ Indicæ Cardamomi maioris
Cardamomi minoris ana ʒ j.
Zingiberis ʒ j. β.
Santali citrini Ligni Aloës
Piperis longi ana ʒ ij. Ambra ʒ j.
Moschi ʒ β. Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecilli-
tatem efficax est; omnemque corporis per-
friktionem discutit: nativum suscitatur ca-
lorem, & rediuvium recreat; resarcitque
eos qui frigido torquentur humore. Iuvat
articulos, & membris omnibus miri-
ficè

ficè subuenit. Venterculum fastidientem,
quique cibum continere non potest, robo-
rat: & inappetentiam cibi summè corri-
git. Cor ipsum roborat.

A *Diathamaron D. Nicolai.*

R. Anthophyllum

Zingiberis ana 3 v. 3 j. 3 xvj.

Cinnamomi

Garyophyll. ana 3 iiij. 3 j. 3 iiij.

Carnium dactylorum 3 iiij. 3. 3 viij.

* Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri Coralli rubri

B Rheupontici [accipiatur eius panuria Rha-

* barbarum sic vocatum]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardii

Ossium dactylorū Carpobalsami Anisi

* Baccarum Iuniperi ana 3 ij. 3 ij. 3 viij.

Leucopiperis

* Macropiperis ana 3 j. 3 j. 3 ij.

Limaturæ auri puri

Limaturæ argenti meri

* Ossium è corde cerui ana 3 ij. 3. 3 vj.

Rasuræ Eboris Moschi ana 3 j. 3. 3 vij.

Ambra 3 j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma ar-
boris fructum significat; unde confectio nomen

* Diathamaron: corruptè Diacamaron.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Garyo-
phylli, qui ad maturitatem perueniunt, nucleo
intus

ius duro bifidoque; sapore non tam acris ut Garyophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grana, qui teterimum & rancidum saporem habet, adulterinus est, atque ex Helueticorum alpibus Italia ad nos affertur.

CARPOBALSAMI. Non habentur opobalsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum, secundum eorum veram descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quod olea Cinnamonomi & Garyophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in nobis Balsami veri, & virtutibus similia sint, quare etiam pro Opobalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus: non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Caryophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nulum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saluince Eleliphacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATURA auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec
æqua-

aqualiter confectionibus commiscetur : quare h
 & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

P. C. SCHOL.

A Pondera apud Cordum hacce in compositione
 deprauatissima restitui : sed non veluti L. Euch
 sius ex suo Myrepso vult, hocce in medicamento
 innumeris quæ aliis corruptissimo.

B Corallium album, quod à Cordo perperam
 appositum erat, deleui.

EFFICACITER prodest difficulte
 spirantibus, arteriacis, tussientibus, ta
 bidis & omni thoracis & stomachi offen
 se : Aquæ subter cutem fusæ, renun
 doloribus. Voluptatem parit, corpora quo
 saginat.

Diacalaminthon D. Mesue.

℞. Calaminthæ montanæ

Calaminthæ campestris Sefelios

Petroselini Macedonici ana 3 vj.

Zingiberis 3 iij.

Seminis Apii

Comarum Thymi ana 3 ij.

Ligustici 3 vj.

Piperis 3 xij. Sacchari albiissimi

CALAMINTHA montana nascitur copio

sissime in montibus circa Confluentiam urbem

ad Rheni & Mosella confluentes.

CAL

CALAMINTHA campestris, hoc est, usualis Calamintha, que in aruis nascitur (Mesue fluuiatilem requirit:) hac enim efficacior est, quam in humidis locis nata. Germanice Koramynthz vocatur.

SESELIOS, id est Sifelios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum non est Olusatrum, vel, ut corruptè pronuntiant, Olixatrum, aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac Myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semen accipere (quod vulgò in Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falsò tamen, appellatur;) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, Piperis nigri: nam cum Piper simpliciter pronunciamus, semper nigrum intelligimus.

AUXILIATVR iis quos cibi fastidiũ urget, appetentiam reuocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento, confert.

Diacalaminthon Galeni, Sanitatis
tuende lib. 4.

℞. Calaminthæ	Pulegii	Petroselini
Seselios	ana ʒ j.	
	B	Apri

26 CONFECTIOES

Apii Cacuminum Thymi ana ℥ ij.
 Ligustici seminis ℥ viij.
 Piperis ℥ xxiiij. Sacchari.

CRASSA ac lenta attenuat & discuti-
 tit: vrinas mouet, ac mulieribus menses.

Diacuminum D. Nicolai.

℞. Cumini præparati [*id est, pridie in aceto
 infusi, & iterum exiccati*] ℥ viij.
 (*id est, ℥ j.*) ℥ j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana ℥ ij. β.
 Melanopiperis
 Zingiberis ana ℥ ij. ḡ v.
 Galangæ
 Thymbræ [*eius loco sume Satureiam*]
 Calaminthæ ana ℥ j. ℥ ij.
 Ammios
 Ligustici ana ℥ j. ḡ xviiij.
 Macropiperis ℥ j.
 Spicæ Indicæ Cardamomi
 Nucis Moschatæ ana ℥ ij. β.
 Sacchari.

THYMBRA est propriè Satureia silue-
 stris, circa quam nascitur Cuscuta Epithymo-
 similis, quæ Epithymum appellatur. Affer-
 tur iam ad nos ex Orientalibus partibus; ve-
 rum raro: ideòque in defectu eius satiuam
 Thymbram, hoc est, Satureiam accipere no-
 bis licet.

P. C.

AROMATICAE.

27

P. C. SCHOL.

Ana ʒ ij. β.] *Cacutit Fuchsus*, ʒ iij. ʒ ij.
ex Pseudomyrsino suo legendum existimans.

ARTERIACIS, difficultati spirandi,
 tussiculosis, inflationibus efficaci est adiu-
 mento. Noxam ventriculi corrigit, conco-
 ctionem iuuat, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomum Mesua.

R. Cinnamomi tenuis	ʒ xv.	A
Cinnamomi crassi boni		
Enulæ ana	ʒ iij.	B
Galangæ	ʒ vij.	
Garyophyllorum	Piperis longi	
Cardamomi maioris	Cardamomi mi-	
Zingiberis	Macis	(noris
Nucis moschatae		
Ligni Aloës ana	ʒ ij.	Croci ʒ j. *
Sacchari tabarzeth	ʒ v.	
Sacchari albiissimi.		

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi
 atque optimi Sacchari, cuius ʒ v. miscentur
 speciebus: idq; ideò hoc loco accipitur, ut spe-
 cies eò melius conseruentur ad usum. Vltimum
 Saccharum additur, cum vis rotulas facere
 ex speciebus.

P. C. SCHOL.

Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi.] A
 Per Darseni, vel potiùs Darchini, lignum Chi-
 nense, seu lignum odoratum, hoc est, China-
 momum, B 2

momum, tanquam Chinaamomum, siue Cinnamomum intelligunt Persæ atque scriptores Arabes; cortices quandoque ligna appellantes, ut *Xylocinamomum* Greci. Quod interim crassi corticis est, *Cinnamum* vocant. Per *Darseni Cinami* igitur, *Cinnamomum* crassi corticis, tanquam ligneum significare volunt: est enim & in genere crassioris Cinamomi, quod & valde bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum. Nec caret hac *Mesue mens*, ubi crassum Cinamomum requirit, suis rationibus: quas perpendat *Francisci Alexandri Apollo* oportet. Itaque *Cinnamomum* tenuis corticis electum, per se, aquè atque per *Darseni Cinami*, crassi corticis Cinamomum bonum, distinctum cum *Cordo* hîc interpretandum, intelligendum atque legendum existimo: utrumque tanquam in suo genere optimum. De *Cinnamomo* autem & *Casia*, *Garcia de Aromatibus* librum quem dixi, consule: ubi doctissimorum etiam hætenus virorum de hisce rebus altercationes, aniles, prorsusque futiles esse animadvertes.

B *Cyminum*, à *Cordo* huic medicamento temerè impositum, hortante & id quoque *Fuchsio*, *Monachis* id prius monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humorositatem ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma digerit, & digestionem adiuuat.

Dian-

Dianthos D. Nicolai.

℞. Florum Rorismarini ʒ j.
 Violarum Rosarum
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ
 Nucis moschatae
 Galangæ Cinnamomi
 Zingiberis Zedoariæ
 Macis Ligni Aloës
 Cardamomi Anisi
 Anethi [videlicet seminis] ana ʒ iiij.
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribulatis, cardiacis: animi lætitiā auget. Eos roborat qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt. Venterculum perpulchrè emendat.

Diamargariton frigidum
D. Nicolai.

℞. Nucleorum sem. Citrulli
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris
 Seminis Portulacæ
 Papaveris albi
 Santali albi
 Santali moschatellini [id est, Citrini, boni
 odoris]
 Ligni Aloës Zingiberis
 B 3 Rosa-

Rosarum rubrarum

Florum Nymphaeae albae [id est, Nenupharis]

Florum Boraginis

Myrtillorum verorum ana 3 j.

Corallii albi

Corallii rubri ana 3 ʒ-

Margaritarum 3 iiij.

Sacchari.

NVCLEVS *feminum*, est ipsa in medio *feminum* medulla. Sunt autem eximendi horum *feminum* nuclei, cum iam preparanda est *confectio* haec, aut alia, quae durare debent: nam diu ante exempti rancidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat: iis quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxae causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

Diamargariton calidum

D. Avicennae.

Rx. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana 3 j. Zingiberis

A Mastiches ana 3 iiij.

B Zedoariae Doronici

* Seminis Apii Casia

Carda-

AROMATICAE.

31

Cardamomi Nucis moschatae

C

Macis Cinnami ana 3 ij.

*

Been albi Been rubei

D

Piperis

*

Macropiperis ana 3 iij.

Cinnamomi 3 v.

Sacchari.

P. C. SCHOL.

Zedoariae.] *Auicenna exemplaria editionis penultima, Zurumbet; postrema autem, à Valgrisio inquam exhibita, Zedoaria legunt, ut hinc vocum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur) tibi expendendam nunc relinquam.*

Doronici.] *L. Fuchsius Doronicum hinc expungit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissime etiam recipiunt.*

Cassia.] *Cum Cordus huius loco rad. Cassia pessime haberet, correctiora Auicenna exemplaria Seitaragi legunt, nonnulla Capsia, quod non nisi Cassia est. Nam ineptiores Itali etiam Cassiam addita p ante Capsiam scribere solent. Seitaragi autem cum plura significata habeat, littera unius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoque Lepidium designat, quandoque Cassiam: quam hic intelligendam, commodissimeque indendam dico. Quare Francisci Alexandri Apollinis stupidam pertinaciam,*

B 4

Fuchsius

Fuchsio etiam mihi astipulante, demiror, Tapsiam hinc (medicamento huic adeo iniquam) sumendam esse mordicus defendentis. Interim non tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox accedere qui potuerit, forsitan exclamabitur: verum Lacones habeo hic mihi imperantes.

D Cinnami.] *Hac voce Cordus carebat aequè atque Been albi. In Anicenna Cherse legitur, quod Cinnamum interpretantur.*

VALET mulieribus: rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum earum.

Diamoschum dulce, D. Mesue.

℞. Croci	Doronici
Zedoariæ	Ligni Aloës
Macis	ana 3 ij.
* Margaritarum albarum	Serici crudi tosti
Charabæ [<i>id est, Succini</i>]	
* Corallii rubri	ana 3 ij. β.
Galliæ moschatæ veræ	
* Ocimi citrati	ana 3 j. β.
Been albi	Been rubri
Folii [<i>aut succedanei eius</i>]	Spicæ Indicæ.
Garyophyllorum	ana 3 j.
Zingiberis	Cubebæ
Piperis longi	ana 3 j. β.
Moschi	3 ij.
Sacchari albi.	

O C I.

AROMATICAE. 33

OCIMUM citratum non est Melissa, sed species quadam Ocimi siue Basilici, odore Melisse aut Citrei mali: cuius defectu, garyophyllatum Ocimum sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitacionem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item iis qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

Diamoschum amarum, D. Mesue.

℞. Croci	Doronici			
Zedoariæ	Ligni Aloës			
Macis	ana	ʒ	ij.	*
Margaritarum albarum				
Serici crudi tosti	Charabæ			A
Corallii rubri	ana	ʒ	ij. β.	*
Galliæ moschataæ veræ				
Ocimi citrati	ana	ʒ	j. β.	
Been albi	Been rubri			
Folii [aut succedanei eius]				
Spicæ Indicæ				
Garyophyllorum	ana	ʒ	j.	
Zingiberis	Cubebæ			
Piperis longi	ana	ʒ	j. β.	
Moschi	ʒ	ij.		
Abfinthii				
Rosarum	ana	ʒ	iiij.	*
Aloës lotæ	ʒ	iiij.		*
	B	s	Casto.	

Castorei

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. β.

Sacchari.

- * SERICVM crudum tostum significat Sericea bombycis vellus, nullo colore tinctum, nullius humoris aut succo qui tingendo sit, incoctum; sed tale quale natura est, fictilique inditum, ac donec conteri possit tostum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum; quamvis comburi non debeat, sed torreri aut assari tantum.

P. C. SCHOL.

- A Setam pro Serico Cordus undique barbarè legebat.

Hæc confectio valentior est ad ea quæ suprâ dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

Diagalanga D. Mesue.

A R. Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ vj.

Garyphyllorum Macis

Ligustici ana ʒ ij.

Zingiberis Macropiperis

Leucopiperis Calami aromatici

Cinnamomi ana ʒ j. β.

Calaminthæ siccæ Menthæ siccæ

Carda.

Cardamomi maioris

Spicæ Indicæ Seminis Apii

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Seminis Carui ana ʒ j.

Sacchari albiſſimi.

P. C. S C H O L.

ʒ vj.] *Legendum eſſe ʒ vj. Euchſius rectè
monet, non ʒ viij ut Cordus malè habebat.*

V A L E T aduerſus craſſiores flatus, aci-
dos ruſus, prauamque concoctionem:
item actiones ventriculi & iecoris à frigi-
ditate impeditas, robuſtiores reddit, eaſ-
demque emendat.

Diapenidion D. Nicolai.

R. Penidiarum ʒ ij.

Pinearum

Amygdalorum dulcium

Papaueris albi ana ʒ iij. ʒ j.

Cinnamomi

Garyophyllorum

Zingiberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ Gummi Arabici

Amyli candidiſſimi

Seminis enucleati Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Melonis ana ʒ j. ʒ iij.

Camphoræ ʒ ʒ.

B 6

Sacchari

Sacchari albiſſimi.

AMYLUM *hodie corrupto vocabulo dicitur Amydum.*

P. C. SCHOL.

A *Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perperam addiderat.*

VALET aduerſus omnem thoracis noxam, tuſſim à frigore contractam, vocis iacturam: tabidis denique & purulenta exſcreantibus ſuccurrit.

Diiris ſimplex.

R. Ireos ℥ β. Sacchari candi
Specierum diatragacanthi frigidi ana ℥ ij.
Sacchari albiſſimi.

* POTEST ferè eadem quod ſequens, licet imbecillius.

Diiris Salomonis, ex Nicotao.

R. Iridis ℥ j.
Pulegii Hyſſopi
Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
* Tragachanthæ
Amygdalorum Pinearum
Cinnamomi Zingiberis
Piperis ana ℥ iiij.
Caricarum Paſſularum enucleatarum
Car-

Carnium dactylorum ana ʒ iij. β.
 Styracis calamitæ rubæ | *potius rufa, legit*
 p. 6.] ʒ ij. ʒ j.

Sacchari albissimi.

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxi-
 liatur: abscissæ vocis iacturam refarcit,
 quæ refrigeratione contracta sit.

Diatrágacanthum frigidum,
D. Nicolai.

R. Tragacanthæ albissimæ ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.

Amyli ʒ β.

Glycyrrhizæ

Nucleorum seminum Cucurbitæ

Cucumeris

Citrulli

Melonis ana ʒ ij.

Camphoræ ʒ β.

Penidiarum ʒ iij.

Sacchari albissimi.

Medetur omnibus pulmonum & tho-
 racis vitiis aridis, maximè tabidis, macie
 confectis: Inflammatione lateris laboran-
 tibus, omnibusque tussibus calidis & sic-
 cis, exasperationi linguæ & faucium.
 Deuoratum tamdiu ægrotans in ore con-
 tineat, quoad liquefactum perfectè exu-
 gatur.

B 7

Dia-

*Diatragacanthum calidum**D. Nicolai.*

- * ℞. Gummi Tragacanthæ ʒ iiij.
 * Hyssopi Pineorum nucleorum
 Amygdalorum amborum purgatorum
 Seminis Lini ana ʒ vj. Sem. Fœnigræci
 Cinnamomi ana ʒ β.
 Glycyrrhizæ rasæ Succī Glycyrrhizę
 Zingiberis ana ʒ ij.
 Sacchari albi.

Valet ruffientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eiicere; asthmaticis, empyicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumoniciis, phthificis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

- ℞. Sacchari claresfacti ℥ j.
 Aquæ Rosarum ℥ β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni evanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur. In fine margaritarum minutissimè tritarum ʒ β. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

*Quantis cachinnis Cordus, & tanquam
 caci*

raci caco duce Fuchf. Colonienſes medici, ac
 Franciſci Alex. Apollo, vel pueris Pharmaco-
 pœorum, hoc ſcripto ſeſe deridendos exhibue-
 rint, vix exprimi poſſit: ut hinc non tractari à
 fabris fabrilis, lucidè cerni queat. Eo pacto
 quòd huiusmodi imaginariis, extraq; arcam
 Medicorum quorundam ſcriptionibus, nullam
 debitam miſcendi conficiendiq; rationem, ut ne-
 que modum; & ex conſequenti parum aut ni-
 hil artis ſua frugis, operisq; manuarii commo-
 di, haurire diſceréve poſſint Pharmacopœi: nî
 margaritas, oleum & operam omnem frequen-
 tiſſimè perdere, ac vitiatas materias porcis
 obicere velint.

MEDETVR deiectis viribus, arden-
 tibus febribus; & imaginationes falſas
 abolet.

Diaphyſſopum D. Nicolai.

R̄. Hyſſopi Ireos Thymi
 Melanopiperis ana ʒ xxx.
 Pulegii
 Thymbræ [eius loco ſume Satureiam]
 Rutæ Cumini ana ʒ xx.
 Carnium dactylorum
 Tragacanthæ Glycyrrhizę
 Caricarum pinguium Paſſularum enu-
 cleatarum
 Fœniculi ana ʒ x.
 Zingiberis Sem. Aniſi
 Carui

Carui

Ligustici ana ʒ v.

Sacchari.

Accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: vnam exiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat; digestionem procurat; pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Diacostum D. Mesue.

℞. Costi candidi, aromatici, amari
Cassie lignee veræ Cinnamomi ana ʒ v.
Seminis Apii Seminis Anisi
Schoenanthi
Rhabarbari ana ʒ iij.
Asari ʒ iij.
Crocii Aristolochie
Myrrhæ ana ʒ ij.
Sacchari.

SCHOENANTHI. Hodie corrupto nomine dicunt Squinantium.

COSTI AMARI. Cœpit hisce annis afferri loco veri Costi adulterinus quidam: qui nequaquam accipiendus est, ut supra dictum est, sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicum eius. sola enim radices ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorē viscerum & oppilationem in eis, & ad principium hydropisis.

Dia-

*Diarhodon Abbatis,
ex Nicolao.*

2. Santali albi
 Santali rubri ana ʒ ij. β.
 Tragacanthæ
 Gummi Arabici
 podii ana ʒ ij.
 fari Mastiches
 piceæ Indicæ Cardamomi
 ucci Glycyrrhizæ Croci
 xyloaloes [*id est, Ligni Aloës*]
 Garyophyllorum
 Gallie moschatæ Nicolai *
 Anisi Fœniculi
 Cinnamomi Rhabarbari
 Seminis Ocimi
 Berberis [*id est, acinorum eius*] A
 Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ B
 Nucleorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis
 Seminis Papaveris albi ana ʒ j.
 Margaritarum
 Ossis è corde cerui ana ʒ β.
 Sacchari Candi [*ut eò melius species conser-*
uentur]
 Rosarum ana ʒ j. ʒ iiij.
 Camphoræ ʒ vij.
 Moschi ʒ iiij. β.
 Sacchari albißimi.

SCA-

B SCARIOLA proprie est Endiuia illa vulgaris, qua in dorso foliorum est spinosa. Quid autem vera sit Endiuia, ubi locus postulauerit, dicemus.

P. C. SCHOL.

A Berberis.] acini sunt hic fructus Berberis integri.

B Scariola.] Cordum non nouisse Scariolam, hoc nomine vulgarem admodum plantam, monente & id Francisco Alex. satis liquet; ex eo quod in Foliorum dorso eam spinosam faciat, ut Senchum pra oculis habuisse videatur.

VALET aduersus ventriculi calorem, iecinoris, lienis, pulmonumque: contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Dialacca maior, D. Mesua.

℞. Laccæ præparatæ [eius præparatio in fine habebitur]

Rhabarbari ana ʒ iiij.

Spicæ Indicæ

Mastiches Apii

Coliculorum Schœnanthi Absinthii

Succi Eupatorii Mesuæ

Ammios Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi Myrthæ

Rubiæ tinctorum Fœniculi

Anisi

Anisi Asari
 Aristolochiæ rotundæ veræ
 Gentianæ Croci
 Cinnamomi Hyssopi
 Casie lignæ veræ Summitatū Schoenanthi
 Bdellii ana ʒ j. β.
 Piperis
 Lingiberis ana ʒ j.
 Sacchari albiſſimi.

A

COLICVLO RV M Schoenanthi.] *Herba*
aromatica à Græcis dicitur Σχοίνον, id
est, Schœnus, & significat Iuncum aromati-
um, qui hætenus improprie dictus est Squinan-
thum. Nam Schœnanthum siue Σχοίνον ἄνθος,
significat Iunci huius aromatici florem, qui
non affertur ad nos. In hanc autem compositio-
nem ingreditur bis Schœnanthum; hoc quidem
loco coliculi aut stipites eius, inferius verò
summitates eiusdem.

SUMMITATVM Schoenanthi, id est,
 florum eius: nam flores in summitate huius
 herba constituti sunt, & proprie Schœnan-
 thum appellantur: sed quia flores non ad nos
 feruntur, cogimur tenerrimas eius partes in
 cacumine decerptas, eorum vice medicamentis
 miscere.

SVCCVS Eupatorii.] *Hic succus non debet* B
fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupato-
rio Græcorum, id est, Agrimonia falsò hodie
vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue descri-
bit. Est autem Eupatorium Mesue ea herba,
qua

qua ab Italis dicitur Gratia Dei, siue Gratiola; cuius magnus est prouentus Wittemberga in pratis ad Albim fluvium sitis.

P. C. SCHOL.

A *Aristolochiam longam, erroneè in contextum à Cordo intrusam, deleni.*

B *Succi Eupatorii.] Gratiola vocata, purgatoria herba, foliis Hyssopi, Eupatorium Mesua haud dubio, ut & L. Fuchsius, Matthiolus, ac Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest. Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod & hodie Eupatorii Mesues nomen obtinuit, in eius locum substituere, donec melius doceatur.*

VALET aduersus frigus ventriculi: obstructions. inflationes iecinoris, & renum duritias sanat. aquæ inter cutem causas omnes discutit. menses ciet: flatuosos spiritus ab alto corpore abigit.

Diacurcuma, id est, Δία Κεράς maior, D. Mesua.

R. Croci		Asari
Petroselini Macedonici		
Dauci		Anisi
Apii	ana 3	iiij.
Rhabarbari		Meu
Spicæ Indicæ	ana 3	vj.
Costi	Myrrhæ	
		Cassia

Cassiæ lignæ veræ Schœnanthi
 Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut
 superius significatum est*]
 Cubiæ tinctorum
 Uccii Absinthii
 Uccii Eupatorii Mesuæ [*i. Gratiola*]
 Opobalsami [*aut aliquod succedaneum, siue
 oleum Garyophyllorum, aut aliud crassum
 odoriferum oleum*] ana ʒ ij.
 Calami aromatici
 Cinnamomi ana ʒ i. β.
 Cardii [*videlicet veri*]
 Colopendriæ [*Ceterach intellige*]
 Uccii Glycyrrhizæ ana ʒ ij. β.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Sacchari albissimi.

Confert ad ægrotudines antiquas, & ca-
 chexiam: & ad hydropisim iuuamentum
 est manifestum, & eradicat ægrotudines
 hepatis & lienis chronicas, quæ iam in-
 duratæ sunt: & confert ad corruptio-
 nem stomachi, & humiditatem frigi-
 dam, & ventositates grossas in eis, &
 ad dolorem renum & vesicæ; & urinam
 prouocat.

Diaprasium D. Nicolai.

Prassii ʒ v. β.
 Tragacanthæ Pinearum mundatarum
 Amygdalorum dulcium
 Pista-

Pistaciorum Carnium dactylorum
 Caricarum pinguium
 Passularum enucleatarum ana ʒ iiij. β.
 Cinnamomi
 Garyophyllorum
 Nucis Moschatæ
 Macis Ligni Aloës
 Galangæ Spicæ Indicæ
 Zingiberis Zedoariæ
 Glycyrrhizæ Rhapontici
 Anacardii Styracis calamitæ
 Galbani Terebinthinæ
 Mastiches Myrrhæ
 Ireos Aristolochiæ rotundæ
 Corticum radicum Capparis
 Gentianæ Melanopiperis
 Anisi Fœniculi
 Anethi Apii
 Petroselinæ Macedonici
 Saxifragiæ ana ʒ ij.
 Hermodactylorum
 Origani Peucedani
 Schoenanthi Cardamomi
 Leucopiperis
 Carui Ligustici
 * Vincetoxici ana ʒ j. β. ʒ j. β.
 Balsamitæ Pulegii
 Dictamni Cretici
 Costi Pyrethri
 Thymbre Basiliconis
 Pæoniæ [*videlicet radice eius aut seminis*]
 Macro-

lactropiperis Amomi Sinoni
 robi veri ana ʒ j. ʒ ij. β.
 ylobalsami [aut succedaneum aliquod si-
 mile descriptioni Xylobalsami]

asia fistulae
 orallii rubri Rasurae Eboris
 arpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut
 supra]

bauci Cretici ana ʒ β.
 loschi Ambræ

Dis cordis cerui ana ʒ xliij.
 acchari albissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea her-
 ba, quam in Germania Pimpinellam vocamus.
 Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITÆ.] Nicolaus Alexandri A-
 ras Latinè impressus, non Balsamitam ha-
 bet, sed Balsamum: significat tamen Balsami
 rox, nonnunquam etiam Mentham; cuius spe-
 cies est Balsamita, hoc loco recipienda: nam si
 Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non
 simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum po-
 nisset.

SINONVM, secundum Matthæum
 Syluaticum, est Petroselinum agreste. Sed de
 o infra in annotationibus Aureæ Alexan-
 drine.

CASIAE fistula nomine hoc loco nequa-
 quam debet intelligi. Casia fistula, cuius nigra
 medulla bilem per aluum purgat; sed Casia li-
 gnea aromatica, quæ Cinnamomo similis est:
 nam

nam hac etiam apud probatos veteres auctores
Casia fistula vocatur.

- B DAUCVS Creticus hodie ignotus est:
 idèd possumus eius loco Sefeli Creticum accipe-
 re, idèst, Berwurtz, aromaticam herbam,
 foliis Fœniculi, sed multò minoribus.

P. C. SCHOL.

- A Balsamitæ.] Cùm Nicolai codex, ut &
 Cordus fatetur, Balsami legat; eo non herba
 Balsamita vocata, neque cum Fuchſio Bal-
 sami veri folia, sed oleum seu succus veri Bal-
 sami, Opobalsamumve hic intelligendum esse
 existimo.

- B Daucus Creticus.] Berwurtz Germanis
 vocata herba, seu Fœniculus porcinius Belgis,
 non est Sefeli Creticum, ut neque Daucus
 Creticus, sed potius Meum Diosc. aut illi
 proximum. Daucus autem Creticus verus,
 Diosc. delineationi ad amussim conueniens,
 semine aceri, albo, hirsuto, oblongo, nu-
 perrimè cognosci cœpit: virètque in hortu-
 lo hodie, inter plurimas raras plantas, no-
 stro.

Sanat capitis vertigines, oculorum ca-
 ligines abstergit, palatum & arterias pur-
 gat, distillationem vix astringit, dentium
 dolorè mitigat. Asthmaticis & suspensiosis
 peculiariter opitulatur, pectoris & pulmo-
 nis causas facilè amputat. Stomachi & he-
 patis dolores & debilitates sedat, splene-

tico-

ticorum & pleuriticorum angustias paragorifiat: omnium interaneorum vitiis prodest: inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephriticos, calculosos, stranguriosos & colicos purgat, & dolorem releuat. Sæpius autem sumptum, colorem pallidum emendat, menses deducit, & in ordinem debitum redigit. Typos quotidianarios & quartanarios reprimit. Qui autem hoc electuario vsus fuerit, à multis conseruabitur morbis.

Diatrion santalon D. Nicolai.

R. Santali albi	Santali rubri
Santali citrini	Rosarum
Sacchari	ana 5 iij.
Rhabarbari	Spodii
Succi Glycyrrhizæ	
Seminis Portulacæ	ana 3 ij. 3 β. 6 v.
Amyli.	Gummi Arabici
Tragacanthæ	
Nucleorum seminis Melonis	
Cucumeris Cucurbitæ	Citrulli
Seminis Scariolæ	ana 3 j. β.
Camphoræ	3 j.
Sacchari albissimi.	

SCARIOLA est *Endivia vulgaris*, cuius folia in dorso habent spinulas, ut dictum est *suprà in Diarhodon Abbatis.*

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi
C calo-

calorem mirum in modum: tabidis & re-
gio morbo correptis itidem prodest.

Diaxyloaloës D. Mesua.

℞. Ligni Aloës crudi

Rosarum ana ʒ j.

Garyophyllorum Spicæ Indicæ

Macis Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ Mesuæ Cubebarum

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

✱ Mastiches

Cinnamomi

Cyperī Schœnanthi

Zedoariæ Been albi

Been rubri

Folii [*aut Macis siue Spica Nardi*]

Serici crudi Margaritarum

Corallii rubri Charabæ

Foliorum Citrei mali

Corticum Citrei mali

Ocimi garyophyllati

Stsymbrii Menthæ siccæ

Sampsuchi [*id est, Maiorane*]

Piperis longi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Molchi boni ʒ j.

Ambre ʒ j. β.

Sacchari albissimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam
rotunda

AROMATICAÆ.

51

rotunda radices Cyperi propriè & simpliciter
ab auctoribus Cyperi vocantur. Longis verò
radicibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis.
Quoniam verò non semper rotundum habere
licet, necesse est in penuria eius, longo vii.

SISYMBRIUM est mentha aquatica,
nigricantibus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis ventriculi, cordis &
iecinoris frigidis, animæ defectioni, con-
coctionique. Oris foetorem abigit, latti-
tiamque parit.

Diatrion pipereon Mesuae.

R. Macropiperis Melanopiperis

Leucopiperis ana ʒ v.

Zingiberis Thymi

Anisi ana ʒ ij.

Spicæ Indicæ Ammios

Amomi [quod non habetur, & loco eius ca-
piatur Carpesium sine Cubeba, aut Cala-
mus aromaticus officinarum, qui pro vero
Acoro habetur]

Cinnamomi ana ʒ j.

Cassie lignæ Seminis Apii

Seselios

Asari

Enulæ sicæ ana ʒ β.

Sacchari albissimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ructui,
quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflatio-
nibus auxiliatur. Item tussientibus.

C 2

Dia-

Diazingiber D. Nicolai.

℞. Zingiberis Galangæ
 Garyophyllorum Cinnamomi
 Nucis moschatæ Granorum paradisi
 Piperis longi Macis
 Cardamomi Spicæ Indicæ
 Rhabarbari Rosarum rubrarum ana ʒ xv.
 Pinearum mundatarum ʒ β.
 Phisticorum [*id est, Pistaciorum*] ʒ ij.
 Anisi Fœniculi
 Glycyrrhizæ rasæ Croci ana ʒ β.
 Sacchari albißimi.

* Ventriculum roborat & firmat.

Electuarium Ducis, D. Nicolai.

℞. Anisi ʒ ij. ʒ xv.
 Glycyrrhizæ
 Mastiches ana ʒ ij. ʒ v.
 Cinnamomi
 Chamædryos Zingiberis
 Galangæ Fœniculi
 Carui ana ʒ j. ʒ xv.
 Xylocassia Calaminthæ
 Dauci Pyrethri
 Piperi albi Piperis longi
 Cyperi [*scilicet rotundi*]
 Schœnanthi Ireos

Ama-

AROMATICAE.

53

Amomi [*aut succedaneum eius*]

Folii [*aut succedaneum eius*]

Afari ana ʒ j.

Spicae Indicae Croci

Gummi Arabici Tragacanthæ

Seminis Anethi Calami aromatici

Cubebæ Garyophyllorum

Carpobalsami

Ligustici Seminis Olusatris

Baccarum Juniperi Sefelios

Pentaphylli [*videlicet radicum eius*]

Seminis Asparagi

Seminis Citri

Acori [*aut loco eius Galanga*]

Ammios Rhabarbari

Nucis myristicae [*id est, Nucis Moschata*]

Ligni Aloës

Basilici garyophyllati

Mili folis

Seminis Saxifragiæ

Nucleorum seminis Citrulli

Cucumeris

Melonis Cucurbitæ

Seminis Scariolæ

Petroselini

Been albi Been rubri

Styracis calamitæ

Cardamomi ana ʒ β. ʒ v.

Penidiarum ʒ iiij. ʒ ij. β.

Sacchari albissimi.

CHAMAEDRYOS, *videlicet vera, qua*
C 3 *folia*

folia habet similia quercus. nascitur in montibus Iena, & inter Herspruck atque Ambergam.

OLVSATRI semen, est magnum semen, quod in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedonitum siue Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis.

Electuarium de Gemmis D. Mesue.

R. Margaritarum albarum ʒ iiij.
Sapphiri Hyacinthi
Sardæ Granatorum
Smaragdi ana ʒ j. ʒ.
Zedoariæ Doronici
Corticum Citrei mali Macis
Seminis Ocymi garyophyllati ana ʒ ij.
Corallii rubri Charabæ
Rasuræ Eboris ana ʒ ij.
Been albi Been rubri
Garyophyllorum
Zingiberis Piperis longi
Spice Indicæ
Folii [aut succedanei eius]
Croc
* Cardamomi ana ʒ j.
Trochiscorum Diarhodon
Ligni Aloës ana ʒ v.
Cinnamomi Galangæ

Zurum-

AROMATICAE. 55

Zurumbeth ana 3 j. β.
 Foliorum Auri
 Foliorum Argenti ana 3 ij. *
 Ambra 3 ij. Moschi 3 β.
 Sacchari albissimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus, qui passim in Myropoliis habentur, nihil valent; cum flammam edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur: quare omittendi sunt; aut loco eorum, de Hyacintho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma qua neotericis Carneola vocatur; quod diligenter est notandum. Hactenus enim qualis esset gemma Sarda, ignorauimus omnes.

ZURUMBETH est species Zedoaria, qua radicem habet rotundam & globosam, & afferitur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

Zurumbeth est spec.] Inter tres Zedoaria A species qua Antuerpiam aduehuntur radiculis oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissimum immixtum reperitur, rotundis globulis, & ea propter Truncosa Zedoaria à Materialistis nostris vocitata: hac utentur Zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab Horto De Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant, plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecinoris,

cinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item
palpitationi cordis, defectioni animæ, ac
concoctioni: tristitiam denique citra cau-
sam ortam amouet.

Electuarium Iustinum D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Folii [*aut succedanei eius*] Costi

Nardi [*id est, Spica Indica*]

Cassia lignea Aristolochia longæ

Aristolochiæ rotundæ Enulæ campanæ

Hyssopi Pulegii Artemisiæ

Pentaphylli [*videlicet radicis eius*]

Leucopiperis Orobi veri

Petroselini Ligustici

Olusatris [*i. Petroselini Macedonici vocati*]

Seminis Vrticæ

Milii Solis

Saxifragiæ seminis [*sumatur eius loco se-
men Pimpinella nostra, Germanorum vi-
delicet, non Sanguisorba vocata.*

Baccarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apii Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Baccarum Lauri ana 3 j. ß.

Sacchari albissimi.

Valet ad dolorē renum: calculos frangit,
& arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

Confe-

Confectio Liberans [scilicet à peste.]

℞. Radicum Tormentillæ
 Seminis Acetosæ
 Endiuix
 Coriandri præparati
 Citrei mali ana ʒ j. β.
 Santalorum omnium
 Dictamni albi ana ʒ j.
 Boli Armeni præparati
 Terræ sigillatæ [loco eius Bolus Leuanticus, id
 est, Orientalis, sumatur] ana ʒ iiij.
 Margaritarum Corallii albi
 Corallii rubri Charabæ
 Rasuræ Eboris
 Spodii [id est, Eboris vsti, de quo in fine]
 Ossis è corde cerui
 Been albi Been rubri
 Doronici Cardamomi
 Cinnamomi Macis
 Ligni Aloës
 Cassiæ lignæ [aut succedanei eius]
 Croti Zedoariæ ana ʒ β.
 Smaragdi [loco eius Hyacinthi aut Granati]
 Hyacinthi Granati
 Serici crudi incisi & torrefacti ana ʒ j.
 Penidii
 Sacchari Candi ana ʒ ij.
 Florum Nenupharis [id est, Nymphae]
 Buglossæ

C 5

Rosa

58 CONFECTIOES

Rosarum ana ʒ j.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

Ambra ana ʒ iij.

Sacchari albiſſimi.

Contra pestem plurimum valet: tutatur corpus ne lædatur à pestifero aëre, & præſeruat humores à corruptione.

Confectio Cordialis, Alex. Benedicti.

℞. Margaritarum

Spodii [*id est, Eboris uſti*]

Granatorum verorum

Cinnamomi. Tormentillæ

Boli Armeni ana ʒ iij.

Santalorum omnium Rasuræ Eboris

Vnicornu ana ʒ ij. Hyacinthorum

Sapphiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi*].

Corallii albi Corallii rubri

Charabæ albæ [*al. Succini*]

Valerianæ veræ

Dictamni Zedoariæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

Terræ sigillatæ [*aut Boli Levantici, hoc est, Orientalis*] ʒ j. ʒ ij.

Serici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

Oſſum è corde cerui ʒ j. ʒ.

Been albi

Been rubri ana ʒ ij.

Foliorum auri opt. numero v.

Moschi.

Moschi

Ambrae ana ʒ x.

Sacchari albissimi.

P R A E S E R V A T cor à peste.

*Electuarium Latitiae, Galeni;
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocimi garyophyllati

Crocī Zedoarię

Xylobalsami [*pro quo Lignum Aloës, cū in
istā descriptione non habeatur*]

Garyophyllorum Corticum Citrei mali

Galangæ Macis

Nucis moschatae

Styracis calamitæ ana ʒ ij. β.

Anisi Rasuræ Eboris

Thymi Epithymi ana ʒ j.

Camphoræ Moschi Ambre

Margaritarum perforatarum

Ossium de corde cerui ana ʒ β.

Auri foliati meri [*id est, purissimi*]

Argenti foliati meri ana ʒ β.

Sacchari albissimi

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liqui-
da siue opiatae, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

C. 6

Vini

60 CONFECTIOES

Vini veteris optimi, ana partes æquales: in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

LÆTITIAM colorisque bonitatem efficit: concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

Electuarium Latificans Rhasis.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| R. Melissæ | Corticum Citrei mali |
| Garyophyllorū | Galliæ moschatae Mesuæ |
| Mastiches | Croci |
| Cinnamomi | Nucis moschatae |
| * Cardamomi | (cipi] |
| Neremisch | [pro quo potest semen Paonia ag- |
| Been albi | Been rubri |
| Zedoarie | Doronici |
| Seminis Ocimi | |
| * Seminis Ocimi garyophyllati | ana ʒ ʒ. |
| * Moschi | ʒ xxiiij. |
- Sacchari albissimi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, ut decet, tunc prædictas species sequenti Syropo misce, & fac in modum opiatę:

- * R. Myrobalanorum Chebularum nu. xx.
- * Emblicarum numero xxx.
- * Aquæ P iij. aut quantum sufficit. Coquatur tritę myrobalani in prædicta aqua, donec

donec remaneat tertia pars ; deinde cola.
Colaturæ addemellis despumati ℥j. loco
prædicti sacchari:bulliat postea vsque ad
iustam spissitudinem ; & insperge species +
prædictas , postquam feruor Syrupi re-
missior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhafin est Rosa asi-
nina. Auerrois autem interpres dicit Paoniam
esse Rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Ne-
remisch idem esset quod Paonia : nisi Rhafis de
utraque, id est, de Neremisch & de Paonia, duo
propria faceret capitula, tanquam de rebus di-
uersis. Certò igitur statuere non possumus, quid
sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia,
ex quibus virtutes manant naturales &
animales : iuuat calorem naturalem, &
spiritum viuificat: compescit malas cogi-
tationes : & bonos mores , lætitiâque
& gaudium gignit.

*Electuarium Plurisarcoticum, seu potius
Pleres archonticum, D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi	Garyophyllorum				
Ligni Aloës	Galangæ				
Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ				
Zingiberis	Spodii				
Schænanthi					
Cyperi	Rosarum				
Violarum	ana	3	j.	℥	xv.
		C 7			℞ lii

62 CONFECTIOES

Folii [*loci ipsius, Macis sumatur*]

Glycyrrhizæ Mastiches

Styracis calamitæ

Sampfuchi [*id est, Maiorane*]

Balsamitæ Ocimi

Cardamomi Macropiperis

Leucopiperis

Myrtillorum

* Corticis Citrei mali ana ʒ ij. ʒ v.

Margaritarum splendorum

Been albi Been rubri

Corallii rubri

Serici tosti ana ʒ j. ʒ ij. β.

Moschi ʒ vij. β.

Camphoræ ʒ v.

Sacchari albißimi.

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

Lithontribon D. Nicolai.

℞. Spicæ Indicæ Zingiberis

Xylobalsami [*aut Ligni Aloës, ut supra*]

Acori [*sive Calami aromatici hodie vocati*]

Cinnamomi

Peucedani [*videlicet radicis eius*]

Meu [*loco eius accipe Seseli Cretici radicem, id est, Beruvuriz, Germanis vocatam*]

Mela-

Melanopiperis Macropiperis
 Leucopiperis Saxifragiæ ana ʒ ij. β.
 Opobalsami [loco eius sumatur oleum ex gra-
 nis Iuniperi]
 Garyophyllorum
 Costi Rhapontici
 Glycyrrhizæ Cyperi
 Tragacanthæ Chamædryos
 Seminis Olusatris [est semen quod Macedo-
 nicum vulgò perperam vocant]
 Seminis Apii Ammios
 Asparagi Ocimi Vrticæ
 Citrei mali ana ʒ j. ʒ xv.
 Folii [aut succedanei eius]
 Croci Schœnanthi
 Lignæ Casiæ [aut succedanei eius]
 Bdellii Mastiches
 Ireos Amomi
 Ligustici Milii solis
 Petroselini Macedonici Sefelios
 Sinoni [de quo supra]
 Cardamomi
 Anethi Euphorbii
 Lapidis Lyncis Olei Nardini
 Olei Moschelini ana ʒ β. ʒ vij. β. ★
 Sacchari albissimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ,
 tunc speciebus adde triplum mellis de-
 spumati, loco sacchari: diutiùs enim du-
 rant species melle exceptæ, quàm saccha-
 ro. potest tamen utroque modo fieri.

Olei

Olei Moschelini præparatio infrà habebitur.

P. C. SCHOL.

A Meu] Sefeli Creticum Cordo vocatum, quod Beruvurtz Germani, Fœniculum porcinum Belge appellant, esse ipsissimum Meu seu Meum Diosc. omnino persuasum habeo. Nec radicem eius tantam, tamve crassam esse, (natalibus præsertim locis natam,) neque tam graviter olere, veluti Matthiolus metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à Dioscor. descriptos limites ita transire putem, quin genuinum Meum esse queat: Crassitudo cum crassitudine comparanda cum sit, simul atque suaviter olere, & simpliciter odoratum esse, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut quæ de Meo Asturia ac Sistra Monachi observârunt & scribunt; ego, utpote mihi quoque comperta, approbem, illisq; manus dem. Proinde si quispiam adhuc nihilominus refragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tantisper videntur Pharmacopœi, deserto illo quo hætenus vsi sunt nostrates; dum ipse Diosc. Genius nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter admodum Matthiolum carpit Fuchsius, quod ille unà cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriam nominari inquit, quam Angelicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Fuchsius: cum Imperatorie nomine ab isthoc Meo admodum diuerse à Germanis demonstrantur plantæ.

Plæ-

AROMATICAE. 65

Præclarum ad indigestionem stomachi
& frigiditate. Iliorum lumborumque do-
lores compescit, lapides in renibus &
vesica potenter confringit, & inde mira-
biliter expellit. Stranguriam & dysuriam
vestigio soluit.

Rosata Nouella D. Nicolai.

℞. Rosarum Sacchari
Glycyrrhizæ ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij. β.
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. ★
Garryophyllorum
Nardi [id est, Spica Indica]
Zingiberis Galangæ
Nucis moschatæ Zedoariæ
Styracis calamitæ Cardamomi
Seminis Apii ana ʒ j. ʒ vj. ★
Sacchari albi ssimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati
stomachi, cordis, hepatis & pulmonis.
Sitim compescit & vomitum, abscindit
debilitatem stomachi, adstringit laxa.
Cardiacis subuenit, sudorem diaphoreti-
cum reprimat, ex chronica infirmitate de-
biles recreat.

Electuarium Diapæonias.

℞. Radicis Pæoniæ ʒ j.
Macis Spicæ Indicæ
Croci Coralliorum rubrorum
Mar-

66 CONFECTIO NES

Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana ʒ β.

Myrtillorum verorum ʒ j. β.

Cinnamomi

Nucis moschatae

Garyophyllorum

Folii [loco eius Cassia lignea vera]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Anacardi ʒ j. β.

Moschi Ambræ ana ʒ vj.

Sacchari albißimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.

In hieme verò adde speciebus triplū mel-
lis despumati, & conficiatur electuarius.

CONFERT epilepsia, & vertigini.

Electuarium Resumptiuum
D. Nicolai.

R. Rosarum Glycyrrhizæ

Sacchari ana ʒ ij. ʒ v.

Gummi Arabici

* Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. β. Papaueris albi

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Lactucæ Scariolæ ana ʒ iij.

Garyo.

AROMATICAE.

67

Caryophyllorum
 Libodii [pro eo, Eboris vsti]
 Cinnamomi ana 3 j.
 Zingiberis
 Syracis calamitæ ana 3 ij.
 Poroci ḡ v.
 Benidiarum 3 β.
 Nuculorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis ana 3 ij.
 Cydoniorum 3 ij.
 Mygdalorū dulcium Pineorū nucleorū
 Berberis Seminis Maluæ
 Coti siue Bombacis
 Violarum Nymphææ
 Bebesten ana 3 ij.
 Syrupi Violati quantitate sufficien-
 ti fiat Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radica-
 rem : lenit, humectat, nutrit, & confor-
 tat. Aperit poros, obfistit cholera: sedat
 febrem, tussim & sitim. Restituit integras
 vires, & pristinam sanitatem, extenuatis,
 consumptis & hecticis.

Diacorum D. Mesue, in sua praxi,
 cap. 1. de affectibus nervorum.

Radicum Secacul Acori
 Pinearum ana P j. β.
 Radices Secacul mundatæ & incisæ co-
 quantur in aqua clara, donec aqua consu-
 matur:

matur : postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pul-
ti similes fiant. Dein adfunde eis mellis
odorati & optimè despumati l' x. coquan-
tur lento igne, donec tota aqua, quam radi-
ces Secacul imbibent, in vaporem reso-
luta sit ; diligenter agitando , ne ad vasis
fundum adurantur radices. Cùm autè iuste
spissitudinis consistentiam acquisiuerit, ab
igne deponito , & adde radices Acori te-
nuissimè tritas, & Pineas minutissimè in-
cisas, cū subsequētī puluere optimè mistas :

℞. Piperis ʒ j. Piperis longi
Garyophyllorum Zingiberis

A Macis ana ʒ iiij.
Nucis moschatae Galangæ
Cardamomi ana ʒ iij.

Omnia ista simul cum melle & radici-
bus Secacul misceto & vnito ; diligenter
agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

B SECACVL verum est Siser , quod Ger-
mani vocant Gritzelmoren, & Klingelmoren,
Galli Eschernis & Seruiles, Bauari Nudle, Sue-
ui Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vocatus Calamus
aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radices
elixari. Sed quia nos recentes & virides non ha-
bemus, ut ii qui in calidis regionibus habitant,
ideò melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

A Rosas è contextu, à Cordo perperam imposi-
tas,

, *Fuchsia* quoque & id volente, sustuli.

Secacul verum.] *Secacul* non est *Sifer*, ut B

ardus existimat: sed, veluti *Frācisco Alexand.*

quoque placet, esse posset ea planta quam *Critb-*

um spinosum, seu *Pastiracā marinā* vo-

nt *Monspelussani*: unde mihi in horto meo à

atthia *Lobelio* doctore Medico semine trans-

ffo, nunc viret. Genuinum interim si id non

erit, in eius locum tamen commodè substitui

set, respondentibus facultatibus: dum *Arabs*

ispiam ipsissimum nobis communstrauerit.

Confert mirum in modum ægritudini-

is nervorum: acuit omnes sensus & in-

enium, sedat dolores capitis; est pecu-

are remedium frigidarum ægritudinum

num, & maximè catarrhi.

Pulvis ad Epithemata cordis.

Santali rubri ʒ j.

orticum Citrei mali Santali albi

osarum Corallii albi

Corallii rubri Charabæ

podii [accipe Eboris vsti]. ana ʒ ʒ.

Ossis cordis ceruini

Croci ana ʒ j.

pecierum Lætitiæ Galeni

pecierum electuarii de Gemmis

pecierum Diamargariton ana ʒ iiij.

Camphoræ ʒ j.

In puluerem redactæ species commi-

ceantur.

Pulvis

Pulvis ad Epithemata hepatis.

℞. Rosarum Santali albi Santali rubri
 Absinthii Schoenanthi
 Spodii [*pro eo, Eboris vili*]
 Spicæ Indicæ ana ʒ β.
 Contrita in puluerem misce, & reponc.

CONFECT IONES

OPIATÆ.

Diaolibanum D. Nicolai.

℞. Castorei Opii
 Hyoscyami albi ana ʒ iij.
 * Cassiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.
 Folii [*aut succedanei eorum*]
 Croci
 Turis masculi ana ʒ ij.
 Rhapontici
 Amomi [*pro quo Carpesium*] ana ʒ j. ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ j. β.
 Pæoniæ Styracis calamitæ
 Macropiperis ana ʒ j.
 Spicæ Indicæ
 Pyrethri Euphorbii
 Leucopiperis ana ʒ ij. β.
 Mellis despumati triplex pondus.

EST verò observandum in omnibus opiatis, ut singulis uncis specierum, misceantur tres uncia

ancia mellis despumati. Si minus fuerit, exsic-
catur confectio facile: si verò plus addatur, ve-
s eius disperguntur.

Tus Masculum, est Tus album aut fla-
vum purissimum, in globulos rotundos singulos,
aut testiculorum figura geminos concretum;
ideoq; Masculi cognomen accepit.

VTILE est ad diuersas passiones ca-
pitis: hemicranicum dolorem placat, &
supercilii: lachrymas potenter stringit:
nauces rheumatizatas & arterias lenit. He-
miplegicis & tussientibus medetur. Vo-
mitum compescit: dolorem stomachi &
nauseam aufert. Peripneumonicis, pleuri-
ticis, empyicis subuenit. Gonorrhœam
& satyriam emendat, & menstrua-
lem sanguinem sistit.

Musa Enca, sine Zazenea, vel Egetea A
D. Mesue.

℞. Castorei

Myrrhæ

Opii

Melanopiperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Men [aut loco eius Seseli Creticum, id est,
Beruvurtz]

Dauci

Asari

Croci

ana

3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

R. C.

P. C. SCHOL.

A Musa.] *Erroneè à Cordo Musa hac confe-
ctio inscribitur, veluti & Francisci Alexand.
ritè obseruauit; cùm Sagzeneà à Mesue voca-
tur. Musa enim Enia apud Nicolaum confe-
ctio est, ab hac plurimum differens.*

VALET ad omnes passiones frigi-
das, & ventositates crassas, & dolorem
dentium & corrosionem eorum, & ad fri-
gus stomachi, tarditatem digestionis,
colicam, difficultatem vrinae, & ad fri-
gus & phlegma, & ad mucositatem
vrinae.

*Philonium Maius, siue Romanum
D. Nicolai.*

Rx. Leucopiperis

* Hyoscyami albi [i. seminis eius] ana ʒ v.

Opii ʒ ij. β.

Cassiae lignae [aut succedanei eius] ʒ j. β.

A Seminis Apii ʒ j.

Petroselinii Macedonici Foeniculi

B Dauci Cretici ana ʒ β.

Croci ʒ j. Spicae Indicae

* Zedoariae

* Pyrethri ana ʒ β. ʒ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbii Costi ana ʒ j.

Mellis

OPIATAE.

73

Mellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvuriz.

P. C. SCHOL.

Sem. Apii ʒ j. & paulo post. Sem. Dau- A
ci ana ʒ. β. } Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. β. B
cuti & pro ʒ β. erroneè ʒ j. legebat: vi Fran-
cisco Alexand. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo obla-
tum, peripneumoniam cum hydromeli-
te, sanguinis sputum cum polygoniæ
succo. Indigestione n stomachi & vom-
itum cum posca, dolorem hepatis cum
œnomelite curat: spleneticis, & aurigi-
nosus cum oxymelite subuenit; cœliacis,
cum apozemate rutæ. Pleuriticis, ilio-
sis, nephriticis & vesicæ symptomatis
cholericis medetur.

Philonium D. Mesue.

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opii ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ Nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pōdus.

MIRUM in modum mitigat dolores,
præcipuè stomachi, matricis, laterum,
totius ventris, & colicam cum decoctione

D chamæ-

chamæmeli vel rutæ, & statim prouocat
 somnum cum aqua lactucæ vel syrupo pa-
 paueris. Tollit dolorem capitis cum de-
 coctione stœchadis, prohibet catarrhum
 cum decoctione olibani vel spicæ. Con-
 tra spasmodum, & paralysem bibitur cum de-
 coctione nucis moschatæ. Facilitat anhe-
 litum cum decoctione baccarum lauri vel
 hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis.
 Prouocat vrinam, faciliat mictum, &
 frangit lapides vesicæ, cum decoctione Sa-
 xifragiæ vel aqua apii. Compescit vomi-
 tum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo
 plantaginis vel decoctione mastiches; &
 sedat singultus, & præfocationes, & vitia
 matricis, & potenter somnum inducit.

Philonium ex Galeno & P. Ægineta.

Rx. Croci	ʒ	v.	
Pyrethri	Euphorbii		
Spicæ Indicæ	ana	ʒ	j.
A Piperis albi	ʒ	xx.	
Hyoscyami	ʒ	viiij.	
Lachrymæ Papaueris	ʒ	x.	
Mellis despumati optimi triplum.			

P. C. SCHOL.

A Hyoscyami ʒ. viij.] *Cum non Galeni,
 sed P. Ægineta tantum corrupta exemplaria
 perperam legant Hyoscyami ʒ viij, atq; ex Cor-
 narii*

*navii dolabella 3 xx pro 3 viij. restituenda sine,
cum Mesues descriptione hoc pacto conveniet:
utpote qui ex hisce eandem desumserit; Castoreū
in Euphorbii locum substitutum si exceperis.*

Philonium Persicum D. Mesue.

Rx. Piperis albi
Hyoscyami albi ana 3 xx.
Apī
Terræ sigillatæ [*pro qua Boli Armeni, ut
suprà*] ana 3 x.
Lapidis Hamatitidis Croci ana 3 v.
Castorei Spicæ Indicæ
Euphorbii Pyrethri
Margaritarum Charabæ [*id est, Succini*]
Zedoariæ Doronici
Trochiscorum Ramich [*de quibus infrà*]
ana 3 j.
Camphoræ 3 j.
Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi.] *Insulse admodum Papaver
in huius locum surrogauerat Cordus ; quod
et suboluit facile Euchsio : sequentibus nihilo-
minus Cordum Colonienfibus medicis, in ab ipsis
euulgato non ita diu Dispensariolo.*

INVENTUM est ad retinendum san-
guinem menstruorum, hæmorrhoidarum,
fluxum ventris, vomitum, & spū sanguis-
neum;

neum; præsertim si cum succo plantaginis
dissolutum bibatur, & ad fluxum mēstruo-
rum mittatur in vuluam, & ad fluxum san-
guinis excoiatuum clysterizetur. Conso-
lidat fermè vlcera & venas : & nihil est
quod magis & tutius præseruet ab abortu
prægnantem grauidam.

Requies Nicolai.

℞. Rosarum

Violarum ana ʒ iiij.

Opii Hyoscyami

Papaueris [*videlicet albi*]

Mandragoræ [*videlicet cort. radicis eius*]

Scariolæ [*videlicet seminis*]

Lactucæ [*videlicet seminis*]

Seminis Portulacæ

Psyllii

Nucis moschatæ Cinnamomi

Sacchari ana ʒ j. β.

Santali albi Santali citrini

Santali rubri Spodii

Tragacanthæ ana ʒ ij. ḡ v.

Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-
pientibus præstat : maximè typicè febri-
citantibus, quotidianariis, tertianariis,
quartanariis, acutis & peracutis.

Tryphera

Tryphera magna D. Nicolai.

℞. Opii 3 ij.

Cinnamomi

Garyophyllorum Galangæ

Spicæ Indicæ Zedoariæ

Zingiberis Costi

Styracis calamitæ

Calami aromatici

Cyperi

Iridis Illyricæ

Peucedani

Acori [aut Calami aromatici hodie vocati]

Mandragoræ Nardi Celticæ

Rosarum Piperis

Sem. Anisi

Apii Petroselini Macedonici

Fœniculi Dauci

Hyoscyami Cumini

Ocimi ana 3 j.

Mellis despumati optimi triplum.

*IRIS Illyrica, est eadem quæ in Pharmacopoliis dicitur Ireos.**NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Saliunca, est eadem herba quæ in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.**AUXILIATUR dolori stomachi ex frigiditate; & cùm accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melancholia*

D 3 de ma-

de matrice insomnes sunt, rheumaticis,
peripneumonicis, & qui excernunt excre-
menta cum sanguine, vtilissima est.

Tryphera minor Fænonis, ex Mesue.

R̄. Myrobalan. Chebularum
Bellericarum Indarum Emblicarum
Nucis moschatæ ana ʒ v.

* Nasturtii assati Afari

Origani Persici Piperis

Olibani Ammios

Zingiberis Fructus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ Schœnanthi

Cyperi ana ʒ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto ma-
ceratę, & deinde tostę ʒ xx.

Myrobalani cum butyro recenti non sa-
lito assentur modicum; reliqua oleo amyg-
dalino dulci inuoluantur: deinde addatur
Moschi ʒ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere,
ne Myrobalani comburantur, cum in bu-
tyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod
Origanum Orientale: nascitur etiam in Creta
insula, & Græcia: habet autem surculos, capi-
tula, folia, & ramulos maiorana similia; sapo-
rem verò inter Satureiam & Dictamnem Cre-
ticum medium: est q̄ valdè odoratum & aro-
maticum.

maticum. affertur ex Oriente in Italiam. loco autem eius accipere licet Dictamnium Creticum verum.

*TAMARISCUS sativa, arbor est proce-
ra: sed ea nos caremus, ideoque cogimur loco
eius nostratis Tamarisci foliis uti.*

*SCORIA ferri, propriè significat ferri
recrementum, id est, Eysenschlacken Germanis
vocatam: verum, id non debet hoc loco accipi,
sed Squama aut Batitura Ferri optimi aut
Chalybis, quam Græci Stomoma appellant.*

*V A L E T ad corruptionem & exuberan-
tiam menſtruorum, & hæmorrhoidarum,
& ad corruptionem formæ, & debilitatem
ſtomachi, & destruit humorem crudum.
& clarificat colorem. Confortat vesicam,
& abſcindit fluxum ventris.*

Tryphera Sarracenica D. Mesua.

℞. Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana ʒ v.

Cinnamomi Leucopiperis

Macropiperis Melanopiperis

Secacul [id est, Siferis, ut supra]

Folii [aut succedanei]

Spicæ

Cardamomimajoris Cardamomiminoris

Cassæ lignæ [aut succedanei eius]

Seitaragi Indi Cyperi

Apii Linguae avis

D 4

Garyo-

30 CONFECTIOES

Garyophyllorum
 Been albi Been rubri
 * Zingiberis ana 3 ij.
 Nucis moschatae Macis
 Sesami excorticati ana 3 iij.
 Amygdalorum dulcium
 Amygdalorum amarorum ana 3 v.
 Ligni Aloës Rhabarbari
 Rutæ Seminis Fœniculi
 Mastiches ana 3 ij.
 Ocimi garyophyllati Menthæ ficcæ
 Origani Persici [*eius loco Dictamnium Cre-*
ticum accipe] ana 3 j. β.

Fricentur Myrobalani trite cum butyro
 vaccino recenti & non salito; aliæ verò
 species cum oleo amygdalino dulci: &
 confice cum mellis despumati opt. triplo.

SECACVL, non est Iringus sine Eryngiū,
 neque Iringus, qui habet folia Cretami marini;
 neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul
 est veterum Siser, hoc est radix illa quæ Germa-
 nicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlen,
 & Geyrlen: Gallicè Eschervis & Sernilles.

LINGVA avis, est semen Fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nastur-
 zii odore & sapore, foliis longis, radice simili
 eius herbe quàm Merretich vocant Germani,
 & Pfefferwurtx, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & he-
 patis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat;
 humores in ventriculo & aliis visceribus
 putres.

putres absomit; oris & corporis odorem
& colorem commendat; lassitudinem tol-
lit. Sanitatem præsentem tuetur, & mor-
borum generationem prohibet. Venerem
auget: hæmorrhoides sanat.

Tryphera Persica D. Mesua.

℞. Succorum Solatri siue Solani

Endiuia veræ & fatiua

Apii ana ℥ ij.

Lupulorum depuratorum ℥ j.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridium

Rosarum ana ℥ iiij. [aliis ℥ iiij.] *

Folliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ j.

Prunorum Damascenorum pinguium mu. l. *

Cuscutæ ℥ β.

Spicæ Indicæ ℥ iiij.

Bulliant molliusculo igne, donec super-
sint ℥ ij.

Et iniiciantur Epithymi ℥ xl.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum frictorum in oleo amygdalo-
rum dulcium ana ℥ ij. *

Bulliant leuiter, deinde ab igne depo-
nantur & percolentur: atque dissoluantur
in vna parte istius percolati

Tamarindorum recentium ℥ iiij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

D. s.

Pulpæ

Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.

Sacchari violati P j.

Percolentur & mudentur à granis & fordibus ; atque in aliam aquæ partem proiciantur.

Sacchari albissimi P iiij.

Acetivini P j.

Coquantur leuiusculo igne : deinde proiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in vnum, atque coquantur donec mellis crassitiem obtineant : postremò in puluerem redactæ sequentes species inspergantur:

Rhabbari optimi ℥ ij.

Myrobalan. Citrinorum ℥ j. β.

Cebulorum

Indorum ana ℥ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebæ

Spodii [*loco eius Eboris vñli*]

* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indicæ ℥ ij.

Inuoluan-

Inuoluantur hæ species in oleo viola-
to : & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febribus acutis, & inflam-
mationi stomachi & hepatis, ictericis ca-
lidis : de oppilatione incolumitatem ac-
quirit. Visum à fumis cholericis deperdi-
tum, reparat. Sitim mitigat : morbos adu-
stionis fieri prohibet.

Confectio Anacardina D. Mesue.

℞. Piperis nigri

Piperis longi

Myrobal. Chebulorum

Emblicorum Bellericoum Indorum

Castorei ana ʒ ij.

Costi Anacardii

Sacchari tabarzeth

Burungi

Baccarum Lauri ana ʒ vj.

Cyperi ʒ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis
admisceantur : deinde omnia cum butyri
recentis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. β.

Simul coctis bullitione vnica confician- *
tur.

P. C. S C H O L.

Burungi.] Cordus huius loco semen Er- A
ca posuerat, hanc dictionem ita interpreta-
tus; cum Melissam esse existiment plerique,

ut & monet Fuchsius, Matthiolo aliter sentien-
te. Si verò dictionem hanc *Eruca semen* esse,
Mesua mens fuerit, per id Sinapi semen à colore
album vulgo hîc nuncupatum, atque ab offici-
nis nostris perperam *Eruca semen* vocitatum,
intelligendum erit; ab huius confectionis vi-
rium scopo non alienum.

Est confectio sapientum, & eorum qui
desiderât scire: acuit enim intellectû, sub-
tilizat sensum, memoriam recuperat; &
confert dolori stomachi & ventris à frigi-
ditate facti; & clarificat sanguinem, colo-
rem bonum facit.

Aurea Alexandrina D. Nicolai.

R. Afari (suprà)
Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. β.
Garyophyllorum
Opîi Thebaici Myrrhæ
Cyperî rotundi ana ʒ ij.
A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum]
Cinnamomi
Folii [aut succedanei eius]
Zedoarię Zingiberis
Costi veri Coralli
Cassie lignee vere Euphorbii
Tragacanthæ
Turis masculi
Meu [vel potius Mei]

Strya-

Styracis calamitæ

Saliuncæ [*id est, Spica Celtica, que nunc Romana dicitur. Sed in Græco Alexandrino habetur Eleliphæon, id est, Salvia*]

Cardamomi minoris Sefelios

Seminis Napi Seminis Saxifragiæ B

Anethi

Anisi ana 3 j.

Ligni Aloës

Rhapontici C

Aliptæ moschata Castorei

Spicæ Nardi Indicæ Galangæ

Opopanacis Anacardii

Mastiches Sulphuris viui

Radiciis Pæoniæ

Eryngii [*videlicet radiciis eius*]

Rosarum Thymi

Acori veri [*sive Calami aromatici*]

Pulegii Aristolochiæ longæ

Gentianæ

Corticum rad. Mandragoræ

Chamædryos Phu *

Baccarum Lauri

Ammi [*id est, Ammios*]Dauci Cretici [*eius loco licet accipere Sefeli Creticum, id est, Beruvuriz*]

Macropiperis Leucopiperis

Xylobalsami [*aut aliquod succedaneum*]

Sem. Carui

Amomi Petroselini

Ligustici Rutæ

D 7

Sinoni

Sinoni ana ʒ β.

Auri cocti [i. omnino igne depurati & sinceri]

Argenti meri [vel Fol. Argenti]

* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

* Ossis è corde cerui ana ʒ xv.

Limaturę Eboris

* Calami aromatici

Pyrethri ana ʒ vij.

Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao etiam alia quedam pretiosa habentur in fine, nî fallor. Sicut videbitur, si in lucem venerit.

MYRRHAE. *Adnarium*, auctor quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in alteram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti; que vox magnam habet similitudinem cum Myrrha.

MEV vero nos cæremus. eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum, aut Seseli Creticum, hoc est Beruvurtz: sed hoc inferius est accipiendum pro Danco Cretico.

NAPVS, est parva, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, Bortfeldilsch, & Bairisch rublein.

PHV verum, quod ad medicinam requirunt Auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe agrestis: sed alia herba que Germanicè dicitur

dicitur Gartenseltzk , Teriatskraut & Spik-
wurzel. Caulem & flores habet Valeriana,
radicem maiorem & odoratiorem, folia longa
& mollia. Colitur à nobis in hortis.

AMOMVM verum] est Rosa Hierichuntis D
odorata: sed eo Pharmacopola hactenus carue-
runt. eius succedaneum est verus Acorus aut
Carpesium.

SINONVM siue Sison, siue Sinnai, siue Si- E
non, est semen nigrum aromaticum, quod ho-
die Amomum in Pharmacopoliis vocitatur
falsò.

AMBARVM Margaritarum] hoc est, F
perforatarum & non perforatarum. alii le-
gunt albarum Margaritarum. Actuarius ha-
bet simpliciter Margaritarum. Non malè ergo
quis aget, si tam perforatarum quàm non
perforatarum, ana ʒ ʒ. ʒ vj. & ʒ. acceperit,
ita ex utrisque unum fiet pondus, videlicet ut
Nicolauus habet, ʒ j. ʒ xij.

P. C. SCHOL.

Balsami] Opobalsami, legebat Cordus, au. A
etoris potius mentem interpretans & ponens,
quàm vocem eam quam repererat seruans. Per
Balsamum verò absolute scriptum, herbam
ipsam ipsius Balsami fruticis intelligi vult
Fuchs. Myrsinum Xylobalsamo, Carpobalsa-
mo, Opobalsamo, & Balsamo, quatuor di-
stinctis vocibus uti perhibens. Sed eundem My-
rsinum quatuor illa simul in eodem usurpare
medica-

medicamento, nec dicit nec demonstrat. Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu Opobalsamum intellexisse, unà cum Francisc. Alexand. Apolline censeo.

B Sem. Napi.] *Seminis Sinapis legit Fuchsius huius loco ex Myrepso, cui & aliquot vetustæ meæ exemplaria consentiunt.*

C Rhapontici.] *Rhabarbari perperam legebat Cordus, indicante & id quoque Fuchsio; quod à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem admissim Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nuperrimis annis primùm adferri denuò atque à peritioribus nonnullis cognosci cœpit. Non ita diu enim eius uncias paucas (rariuscule enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tum agebat, ad me dono misit, non minùs doctus, quàm hacce in nostra arte si quis alius versatissimus atque diligentissimus Valerandus Donreus, Lugduni pharmacam nunc faciens. Verùm in huius Rhap. panuria Rhabarbaro non incommodè utèris.*

D Amomum verum.] *Rosa Hierichuntis vocata vulgò, Amomum herclè esse non potest, ut Matthiol. Fuchsius, & Francisc. Alex. rectè sentiunt. Quare eius utendum succedaneo.*

E Sinonum.] *Cordimentem, ut neque Anguillara, non intelligit Francisci Alex. Apollo. Dicere enim volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum, Apii semini simile, eius herba, inquam, cuius imago ab Hieronymo Trag.*
go, &

go, & Cordo, Sisonis nomine depicta est; ac cuius semen Belgii atque Germania officina Amomum falsò vocitant, proque eo sinistrè utuntur. Idipsum interim si Sinonum non fuerit, facultate cum illi sit satis vicinum, pro eodem vsui esse poterit.

Ambarum Margar.] Cum ita legeret Cordus, unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet; nempe ut in contextu restitui.

CONTRA defluxiones capitis frigore conceptas efficax est: oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summopere prodest. Illitum fronti comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinem exscreantibus præfenti est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium valet: calculos comminuit: omni ventris malo liberat. Quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferu-
facto Stœchadis iusculo, medetur.

Diacodion simplex D. Mesuæ.

℞. Capitulum Papaueris mediocrium *
flaccidorum numero x.

Macerata horis xxiiij. in Aquæ celestis *
sextario.

sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu vsque quo tertia pars aquæ superfit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iij.

Mellis optimi ℥ j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū cōpositū verò vt fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

* Rubiæ tinctoriæ Hypocistidis

Croci Myrrhæ

Balaustiorum [hoc est, florum malogranat. siluestrium] ana ℥ j.

Ramich ℥ iij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium, neque aridorum, sed medio habitu, qualia sunt pridiè decerpta. Si verò sicciora
* fuerint capita, biduo maceranda erunt.

SEXTARIVS mensura genus est, quod si melle repleatur, pendet ℥ xxx; si oleo, pendet ℥ xvij; si verò aqua repleatur, pendet aque ℥ xx. Hoc autem loco accipiendus est sextarius aque caelestis: ergo aqua oportet esse uncias xx ponderales. Variant tamen Auctores in sextarii definitione, vt inferiùs in vnguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, vt hodie corrupto nomine vocant, Hypoquistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, quæ ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua videtur

etur esse in hac confectio. Actuarius aliud
habet Diacodion ; quod huic subiiciemus sta-
im.

DIACODION simplex confert eis *
quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem
subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa
russis.

Compositum autem, naturę impetum *
sistit, & sanguinis reiectionem à visceri-
bus thoracis.

Diacodion D. Actuarii.

℞. Capita Papaveris, neque perquam vi-
ridia, neque etiam ariditate exsucca,
numero xiiij.

Rosarum ʒ j. ʒ j. β.

Croci Acaciæ

Dulcis radicis [*id est, Glycyrrhizæ*] ana ʒ j.

Armenæ glebæ [*id est, Boli Armenæ*] ʒ β. *

Cinnamomi Hali

Hypocistidis *

Floris siluestris Punicę [*id est, Balanflorū*]

ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallii candidi [*id est, albi*]

Corallii rutili [*id est, rubri*]

Rhois culinarii [*id est, obsoniorum*]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j. [*seu ʒ ij.*]

Seminis Portulacæ ʒ j. β.

Capita

Capita papaueris in cælesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam bulliat cum mellis optimi ℞ ij. Postremò deposito ab igni vase, species subtilissimè tritas adicito, & bene vnito.

☉ hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicum: pendet autem tantum quantum 3 ḡ. & est quarta pars uncie vnius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum petraum, quod hodie non habent Pharmacopola, ideoq; necesse est Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere. nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad qua Petraum, id est, Alum.

RHVS Culinarium, id est, quod nunc vocant Arabico nomine Sumach: oportet autem enucleatum, & pulpam eius accipere.

AUXILIO est celiacis, dysentericis, leuitati intestinorum, alui profluuiio, cum aqua cælesti, in qua spodium ferbuerit aut succinum torrefactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

A *Diacastorium D. Nicolai.*

℞. Castorii

Myrobalanorum citrinorum ana 3 iiij.

minus ḡ j. β.

Affæ

Assē foetidæ Myrrhæ *
 Euphorbii ana ʒ j. ḡ xvij. —
 Aloës ʒ j. β. minus ḡ j. *
 Folii [aut succedanei eius] *
 Artimonii [id est, Pyrethri] *
 Glycyrrhizæ Tragacanthę *
 Calami aromatici
 Nitri— Galbani
 Schœnanthi Opopanacis
 Spice Nardi Indice
 Sagapeni Nucis moschatę
 Casiæ lignę Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 Colocynthidis Rhapontici *
 Styracis Calamitæ Zingiberis
 Cinnamomi ana ʒ j. ḡ ij.
 Staphisagrię
 Dauci Fœniculi
 Petroselini Apii
 Sileris montani Baccarum Lauri
 Petrolei Seminis Sinoni
 Styracis [calamitæ] rubræ [id est, rufa pu- *
 rissima]
 Sanguinis draconis Cardamomi maioris
 & minoris
 Turis Agarici
 Mastiches
 Salis Hammoniæ Zedoariæ
 Anisi ana ʒ j. ḡ ix. *
 Thym-

- Thymbræ Hyssopi
 Chamædryos Pulegii
 Origani Balsamitæ
 Ocimi Brancæ vrsinæ
 Dictamni [*videlicet Cretenfis*]
 Seminis Rutæ Aristolochiæ longæ
 Aristolochiæ rotundæ Ari
 Mabathematicum Afari
 Saluiæ [*videlicet minoris*]
 * Rosarum
 Bdellii ana ḡ xviiij.
 Epithymi Polypodii quercini
 Opobalsami [*loco eius oleum Garyophyllorū*]
 ana ḡ xiiij.
 Alypiados
 * Capparis [*id est, radice eius*] ana ḡ xij.
 Anacardii Sabinæ Gentianæ
 * Corticum rad. Mandragoræ ana ḡ x.
 Peucedani
 * Absinthii ana ḡ vij. Ireos ḡ iij. β.
 Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est
 clarum, flauum atque liquidissima tenuitatis:
 & non nigrum & crassum.

STYRACIS rubea, id est, calamita rubea:
 hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus
 & aridus, quem vocant Thymiana, atque
 malè Storacem rubeam: sed Syracis calamita
 purissima gutta, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniati, hodie dicunt Ar-
 meniaci. est autem hic duplex. Factitius, quo
 utuntur

utuntur Chymista, Aurifabri & Aerarii: atque Nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus Nativio, necesse est eius loco Salem Gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur Sal Hammoniaca factitius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Ursina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Bernklaw vocant, foliis asperis, umbella & semine Anethi, odore & sapore cimicum; radice acri & feruida: sed eam Brancam quae in Italia Ursina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MABATHEMATICOVM, aiunt esse Cauliculi silvestris succum. est autem Cauliculus seu Caulis agrestis id idem quod Cato & alii rei rustica scriptores apud Latinos Brassicam silvestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPIAS, siue Alypum, quid sit, non- B dum constat: quidam interpretantur Meze-reon, id est, Chameleam, sed falso: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires habet acres, & attramtilem per alium purgandi. possumus autem eius loco accipere Epithymum, Thymbram, aut Thymum.

P. C. SCHOL.

Huius confectionis descriptionem cum non A
esse

esse legitimam, sed corruptissimam Fuchsius
& Franciscus Alexander meritò conqueran-
tur, eam nos hîc sua integritati restituimus;
quamquam non ex Fuchsii Myrepso deprava-
tissimo, ut neque ex Francisci Apolline.

B Alypias siue Alypum.] Eius, quæ hoc no-
mine hodie cognoscitur, herbam affabrè tibi
Matthiolus in suis illis heroicis Commentariis
depictam exhibet.

CONFERT cephalalgicis, epilepti-
cis, vertiginosis, hemicranicis, para-
lysi omnium membrorum, & omnibus
frigidis ægitudinibus, tempore frigido
nocentibus.

Michleta D. Nicolai.

R. Myrobalan. citrinorum

Cebulorum

Indorum, omnium tostorum ana 3 ij. β.

Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana 3 ij.

Nasturtii tosti [id est, seminis eius] 3 ij. β.

Cumini

Anisi

Fœniculi

Ammios

Carui ana 3 j. β.

Omnia cruda terantur, & maceren-
tur in aceto vini modico xxiiij. horis,
exiccantur cum insperso aceto; postea tor-
reantur supra prunas: tostis addantur
subsequentia:

Spo-

Spodii [*id est*, Eboris vsti]

Balauftiorum

Pulpæ Sumachii Mastiches

Gummi Arabici ana ʒ j. ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & cōmisceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Propriè valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem & rugitum lenterix, & dysenterix: & optima est omni solutioni ventris.

Electuarium de Baccis Lauri,

D. Rhasis.

ʒ. Fol. Rutæ [ficcorum] ʒ x.

Ammios Cumini Nigellæ

Ligustici [*id est*, seminis eius]

Origani Carui

Petroselinii

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri Piperis longi

Menthastri Dauci Acori

Baccarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iij.

Mellis despumati triplū [i. l. j. ʒ iij. ʒ viij.]

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur
Serapinum in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem; & doloribus intestinorum ex causa frigida vel ventosa confert.

E

Diasa-

Diasatyrium D. Nicolai.

- ℞. Testiculorum Satyrii recentium den-
 forum
 Radicum Pastinacæ sativæ recentium
 Radicum Secacul [*id est, Grietzelmorn*]
 Nucis Indicæ Pinearum
 * Pistaciorum ana ʒ xij. β.
 Garyophyllorum
 Zingiberis Anisi
 Erucæ seminis
 * Lingue avis [*i. seminis Fraxini*] ana ʒ v.
 G xv.
 Cinnamomi Caudarum Scincorum
 Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.
 * Moschi G vij. β.
 Mellis despumati optimi P iij.

SATYRIUM habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam; ex his tantum sumenda sunt densa & solida.

SEMINIS Bulbi. Bulbus vulgè non est cognitus: quare eius loco Urtica semen accipere licet.

SCINCORVM. Notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis, quæ nos vocamus Wassermolchen, siue Wasser Eydexe; ut hætenus factitatum est. Veri autem Scinci iam denudè in copia afferuntur ex Alexandria Egypti, quos à Materia-
 listis expetant Pharmacopola in posterum.

POLLET contra vesicæ & renum imbecillitatem:

cillitatem: iis etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: venerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud se- gniter restituit.

Diasatyrion aliud D. Mesiae.

℞. Secacul albi & mundi, & elixati in de- cocto Cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa ℞ j.

Testiculorum vulpis [herbæ] ℥ viij.

Radicis Raphani ℥ iij.

Radicis Luph plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouilli tantum, ut lac duos digitos emi- neat, adiiciendo Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate usque ad con- sumptionem lactis, & donec omnino re- mollitæ sint radices, & habeant iustam spif- situdinem instar pultis crassioris: nam si aqueum quod in lacte & radicibus est, non consumatur, situm contrahit hoc medica- mentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis radicibus

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Succi Ceparum recentium ℞ j. *

Coque omnia simul ad perfectam deco- ctionem, deinde ab igne depone, & insper- ge sub-

E 2

ge sub-

100 CONFECTIOES

ge subsequentium specierum minutissi-
mum puluerem:

Caudarū Scinci, cū renibus & sumine, ʒ j.

Seminis Erucæ Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [*id est, seminis Fraxini arboris*]

Seminis Nasturtii Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciæ

Seminis Napi

Pulpæ seminis Asparagi maximè recentis
ana ʒ iiij.

Confice cum eis : vltimò verò adiician-
tur subsequētia:

* Pinearum mundatarum ℥ j.

Fisticorum [*i. Pistaciorum mundatorū*] ʒ x.

* Cerebellorum passerum ʒ ij.

Confice & misce omnia optimè, & aro-
matiza cum

Moschi boni ʒ j.

RADICIS Raphani, videlicet satini,
quam vocamus Rettich.

LUPH planum.] Duplex est Luph (*id est,*
Serpentaria,) crispum scilicet & planum: Cri-
spum folia habet diuisa & crispa; Planum verò
lata & plana veluti Aron, unde utrique no-
men inditum est. Vulgò autem apud nos care-
nus Luph, *id est*, vera Serpentaria: idèd eius
loco accipiēda sunt radices herba quam Aron
vocant.

A TESTICVLI vulpis] hoc loco non sunt
accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed ra-
dices

OPIATAE.

IOF.

dices Satyrii sine Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit. quæ in re quosdam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumque vapum: cuius sunt species plures, Bayerisch rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bortfeldisch rublein.

BAVCA est Pastinaca sativa sine Carota: Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICVM sine Phisticum, idem est quod Pistachium sine Pistacium.

P. C. SCHOL.

Testiculi vulpis hoc loco.] Cordus hīs Orchin cum Satyrione confundit, ut ritè inquis Franciscus Alexand. Quare Orchios dictio delenda est.

VALET ad erectionem virgæ: multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.

℞. Trochiscorum scilliticorum ʒ xlviij.
Trochiscorum de vipera, seu Pastillorum
Theriacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri
Opii Thebaici recētis ana ʒ xxviij. [al. 24]
Rosarum siccarum Scordii Cretici

Seminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ
Agarici albi Pontici [id est, in Ponto nati]

E 3.

Cinna-

Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ ficci
Opobalsami [*loco eius olei Caryophyllorum*]
ana 3 xij.

Myrrhæ Troglodyticæ

Croci Cilicii Zingiberis

Rheupontici [*id est, Rhabarbari*]

Radicum Quinquefolii

Calaminthæ montanæ Marrubii comarū

Stæchadis cacuminum & foliorum

Petroselini Macedon.

Costi recentis [*videlicet veri, non adulterini*]

Piperis albi Piperis longi

Dictamni Cretici Turis masculi

Schœnanthi [*id est, Iunci odorati floris*]

Terebinthinæ Chiæ [*i. in Chio insula nata*]

Cassia fistulæ [*videlicet Cassia lignea vera*]

Spicæ Nardi ana 3 vj.

* Gentianæ radices Polii comarum

Styracis calamitæ Seselios Massiliensis

A Abrotoni Seminis Thlaspios

Ammi Chamædryos comarum

Chamæpityos comarum

Hypocistidis succi Malobathri foliorum

Spicæ Celticæ [*id est, Spica Romana*]

Anisi Helladici [*hoc est cognomen Anisi, à regione, ubi opimum est*]

Mei Athamantici [*vulgò Mei*]

Fœniculi seminis (ni)

* Sigilli Lemnij [*aut eius penuria Beli Arme-*

Chalcitidis seminaffata

Amomi racemi Acori radices

Phu

PhuPōtici [*accipe verū, quod in hortis colitur*]

Carpobalsami Hyperici cacuminum

Acaciæ liquidioris Gummi vermiculatū *

Cardamomi ana ℥ iiij.

Dauci Cretici Galbani puri

Opopanacis Sagapeni Perfici

Bituminis Iudaici [*id est, Asphaltis*]

Centaurii minoris comarum Castorii

Aristolochiæ tenuis ana. ℥ ij.

Vini veteris odorati, quantum liquoribus
& gummis dissoluendis satis fuerit.

Mellis despumati optimi triplum; hoc est
℥ xiiij. ℥. vj. ut sequetur paulo pōst.

Confice sic: Cinnamomum Crocumque
(ut Aëtius vult) vnumquodque per se te-
rito, & si voles etiam Rhabarbarū & Hedy-
chroos Trochiscos: misce deinde inuicem
optimè: postea reliquas herbas ac radices,
& omnia arida similiter tūdito, semper si-
milis cum suis similibus; aromata per se,
ac reliqua etiam per se seorsum. Postea (si
Aëtium imitari est animus) Crocum, Ca-
siam, Cinnamomum, & Lemniam terram
in pila cū vino optimo tere atque vnito, ac
reliqua omnia secundum artem addito; &
melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui, simili
ferè ratione:

R. Piper nigrum Piper album
Piper longum Iridem Illÿricam
Zingiber Costum

E 4

Amo-

Amomum [*aut eius succedaneum*]

Acorum Cardamomum Carpobalsamum.

Incidenda minutim cōcidito, & in minutissimum puluerem conterito, & per angustissimum cribrum excernito: postea in scatula diligēter, ne exspiret, obstructa reponito, donec reliquis admisceas. Postea

℞. Radices Quinquefolii Gentianam

Meon [*aut eius succedaneum*] Phu

Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū*]

Aristolochiæ tenuis radicem Rosas

Trochiscos scilliticos

Trochiscos de vipera

Scordium Calaminthen montanam

Marrubii comas Stœchadis comas

Dictamnium Creticum Schœnanthum

Polii montani [*minoris*] comas

Abrotonum Chamædryos comas

Chamæpityos comas

Nardum Celticam Hyperici comas

Centaurii minoris comas, atque

Castorium, & semina omnia;

Concidito omnia minutim, teritoque in tenuissimum puluerem, & per angustissimum cribrum excutito. Excussum puluerem prædicto quem reposuisti adicito, diuque donec perfectè commisti sint, in mortario terito; adhibita diligenti cura, ne quid inter tundendum excernendumq̃ pereat, aut temerè ponderi decedat: mox è mortario exemptum puluerem iterum ne exspiret

exspiret reponito, vsque quò omnia conficiantur. Interea R^z Agarici optimi albisfimi, atque in longa rectaq. capillamenta fissilis, frusta electa: ab his scobē deradito. ʒ ij. sed quia non facilè per se tunditur, neque etiam cum aliis, propterea quòd in puluerem volatilem resolutus euanescit, ita vt multum ponderi eius decedat; ideo ad scobem Agarici prædictam infunde optimum vinum, & fac Trochiscos minatos in tepida vmbra exiccandos: exiccatos minutissimè contundito, atque per cribrum excernito angustissimum: excreti deinde Agarici cape pondus, quod requirit compositio, videlicet ʒ xij. & prædicto pulveri summa diligentia commisceto: quo facto,

R^z. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mistis superinfundito vini optimi quātum dissoluendis atque eliquandis succis satis fore coniecero: exprimito: postea per rarum colum liquefactam & modicè calefactam pulticulam colato, ita vt nihil præter sordes in colo remaneat. Quod si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisq. pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facilè aestimare quis potest: quod in sequentibus densatis liquoribus

E 5 etiam

106 CONFECTIONES
etiam obseruandum est. Deinde

℞. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modeste supra prunas dissoluantur, & perrarum linteum fortiter exprimantur: his dissolutis,

℞. Tus masculum

Bitumen Iudaicum. terantur quàm minutissimè poterunt, addendo Terebinthinam, & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem: dissoluantur lento admodum igne, cum mellis despumatis sufficienti copia; & ita calidam pulticulam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne rursus in grumos concrecant Tus & Bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquid de contusorum puluere est admiscendum.

Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere diffidas, Bitumen & Tus vnà cum reliquis aridis tundito, & tantùm Styracem atque Terebinthinam dissoluito, atque melli despumato calenti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum*]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito in tenuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rheon

Rheon siue Rhaponticum, (id est, quod
hodie Rhabarbarum vocatur;) & vnum-
quodq; seorsum tūdito, deinde iis misceto
Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi
Casiæ Spicæ Nardi
Crocī & Rhei Pontici, pulueres, diligen-
tissimè:

Postea

Rx. Mellis optimi & aromatici, quale è
Lithuania Dantiscum affertur: despume-
tur sedulò: despumati postremò mellis su-
me ℥ xiiij. ʒ vj. ex eo modicum infunde in
amplum alenum ex aurichalco factum, &
insperge paulatim commistos paulo ante
Trochiscorum Hedychroi, Cinnamomi,
Casiæ, Spicæ, Croci & Rhei Pontici pul-
ueres; alternis vicibus, mel despumatum
tepidum, atque pulueres iniiciendo: quæ
diligentissimè interim pistillo ligneoagi-
tanda sunt. Cū hæc optimè fuerint com-
mista, & floridum puniceumque colorem
contraxerint, iniicito Lemniam terram
anteà subtilissimè per se, deinde cum vino
tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam;
quam hoc modo assabis: Accipe purissimæ
Calcididis circiter ʒ iij. eam in fictile non
ita profundū iniectam, supra prunas po-
nito, donec liquefiat & bulliat: deinde
ab igne auferro; & abiicito id quod in su-
perficie durū est atq. rufescit, & ex medio
eius sume ʒ iiij. & cum vino tritam atque

E 6 dissolu-

dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti; alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos primò contriuiisti, iniiciens; simul etiam admisce Styracem Terebinthinamque & Opobalsamum; ita ut omnia exactissimè admisceantur: atque sigillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnā substantiam redacta sint; assiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi.

Postquam verò optimè totam confectio-
nem amiscueris, indito in vas ex densa materia factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannum appellant: oportet verò ut tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, ut efferuescens medicamentum attollere se queat, nec effluat. Reponendum autem est hoc medicamentum, donec feruescat, in tepido & sicco loco: postquam verò subsederit, in frigido & sicco loco conseruandum erit. Porro ego hac ratione præparaui Theriacen: alii verò paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè faciunt, qui succos & liquores & reliqua omnia simul tundunt, & postea tusum puluerem impuro melli incoquant. Animaduertendum etiam est, ne vini plus quàm opus sit liquoribus & succis dissoluendis adfundatur. Nam si ultra modum vinū succis ad-

cis addatur, situm contrahet Theriaca: propterea etiam non cōsueui Casiam, & Crocum, & Cinnamomum vino permiscere, sed mel. nam aquosius est vinum nostrate: quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de Compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctū mustum, hoc est, sapam, passum aut defrutum: quibus tamen non assentior. Nam hęc vina sunt spissiora, quàm vt in eis concreti atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius tantum rei gratia vinum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

Hęc descriptio est sumpta ex Aëtio: paulò post ponetur ea quam transtuli ex Graco carmine Andromachi senioris.

VIPERAE serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychroi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior, qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Graco.

SCORDII Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadryi similis, odore aliquo Allii, & nullo modo Allium silvestre, vt hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

110 CONFECTIOES

BYNIAs, id est, *Napus* : quid verò sit *Napus*, dictum est in *Diasatyrio Mesua*, & antea etiam.

MYRRHAE *Troglodytica*. *Troglodyta* populi sunt *Arabibus* vicini : apud quos optima nascitur *Myrrha*.

OPOBALSAMO vero caremus : ideoq; eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum *Garyophyllorum*.

CROCI *Cilicii*, id est, in *Cilicia Asia* regione nati. & idem est quod *Crocus Orientalis*.

RHAPONTICVM hoc loco significat *Rhabbarum* : nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

COMAE sunt folia & flores plantarum.

PIPERIS longi. *Andromachus senior* hoc loco habet *PIPER* nigrum : Iunior verò *Andromachus*, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi *Piperis* inuertit; quem in hac compositione sequimur, paulo post etiam Senioris *Itheriacen* adscripturi.

DICTAMNVS *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acris ut *Thymus* : offertur rursum ex *Creta* insula ad nos.

CASIA fistula hoc loco significat *Casiam* ligneam veram, qua iam iterum offertur, est q; *Cinnamomo* similis.

POLIVM montanum duplex est : unum pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum : alterum candidius, & rectius se attollens.

Maius nascitur apud nos ; minus offertur ex Monte

Monte Pessalano: & ha sunt veri Polii species, & totam hiemem virent, ut *Laundula* aut *Thymus*. Vulgò non habuerunt verum *Polium* *Pharmacopola* usque ad hoc tempus.

STYRAX, id est, *Storax calamita*. Accipienda autem est hoc loco purissima eius resina in micis concreta.

SESELI, id est, *Sileris montani*. Dicitur autem *Massiliense*, à prouincia *Massiliensi*, in qua prouenit optimum.

THLASPI est species agrestis *Nasturtii*, quæ passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent *Pharmacopola*. Vocatur Germanicè *Vvegacressen*.

CHAMÆPITYS vera est *Iua*. herba est tenuibus foliis, floribus paruis & luteis: nascitur copiosè ad *Rhenum* in *Franconia*, in vineis & agris quiescentibus; præsertim *Spira*, *Vuormacia*, & *Vuirtzburgi*, & aliis locis.

MALOBATHRVM est *Folium Indum*, cuius succedaneum est *Spica tam Indica quàm Celtica*.

MEV, seu potius *Meum* non habemus: loco eius sumimus *Seseli Creticum*, id est, *Bervurtz*, aut potius *Sison* hoc loco: inferiùs enim sequitur *Daucus Creticus*.

SIGILLVM Lemnium, id est, terra *Sigillata*, quæ signatur in *Lemno insula*, in qua effoditur hac terra: in cuius defectu sumatur belus *Armenus Lenanticus*, [seu *Orientalis*.]

CHAL-

112 CONFECTIOES

CHALCITIS hodie non à quouis cogno-
scitur: est autem Vitrioli nativi species. Hac
qui carent, accipere possunt Vitriolum viride
optimum, quale est Goslarianum in Saxonia.
Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida
Theriaca miscuisse, nigri coloris gratia: qui
color ab omnibus in Theriaca requiritur sine
aliqua ratione. Mihi itaque videtur non neces-
sario eam addi. Nam horribili & aruginoso sa-
pore totam compositionem inficit. At cum ego
aliquando in Theriaca compositionem non adie-
cissem Chalcitida, saporem gratiorem acqui-
sit hoc medicamentum. Consulantur igitur
hac de re Doctores Medici.

AMOMO vero caremus: eius loco acci-
pimus Carpesium, aut Acorum verum, id est,
nostrum Calamum aromaticum.

ACORVS verus, est illa radix quam ho-
die falsò vocant Calamum aromaticum.

ACACIA, succus est fructus ex arbore, à
qua distillat gummi Arabicum. Loco eius acci-
pimus siluestrium Prunellorum succum inspissa-
tum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gum-
mi, quod concretum est in grumos vermium fi-
gura.

DAVCI Cretici vice accipere licet Sefeli
Creticum, id est, Beruvurtz; videlicet radicem
eius.

SAGAPENYM hodie vocant Serapinum;
quod in Perside optimum provenit. Senior An-
droma-

Abrochus Sagapeni habet 3 iiij.

junior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.

P. C. SCHOL.

Abrotoni] hanc dictionem, in *Aëtio à Cornario* verso, non reperio.

Rhaponticum.] Idipsum à *Rhabarbaro* differre, alibi diximus. Radix autem illa magna qua *Rhapontici* nomine in officinis passim prostat, *Centaureum magnum* *Dioscoridis* est.

Chalcitis.] *Chalcitida* commodè ac necessario semper *Theriaca* immiscendam esse, unà cum *L. Fuchsis*, & *Franc. Apolline* censemus: Simulq; somnium esse, aruginosum & horridum eius saporem in *Theriaca* præceteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. *Rationibus* autem hæc aliq; qua scholiis profero, confirmare, compendii egestas cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint *Superi*, ea omnia asseruantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris cōtragera egritudinum plurima. Valet enim ad gravissimas passiones totius corporis humani: *Epilepticis*, *catalepticis*, *apoplecticis*, *cephalalgicis*, *stomachicis*, *hemicranicis* prodest. Ad *raucedinem vocis*, & *constrictionem pectoris* optima est: *arteriacis*,
asthma-

asthmaticis, hæmoptoicis, ictericis, hydro-
piciis, peripneumoniciis, iliofis, & vulnera in
intestinis habētibus: Nephriticis, calculo-
* fis & colicis subuenit. Menstrua educit, &
fœtum mortuū expellit. Lepras, & variolas,
* & frigus periodicum, & cæteras passiones
inueteratas emendat. Præcipuè contra om-
nia venena & serpentium morsus & repti-
lium valet. Sed diuersa est eius dosis pro
quantitate & qualitate vniuscuiusque pas-
sionis. Omnem defectionem sensuum re-
leuat. Cor, cerebrum, hepar, stomachum
confortat. Totum corpus incorruptum du-
cit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-
mine eiusdem elegiaco translata.*

℞. Trochiscorum Scilliticorum ʒ xlviij.
Trochiscorū Theriacorum Piperis longi
Liquoris Papauerini [*id est, Opii*]
Magmatis Hedychroi ana ʒ xxiiij.
Foliorum Rosarum siccarum
Iridis Illyricæ [*id est, Ireos*]
Cyaneæ Glycyrrhizæ
Seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beye-
rische rublein*]
Scordii
Liquoris Balsami [*loco cuius oleum Garyo-
phyllorum*]
Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ

Myrrhæ Costi Croci Coricii
 Cassiæ [*id est, Cassia lignea vera, aut succedanei eius*]
 Nardi Indicæ
 Anici Arabici [*id est, Schœnanthi*]
 Auris [*videlicet masculi & electi*]
 Piperis candidi Piperis nigri
 Comarum Dictamni [*id est, foliorum & florum Dictamni Cretici veri*]
 Marrubii
 Rhei [*i. quod hodie vocatur Rhabarbarum*]
 Stœchadis
 Petroselini [*id est, seminis eius*]
 Calaminthæ [*i. Calaminthi montani tenuis*]
 Lachrymæ Terebinthi Libystiadis (folii)
 Zingiberis
 Quinque folii [*i. radicum eius*] ana ʒvj.
 Polii [*videlicet montani & albi, quod è Lugdunensis affertur*]
 Chamæpityos
 Styracis [*i. Styracis calamita, sincera & electa*]
 Mei [*quod vulgò Mœus vocatur*]
 Amomi racemosi [*aut succedanei eius, ut supra*]
 Nardi Galaticæ [*id est, Celtica*] (præ)
 Rubricæ Lemniæ [*id est, terra sigillata vera, aut Boli Armeni, ut supra*]
 Phu Pontici
 Chamedryadis Creticæ [*i. Chamedryos vera*]
 Foliorū Malobathri [*eius loco ponatur Macis*]
 Chalcitidis tostæ
 Radicis Gentiadis [*id est, Gentianæ*]
 Anisi

Anisi Succum Hypocistidis
 Fructus Balsami [*id est, Carpobalsami; pro
 quo etiam succedaneum sumatur, sicut supra
 facta est mentio*]

Gummi splendidi Seminis Fœniculi
 Cardamomi Indici [*id est, minoris*]
 Seselios tenuis Lachrymæ Nigræ spinæ
 Thlaspios Hyperici Ammios
 Sagapeni ana ʒ iiij.
 Castorei Aristolochiæ tenuis
 Seminis Dauici Bituminis
 Liquoris Panacis [*id est, Opopanacis*]
 Centaurii [*videlicet minoris*]
 Chalbanidis pinguis [*id est, Galbani re-
 centis & puri*] ana ʒ ij.

Confice cum vino & melle. Haftenus An-
 dromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum li-
 quoribus & succis dissoluendis satis fore
 conieccheris, ut proximè dictum est. Mellis
 verò optimi accipe ℥ xiiij. ʒ iiij. ita detra-
 his Mellis ʒ iiij. de priori Theriaca, quia
 huic desunt Abrotoni & Acori ana ʒ iiij.

Confice autem & hanc Theriacam ut
 proximam.

*Andromachus, Neronis medicus, primùm con-
 didit medicamentum hoc : eiꝯ declarationem
 heroicis carminibus descriptam, nuncupauit. Sed
 Galenus mutata forma, compositionem reddi-
 dit meliorem.*

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci
 de vipe-

et vipera siue de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychrom, i. Trochisci hedybroi, quos Auicenna vocat Alindaracaron: uorum compositionem in tractatu de Trochiscis inquire.

CYANEÆ, id est, Carulea vel nigra Glycyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quæ nigrum colorem habet. Intelligis autem Andronachus succum Glycyrrhiza.

CROCVS Coricius, id est, in Corico Sicilia monte nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMÆ Terebinthi Libystiadis, id est, Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica regione nata. Eius loco nos accipere possumus Laricis resinam, quæ ubique in Germania Terebinthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere Seseli Creticum, id est, Beruvurtz; aut semen nigrum & odoratum, quod hodie vocant improprie Amomum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris, sed ea herba quæ in Hestia vocatur Theriacskraut, vel Gartenseliunck.

MALOBATHRVM non habemus: eius loco accipe Spica Romana radículas, vel Spica Romana & Macis ana partes equales, ut Arabes precipiunt; vel Cassiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentiane, à Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam primum inuenisse creditur.

GVMMI splendidi, i. mundi, sinceri & translucidi,

lucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel cerulea spina, est arbor quæ aliàs dicitur Spina Ægyptia: ex qua manat gummi Arabicum. Per lachrymam verò eius Andromachus intelligit succum eius, qui Aacia vocatur, & fit ex fructu siliquaceo huius spina: eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est. Germanicè vocatur Beruvuriz. Potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. Hoc loco eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quòd his accipiantur in hanc compositionem. Est autem Seseli Creticum, quod Germ. vocatur Beruvurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento: cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

Theriaca Diatessaron D. Mesue.

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Mellis despumati optimi ℥ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa
radix

radix quam nos *Holvuriz* vocamus: sed alia multo maior & tuberosa, intus solida, colore buxi flava, odore & sapore similis *Aristolochia longanostri*. Affertur ex Italia & Heluetia.

THERIACA antidotus *Diateffaron* ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralyfim, spasmus cynicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam concoctionem: tum denique hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem. Præterea morsui *Scorpionis*, & potioni veneni confert.

Mithridatium, ex *Damocratis Græco*
carmine in *Latinam linguam*
translatum.

℞. Myrrhæ Arabicę Troglodytidis
Crocī Agarici Zingiberis
Cinnamomi Spicæ Nardi
Turis [videlicet electi]
Thlaspios ana 3 x.
Seselios
Opobalsami [aut oleum Garryophyllorum]
Schœni [id est, Squinanthi, ut hodie vocant]
Stœchadis Terebinthinæ Chalbani
Costi [videlicet veri & aromatici]
Piperis longi Castorei Pentici
Succi Hypocistidis Styracis bonæ
Opopanacis

Folii

Folii Malobathri recentis [*aut succedanei eius*] ana ʒ viij.

Cassiae nigrae [*lignae aut succedanei eius*]

Polii Piperis albi Scordii

Seminis Dauci Cretici

Fructus Balsami [*aut succedanei eius*]

Cypheos Bdellii ana ʒ viij.

Nardi Celticae purgatae Gummi

Petroselini [*id est, seminis eius*]

Opii papaueracei

Cardamomi Seminis Foeniculi

Gentianae Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ʒ v. boni ponderis.

Anisi Arii

Acori [*sive Calami aromatici*]

Phu Sagapeni ana ʒ iij.

Mei Athamantici Acaciae

Ventris Scinci [*videlicet veri*]

Fructus Hyperici [*id est, summitatum eius*]

ana ʒ ij. ʒ.

Vini quantum sufficit.

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem.] In Græco est σὺμμετρον, quod idem significat. Sint autem mellis optimi odorati & dispumati ʒ ix. ʒ viij. ʒ ij.

CIPH I sunt Trochisci qui ad odorem susciuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

N A R-

NARDVS Celtica, est Spica Romana. Purgata, id est, à paleis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.

ARIU, in Græco est Αῖρις, id est, Ariu, quod nomen apud nullum alium auctorem in Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit autem Damocrates per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum, quantum ego ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.

ACACIA vera caremus: accipe ergo loco eius succum Prunellorum, diligenter spissatum; aut alium quendam, quem Doctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Arii.] Asari potius legendum esse, ex Græcis nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est in qualitate & virtute Theriacæ, & parum differunt: nisi fortè quòd Theriaca est parum calidior, & potentior contra venena serpentum. Curat omnes passionnes capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte: & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemicranicis confert, & dolorem supercilii patientibus & lachrymantibus oculis: & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit. Dentium doloribus & palato, & omnibus vitis

F

tius

tiis oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & itidem ad modum emplastri ponatur in temporibus, vnde fit discursio. Synanchen soluit. Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis confert; si datur cum decoctione balaustiorum: Extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hypochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit: Arthriticam atque Ischiasin patientibus, & podagricis singulare præsidium est. Præcipuè datur contra venena omnia. Venenatos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum, cum magna admiratione emendat. Quotidianariis & quartanariis etiam ante horam accessionis cum vino tepido datum, mirificè prodest.

*Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro
& Antipatro, Galenus & Aëtius
exscripserunt.*

R. Myrrhæ ʒ vij. β. ω iiij.
Nardi tantundem

Croci

Croci ʒ vij. s iij.
 Opii ʒ iiij. s ij. β.
 Styracis ʒ v.
 Cinnamomi ʒ vij. s iij.
 Castorei ʒ vj. s j.
 Polii ʒ vj. s iij.
 Scordii ʒ vij. s iij.
 Zingiberis tantundem.
 Costi ʒ vj. s iij.
 Piperis albi ʒ v. s ij.
 Piperis longi ʒ vj. s iij.
 Sefelios ʒ v. s ij.
 Abrotoni tantundem
 Petrosellini [*videlicet seminis*] ʒ iiij.
 Dauci seminis ʒ vj. s iij.
 Cassiæ ʒ v. s iij.
 Turis ʒ vj. s ij.
 Succu Hypocistidis ʒ vj. s j. β.
 Nardi Gallicæ ʒ iiij.
 Fœniculi seminis ʒ iiij.
 Nardi Indicæ ʒ iiij.
 Acori [*aut Calami aromatici*]
 Phu Pontici Sagapeni
 Fructus Balsami [*aut succedanei eius*]
 Hyperici
 Iridis Illyricæ [*id est, Ireos*] ana ʒ ij.
 Rubricæ Lemniæ [*loco eius Bœtus Lenanti-*
cus] ʒ vj.
 Lumborum Scinci [*videlicet veri*]
 Cypheos ana tantundem, id est, ʒ vj.
 Acaciæ Gummi Cardamomi
 F 2 Pele-

124 CONFECTIO NES

Pelecini ana 3 ij.
 Thlaspios 3 vj. s iiij.
 Gentianæ 3 iiij. Anisi 3 iiij.
 Rosarum siccarum 3 iiij.
 Mei Athamantici tantundem
 Schoeni [*id est, Squizanthi*] 3 vj. s iiij.
 Opopanacis 3 vj.
 Galbani 3 vj. s iiij.
 Opobalsami tantundem [*cuius loco, ut su-
 præ, oleum Garyophyllorum*]
 Aristolochiæ [*videlicet rotunda vera*] 3 j.
 Hyssopi 3 iiij.
 Marrubii 3 j.
 Chamæpityos 3 iiij.
 Libanotidis 3 v.
 Terebinthinæ 3 vj. s iiij.
 Mellis Attici quod sufficit.
 Vinum ne addas. Haftenus Cleopphantus
 & Antipater.

Mellis autem despumati optimi & odo-
 ratum sume ad totam confectio nem l' vij. 3
 vj. 3 vj. Vinum ne addatur præcepit Cleo-
 phantus: ideò in aceto sunt dissoluendi
 liquores concreti, ut Sagapenum, Opopa-
 nax & Galbanum. Confice secundum ar-
 tem.

MELLIS Attici nobis copia non fit:
 ideòque aliud, quod optimum fuerit, recipien-
 dum erit.

Compositio hæc est valdè mendosa in pon-
 deribus apud Aëtium: apud Galenum verò
 est emen-

est emendatior. Rarsum simplicium numero aliqua desunt apud Galenum, qua ex Aëtio confectioni huic restitui. Aëtius hunc Auctorem vocat Cleopatrum, Galenus verò Cleopphantum.

~ Hic character significat obolum: est autem obolus pondus \varnothing s. scrupuli videlicet dimidium: itaque vj. oboli faciant 3 j.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spicam Nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, Folium Indum, quod Nardi est species, & in India gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, Folium Indum, cuius loco accipe Cassiam ligneam veram, qua Cinnamomo est similis; aut Macie & radicem Spica Romana ana 3 ij.

ACORI, id est, radicis quae nunc improprie vocatur Calamus aromaticus.

PELECINI, i. seminis eius. In eius pentarion accipe semen Nigella agrestis & cornuta. Est autem omnino similis vere Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species. Semen autem eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

Nardi Indicæ.] Galenus & Aëtius hic A non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

Mithridatium D. Andromachi.

Rz. Glycyrrhizæ	ʒ	vij.	ß.	℥	iiij.
Opii	ʒ	iiij.	℥	ij.	
Castorei	ʒ	vj.			
Polii	ʒ	v.	℥	ij.	
Costi	ʒ	v.	℥	ij.	
Nardi Spicæ	ʒ	vj.	℥	ij.	
Cassia [<i>videlicet vera</i>]	ʒ	v.	℥	ij.	
Turis	ʒ	vj.			
Seselios	ʒ	v.	℥	ij.	
Succi Hypocistidis	ʒ	vj.			
Acori [<i>id est, Calami aromatici</i>]	ʒ	ij.			
Scordii [<i>videlicet veri</i>]	ʒ	vj.	℥	ij.	
Folii [<i>loco eius sumatur Macis</i>]	ʒ	iiij.			
Gallii	ʒ	v.	℥	iiij.	
Cypheos	ʒ	vj.	℥	ij.	
Myrrhæ	ʒ	vj.			
Croci	ʒ	vij.	℥	ij.	
Cinnamomi	ʒ	vij.	℥	ij.	
* Styracis [<i>videlicet optime</i>]	ʒ	v.	℥	iiij.	
Dauci seminis	ʒ	vj.	℥	iiij.	
Zingiberis	ʒ	vij.	℥	ij.	
Phu Pontici	ʒ	ij.			
Petroselini [<i>videlicet seminis</i>]	ʒ	iiij.			
	℥	iiij.			
Nardi Gallicæ	ʒ	iiij.			
Foeniculi seminis	ʒ	iiij.			
Nardi Indicæ	ʒ	iiii.			
Hyperici	ʒ	ij.			
Acaciæ					

Acaciæ ʒ ij.
 Gentianæ ʒ iiij.
 Anisi ʒ iiij.
 Thlaspios ʒ vj. ∞ iiij.
 Mei Athamantici ʒ iiij.
 Rosarum siccarum ʒ iiij.
 Gummi [*videlicet Arabici*] ʒ ij.
 Cardamomi ʒ iiij.
 Schœni [*id est, Squimanthi*] ʒ vj. ∞ ij.
 Opopanacis ʒ vj. ∞ ij.
 Opobalsami. [*sive olei Garyophyllorum*]
 ʒ vj. ∞ iiij.
 Galbani ʒ vij.
 Scinci [*videlicet veri*] ʒ ij. ∞ ij.
 Terebinthinæ ʒ vj. ∞ ij.
 Vini Chii quod sufficit.
 Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est,
 P vj. ʒ iiij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat : Folium Nardi videlicet; aut Malobathrum, quod hic recipiendum est.

GALLION herba est multis minimisq; floribus luteis & odoratis. Est autem species Aspergula : Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Malobathrum, id est, Folium; sed radicem Indice Nardi: nam Nardi partes tres olim in usu fuerunt; videlicet Radix, Folium & Spica. Antea vero precepit in hanc compositionem sumendam esse Spicam Nardi, & Folium,

F 4

id est,

*id est, Malobathrum: ideò necessariò hoc loco per
Indicam Nardum intelligit radicem Indica
Nardi.*

Esdre antidotus, ex Aetio.

R. Amomi	℥ xij.
Florum Iunci odorati [<i>id est, florum Schœ- nanthi: eorum loco sume summitates Schœ- nanthi</i>]	℥ ix.
* Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ Troglodyticæ	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselini	℥ iij.
Seminis Dauci	℥ iij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [<i>id est, Ireos</i>]	℥ xv.
Seminis Fœniculi	℥ vj.
Bdellii	℥ ix.
Turis	℥ j.
Sulphuris viui	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Cassia lignæ [<i>aut succedanei eius</i>]	℥ ix.
Seminis Papaueris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
Seminis Rutæ	℥ iij.
Seminis Ocimi	℥ iij.
Rhois Culinarii	℥ lv.
Seminis	

Seminis Anethi	℥vj.
Asari [<i>id est, radicem eius</i>]	℥j.
Seminis Cardamomi	℥vj.
Opii	℥xxvij.
Euphorbii	℥vj.
Piperis nigri	℥xxx.
Rosarum siccarum	℥ix.
Phylli [<i>id est, Folii</i>]	℥xij.
Opobalsami [<i>sive olei Garyophyllorum</i>]	℥xxiiij.
Ventris Mergi	℥vj.
Iaceæ	℥xij.
Lycii Indici	℥xij.
Garyophylli	℥xij.
Stercoris reperti in aluo Mergi	℥vj.
Rheu Pontici [<i>i. Rhabarbari</i>]	℥xij.
Mei Athamantici	℥vj.
Floris Nerii	℥iiij. β.
Terræ Cimoliæ	℥xij.
Succi Artemisiæ	℥xx.
Foliorum Seridis [<i>i. Cichorea</i>]	℥ix.
Spicæ Celticæ	℥xij.
Castorei	℥iiij.
Costi	℥xij.
Gentianæ	℥xij.
Confectionis Hedychroi	℥ix.
Anisi	℥vj.
Sisonis	℥xviij.
Thymiamatis Ammoniaci	℥xij.
Foliorum Citri	℥xij.
Vini veteris odorati quantum satis fuerit	
F 5	

fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit, interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiiciemus. Itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi ℥vj. 3 vij. 3 ij β.

Arida omnia minutissimè contundito.

Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Ammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Artemisię succum. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficies, quo Theriacam: & eodem modo dimittenda est vt efferuescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra compositiones; alteram magna, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confusa & indigesta tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coëuntibus simplicibus constat, ideò nolimus eas hic ascribere, his duabus eius receptis paulò exactiùs compositis contenti.

RHOIS Culinarii, id est, Sumach; videlicet pulpae eius, sine offeis seminibus.

PHYLLI, id est, Foliū. Cuius loco pone Spica Romana, Macis ana 3 vj.

TERRA Cimolia. Eius loco accipe Bolum verum preparatum,

SISON

SISON est semen illud nigrum quod Apio simile est; & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi Hammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachicis Mergi. Germanice vocatur ein Taucher.

NERION, i. arbor Oleander: pro cuius floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Aëtio rosarum Rhododaphnes; sed idem est quod flos Nerii: ideo alterum tantum eorum posuimus.

Mirifice contra lethalia venena prodest: aliosque usus multos habet, quos apud Aëtium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11. Actuarius in libro De comp. medic. reperies.

Esdra Antidotus ex Actuario.

R. Mameræ	℥	j.	
Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aromaticum]	℥	ij.	
Iunci odorati [id est, Squinzanthi]	℥	β.	
Pyrethri	Θ	viiij.	
Crocī	℥	j.	
Myrrhæ	℥	iiij.	
Styracis	℥	β.	Θ ij.
Petroselini	Θ	iiij.	
Tragacanthæ	℥	j.	
	F 6		Succi

Succi Hypocistidis ʒ iij.
 Ireos ʒ β. ʒ ij.
 Seminis Fœniculi ʒ j.
 Folii [aut succedanei eius] ʒ iij.
 Radicis Ponticæ [id est, Rhabarbari]
 Rosarum siccarum Glycyrrhizæ
 Florum siluestris Punicæ
 Cinnamomi ana ʒ iij.
 Nardi Celticæ ʒ j.
 Mellis despumati p vi. ʒ ix. ʒ vij.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico: Tragacantham verò per se etiam dissolue; & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

Mamera loco sume Doronicum Romanum. Florum siluestris Punica, i. florum Balaustrorum.

CONDITA.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri
 Arantia integra Cortices Arantiorum
 Flores Arantiorum Limones.

Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam Chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum; Limones verò multa semina, &c.

(lani
 Chebuli Myrobalani Bellerici Myroba-
 Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani
 Indi

Indi Myrobalani.

Omnēs quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condite.

Nuces moschatę integrę, vt ex India afferuntur.

Iuglandes Citonia Mespila

Pyra moschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis, vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [*id est, verus Acorus*]

Galanga Zingiber Enula campana

Secacul [*id est, Siser: Germanicè Gritzelmorn, Clingelmorn*]

Eringium

Pimpinella [*nostra*]

Crethami [*agrestis radix.*]

CRETHAMVS agrestis herba est, Eringii propemodum foliis: Germanicè vocatur Sichelmoren, & Sichelkraut: nascitur in agris pinguibus.

Omnia diligenter Saccharo clarificato condiantur secundum artem.

CONSERVÆ.

Anthos [*id est, flos Rosmarini*]

Boraginis Buglossi

Cichorii Fumi terrę Lauendulæ

Maioranæ Melissæ Menthæ

Nymphææ seu Nenupharis

F 7

Primulæ

Primulæ veris. *Primula veris, idem est quod
herba Paralysis.*

Rosarum Pæoniæ
Violarum Cardui benedicti
Liliorum conuallium
Florum Tiliæ Euphragiæ
Sambuci Hyssopi Acerosæ
Betonicæ Scabiosæ Saluiæ.

Flores minutissimè incidantur : & singulis libris florum addantur Sacchari albißimi libræ duę, videlicet qui humidi & mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus verò, quales sunt Anthos, Lauendulæ, Maioranæ, Melissæ, Saluiæ, Menthæ, & similibus, addantur Sacchari albißimi libræ duæ & semis.

Diacitonium simplex.

℞. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis resolutorum, & ad spissitudinem coctorum,

Sacchari albißimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti ana ℞ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam; & extendatur in tabulam feruens massa: refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℞ carniū Citoniorum addunt sex ℞ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Ci-

℞. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iij. Coque Citonia super vaporem aquæ dulcis : deinde vnâ cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticat [seu adstringit] & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat stomachum, virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum; & ad vomitum compescendum, post cibum.

Diacitonium compositum

D. Nicolai.

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℥ iij.

Mellis despumati ℥ iij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deposueris, antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi	℥	j.	β.
Zingiberis	℥	j.	
Piperis			
Galangæ ana	℥	β.	
Garyophyllorum			
Nucis moschatæ ana	℥	iiij.	
Spicæ Nardi	Ligni Aloës	Macis	
		Carda-	

Cardamomi ana ʒ ij.

Zedoariæ ʒ j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quando ut aluum soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammoneæ ʒβ. quæ bene trita subigatur composito.

M E L habet Nicolaus : ego potius consulerem ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quedam exemplaria habent Mellis lib. ij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus pervenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conservativum habeant.

Hoc est calidius, & melius ad ea quæ diximus. Resolvit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorem; & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

℞. Succi Citoniorum despumati ℥ xij.

Mellis optimi despumati

Sacchari albissimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab igne remotis & adhuc repentibus insperge subsequentium specierum pulueres minutissimè tritos, & per cribrum excussos:

℞. Cinna.

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Galangæ ana ℥ ij.

Radicularum Nardi Celticæ

Piperis nigri Ligni Aloës

Macis Zedoariæ Cubebarum

Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

SYRVI.

Syrupus de Duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselini

Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

VISCERA obstructione laborantia
referat.*Syrupus de Quinque radicibus.*

℞. Radicum Apii Radicum Fœniculi

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi ana ℥ iiij. A

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

CON-

CONFERT febris pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

A Ana ζ iiij.] Sacchari quod in hunc Syrupum recipitur, perpensa quantitate, nimiam non esse hinc radicis cuiusque unciam quatuor assumptionem, industriè Cordus existimauit; Fuchsio quamquam secus videatur.

*Syrupus Acetosus simplex, ex
descriptione Mesuæ.*

R. Aceti vini P iiij.

Sacchari clarificati in aqua P v.

Coquantur secundum artem.

EST communis ad omnem materiam. Digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duos mollit, ineptos euellit: ubique penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febris pestiferis iuuat: Sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

*Syrupus Acetosus compositus,
D. Mesuæ.*

R. Radicum Fœniculi Radicum Apii
Radicum Endiuæ ana ζ iiij.
Seminis

Seminis Anisi Seminis Foeniculi
 Seminis Apii ana ʒ j. *
 Seminis Endiuiae ʒ iiij.
 Aquæ quantum sufficit. *
 Sacchari optimi l' iiij.
 Aceti acerrimi p ij.

Coquantur secundum artem.

B I L E M crassam & auulso difficilem, ac
 pituitam incidit, terget: obstructa hepa-
 tis, lienis, renam aperit.

Syrupus acetositatis Citri.

R. Acetositatis mali Citrei per pannum A
 destillatæ p vj.

Sacchari albissimi p iiij.

Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupum
 acetositatis Citri verum: nam plerumque ven-
 ditur pro eo Syrupus Citreorum conditorum.
 Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet
 ut per filtrum aut pannum destilletur acetosi-
 tas Citreorum, sine vlla vi aut expressione:
 alioqui coagulatur, cum refrixerit, Syrupus.

P. C. S C H O L.

R. Acetof. mali Citrei l' vj. &c.] p vj. A
Fuchsius, & Sacch. lib. v. legi vult. Verum
 cum Cordus in hac Syrupi descriptione Mesuem
 non sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo
 Marte eandem descripserit; frustra conqueri-

tur Fuchsius. Mesues autem nomen in scriptione
eius additum fuisse, ut & Syrupo de Agresta,
scriptoris vitio id factum fuisse hinc liquet.
Quare utrobique id ipsum à me deletum est.

ÆSTVM ac feruorem bilis flauæ, fe-
briumque ardentium & pestilentialium
mitigat: sitim quoque vehementem re-
stinguit.

Syrupus acetositatis Limonum.

℞. Acetositatis Limonum maturorum
per filtrum destillatæ ℞ vj.

Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIVS infrigidat & pene-
trat, quàm Syrupus acetositatis Citri: &
valet contra putrefactionem, contra ver-
mes, vehementiam caloris febrilis, &
alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum
acetosorum.*

℞. Succu Aranciorum acetosorum per pan-
num aut filtrum destillati ℞ vj.

Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo
Aranciorum dulcium.*

Syrupus

Syrupus de Agresta.

℞. Agrestæ l' v.
Sacchari clarificati l' iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immatura-
um; qui Græcè vocatur Omphacium; & in-
bissatus seruatur. Hoc autem loco recipienda
est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.
Agresta exprimi debet ex generosissimis uuis,
apud nos paulò ante maturitatem.

IN magnis æstibus ad sitim restinguen-
dam mirificè confert: Vomitus & alui
profluuium biliosum sistit: Febris bi-
liosus succurrit: Grauidarum vomitus
etiam reprimat, ac ventriculum earundem
firmat: Venenisque aduersatur.

Syrupus de Pomis, D. Mesue.

℞. Succum pomorum dulcium
Succi pomorum acetosorum ana l' v.
Coquantur, despumentur & colentur:
deinde adde
Sacchari l' iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis sine
malis, qualia sunt quæ Vveynlingen, sine
Vveynseralen vocantur, in acetosorum genere.
Ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

COR

C O R imbecillum roborat : ob id syn-
copen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium,
D. Mesue.

℞. Succi Granatorum dulcium l' v.
Sacchari albissimi l' iij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrupum Granato-
rum, indifferenter cum dulcibus acetosa Gra-
nata miscentes. Oportet enim utrumque Syru-
pum tam acetosorum, quàm dulcium Grana-
torum seorsim conficere : nam diuersis morbis,
morborumq; accidentibus medentur.

S I T I M, tussim, & pleuritidem iuuat.

Syrupus Granatorum acetosorum,
D. Mesue.

℞. Succi Granatorum acetosorum l' v.
Sacchari albissimi l' iij.

Coquantur secundum artem.

F E B R E S biliosas, & quæ ex pituitosis
flammam multam inuehunt, iuuat.

Syrupus Dinarum, sine Byzantinus
simplex, D. Mesue.

℞. Succi Endiuie Succi Apii ana l' ij.
Succi

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

Succi depurentur, & despumantur, dum
maneant l' iiij.

Sacchari optimi l' ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat
Syrupus.

*Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarium & Byzantinum seu de Byzanti-
is; alterum simplicem, alterum compositum
vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine
distinguiamus, utrumque Dinarium siue Byzanti-
num appellantes.*

*HUMORES crassos & lentos incidit
atque extenuat: obstructions aufert; mor-
boque regio succurrit.*

*Syrupus Byzantinus compositus,
D. Mesuæ.*

℞. Succi Endiviæ veræ

Succi Apii ana l' ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

In succis decoquantur

Florum Rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apii ana ℥ iiij.

Spicæ

Spicæ Nardi Indicæ 3 ij.
 Colaturæ adde Aceti 1' ij.
 Sacchari albissimi 1' ij. β.

Coquantur secundum artem diligenter.

SYRUPVS Byzantinus compositus, est
 efficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.
 Matthæi de Gradi.*

℞. Artemisiæ M ij.
 Pulegii Calaminthæ
 Origani Melissæ
 Dictamni Cretici Perficariæ
 Sabinæ [*id est, Sauina*]
 Amaraci [*hic accipe Maioranam*]
 Chamædryos
 Perforatæ [*id est, Hyperici*]
 Chamæpityos [*id est, Iua arthritica*]
 Comarū Matricariæ Centaureæ minoris
 Rutæ Betonicæ
 Buglossæ Radicum Fœniculi
 Radicum Apii Radicum Petroselini
 Radicum Asparagi Radicum Brusci
 Radicum Saxifragiæ [*eius loco accipiantur
 radices Pimpinelle*]
 Radicū Enulæ Campanæ Radicū Cyperi
 Radicum Rubiæ tinctorum Radicū Ireos
 Radicum Pæoniæ ana M j.
 Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici
 Seminis Petroselini Seminis Apii
 Seminis

Seminis Anisi Seminis Nigellæ

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Costi Radicum Asari

Radicū Pyrethri Caffę lignęę aromaticę

Cordumēni Calami aromatici

Phu [id est, radicis eius] ana ℥ β.

Aquæ quantum sufficit Sacchari P iiii.

Coquantur omnia magnâ diligentia,
secundum arrem, ne plus quàm necesse
sit aromata bulliant.

*Pro vulgari & falso Dictamno hic debet
poni Dictamnus Creticus; qui singulariter fa-
cit ad ea ad que Syrupus hic est compositus.*

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam her-
bam quam nos Pimpinellam appellamus : &
huius radix hic debet accipi.

M E D E T V R passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco. Resolvit frigiditates, ventositates, & dolores. Corroborat nervos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat, & provocat.

*Syrupus de Absinthio maior,
D. Mesuæ.*

R. Absinthii Romani 1' β.

Rosarum rubearum 3 ij.

Spice Indicae 3 iiij.

Vini clari veteris & optimi

Succi Cydoniorum ana l' ij. β .
G Mace.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctem vnam ; deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari ℥ ij.

Confice secundum artem.

ABSINTHIUM Romanum, id est, Absinthium Ponticum, gustu adstringens, & aromaticum : vulgare autem dicitur Rusticum Absinthium.

VENTRICULUM roborat & iecur, aliâque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat. Contra regium morbum prodest. flatus discutit, humoresque per urinam pellit.

Syrupus Infusionis Rosarum.

℞. Infusionis Rosarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate.

EST conueniens ad extinguendam fitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor: resistens putredini, conueniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

℞. Infusionis Violarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & tor-
dis caloribus, asperitati gutturis, morbo
lateralis, tussique aridæ succurrit: sitim
extinguit, aluumque emollit.

Infusio Rosarum Mesua.

℞. Foliorum Rosarum ℥ j ponantur in
vrceo angustiori, & infunde illis aquæ
calidæ lib. iij. aut quantum sufficit, ut ma-
deant. Macerentur per horas viij. aut xij.
obstructo fictilis orificio: deinde exprime
leuiter, & excola infusionem, abiectis
Rosis, & iterum inde recentes rosas, &
infusionem excolatam calefac; & infun-
de rosas: ac obstructo orificio vrcei in ca-
lido loco dimitte per horas viij. vel xij.
Posteà rursus excola, & colaturam in-
funde aliis recentibus Rosis; & tertio di-
mitte. Et si efficaciorē facere volueris,
etiam quarto recentes Rosas in eodem di-
luto recalefacto macera. Ac postremò, ad-
dito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam rundunt Rosas, quidam verò
integras ponunt. & rursus quidam celerius vim
suam & colorem in aquam deponunt, ac mi-
norem locum occupant. At Viola cum runden-
tur, aliquam herbaceam & radiosam acrimo-
niam acquirunt, hoc est, sy kriegen einen gru-
senden geschmack im mund. Quare consulantur

hac de re Doctores medici.

*Hac infusio dicitur alio nomine Mucharus,
& Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.*

*Mesue tantum bis iubet Rosas infundi: mo-
lius verò est ut sepius recentes abiectis substi-
tuantur.*

Infusio Violarum.

*Infusio Violarum eodem modo fit quo
Rosarum Infusio.*

*Syrupus de Sueco Fumi terræ maior
D. Mesue.*

*R. Myrobalanorum Citrinorum
Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.
Florum Boraginis Florum Buglossæ
Florum Violarum Absinthii
Cuscutæ ana ʒ j.
Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij.
Epithymi Polypodii ana ʒ vij.
* Prunorum enucleatorum
Passularum enucleatarum ana l̄ β.
Tamarindorum
Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.
Aquæ l̄ x.*

*Coquantur secundum artem ad tērtias:
deinde cola: & colaturæ adde*

Succi Fumi terræ depurati

Sacchari albissimi ana l̄ iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & repone.

Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum ꝑ. quemadmodum passule.

Syrupus Fumariæ maior ventriculum & hepar roborat, obstructions aperit: cutis morbos, præcipuè ab humore falso vel vsto natos, vt pforam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

*Syrupus de Mentha maior
D. Mesue.*

℞. Succī Citoniorum muzorum
Succī Citoniorum dulcium
Succī Granatorum acetosorum
Succī Granatorum dulcium
Succī Granatorum muzorum ana ℥ j. ꝑ.
In succis macerentur per horas xxiiij
Menthæ siccæ ℥ j. ꝑ.
Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cum Galia moschata vera trita, & in sindone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vini saporem
G 3 *acescen-*

*acescentium : nam multus sapor de dulcedine
& acetositate aliquid habet.*

*Notandum est, si quis cum melle velit hunc
Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum
aromaticum, quale è Dantisco aduehitur: vel
tale aliud; ut est quod vocant virgineum mel,
& Saxones Kruthonich, quasi aromaticum
mel; & non illud vulgare, flatuosum.*

*Ventriculum frigidum roborat: ob id
nauseam, vomitum, singultum, fluorem
alui sedat.*

*Syrupus de Mentha minor
D. Mesue.*

*R. Succi Menthæ depurati l' j.
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum acetosorum, ad medie-
tatem coctorum*

*Sacchari vel Mellis ana l' j.
Coquantur sensim secundum artem.*

*In hoc quoque Syrupo notandum est, quod
in proximo Syrupo de Mentha maiore diximus
de melle.*

*Eandem ferè cum superiore facultatem
habet.*

Syrupus de Calamintha D. Mesue.

*R. Calaminthæ domesticæ
Calaminthæ silvestris ana ʒ ij.
Ligu-*

Ligustici [*seminis scilicet*]
 Dauçi [*videlicet seminis eius*]
 Schœnanthi ana ʒ v.
 Passularum enucleatarum l' β.
 Mellis l' ij.
 Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut antè etiam dixi. Idq; in omnibus Syrupis & Oxymelibus observandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueverunt.

DOMESTICA Calamintha, est quæ in agris & cultis locis nascitur: & vulgò vocatur Kornminze.

SILVESTRIIS autem Calamintha, est quæ in incultis locis & montibus provenit, & appellatur Calamintha montana.

LIENOSIS plurimum confert, quibus durus est lien & pæne irresolubilis; & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant; præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tussis. Si quis enim vel pectus, vel ventriculus, vel intestina crassâ, tenaci & irresolubili materiâ plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

Syrupus de Succo Endiviæ simplex.

℞. Succo Endiviæ depurati l' viij.
 Sacchari G 4

Sacchari Tabarzeth 1^o v. β.

Coquantur secundum artem.

ENDIVIA vera, est herba sativa, caulis, foliisque Cichorea similibus, maioribus tamen pinguioribusque; flores etiam similes sunt Cichorea. Allatum est semine eius ex Italia, & iam multis in locis apud nos feritur.

Valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus de Endivia compositus.

℞. Endiviæ recentis Boraginis Scariole
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
Eupatorii ana m. j.

Semen frigid. maiorum ana ʒ j.

Santali albi Santali rubri ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiviæ depurati 1^o j.

Vini Granatorum ʒ iiij.

Sacchari albi 1^o iiij.

Fiat syrupus secundum artem.

VALET præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionem calidæ; & est appetitius

ritius oppilationum, & confortatius membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiam digestius materiarum cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro,
Nicolai Florentini.*

℞. Endiuie domesticæ
Endiuie silvestris Cichorii
Taraxaci ana m ij.
Cicerbitæ Hepaticæ Scariolæ Lactucæ
Fumiterræ Lupulorum ana m j.
Hordei non excorticati ℥ ij.
Vesicariæ [id est, Alkekengi]
Glycyrrhizæ Capillorum Veneris
Ceterach [id est, Asplenii]
Polytrichi Adianthos ana ℥ vj.
Radicum Fœniculi Radicum Apii
Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur; deinde cum Sacchari albi l' iij, fiat Syrupus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iij.
Spicæ Nardi ℥ ij.

Colligato in linteolo raro; quod saepe B exprimatur, dum Syrupus consistentiam iustam nanciscatur.

G

P. C

P. C. SCHOL.

A l' iij.] Hanc Sacchari quantitatem huic Syrupo esse indendam, eamq; abundè satis esse dicimus & censemus: quamquam Commentatorum nullus, quod sciam, huic multi usus Syrupi pondus ullum exprimat, Colonienfium Dispensatoriolo excepto: quod cum l' v. & 3 viij. sumendas putat, medicamentum vimis imbecillo tanta copia reddit: augente & malum, quod Manipulos viridum herbarum (quales hic requiruntur) semunciales tantum, ut sunt puerorum, constituat.

B Ceterum Spica 3 ij. hic quoque sufficere debent.

VALET contra omnem materiam venenosam, in alterando & mundificando eam, & propriè in anthrace & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundificat materias per urinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emendata descriptio
M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharmacantium, ac medicastrosum fatalis inscitia fallere solita, nulla monita in dignoscendis non contemnenda utilitatis, Seridis, siue Intubace; generis cunctis

cunctis familiis, audierit; ut non tantum Medicos doctissimos & pharmacopæos probos eluserit, sed etiam multis ansam dederit in hunc usque diem, magno egrotantium dispendio, parandi Syrupum à Cichoreo D. N. Florentini cum Rhabarbaro è solo succo Cichorei satiui, vel aliquot hortorum refrigerantibus temperatum herbis, quæ sanè instituto Nicolai Florentini minimè respondebant (præscribitur enim eius Syrupus non modò ad refrigerandum hepar & viscera, sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, aliorumque viscerum æstuationes ac inflammationes, tum ad referandas obstructions in febribus biliosis, & ad somnum conciliandum) veruntamen amicis quorundam petitionibus, (quia multi & quotidiani usus hic utilissimus Syrupus) neglectis herbarum confusis, ambiguis, & barbaris nominibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Rongalletii.

R. * Hordei integri ℥ iiij.

A

Radicum Asparagi

Æ Fœniculi

Paludarii [i. Apii Palustris] ana ℥ ij. B

Glycyrrhizæ ℥ j.

Intybi domestici vel satiui [id est, Endivia C
vulgarissima, latifolia, officinis vulgò Scar-
riola vocata]

Intybi sylvestris [i. Endivia silvestris officina-
râ, perperam recentioribus Lactuca silvest.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis] ana M ij.

Cicerbitæ siue Sonchi lenis

Hepaticæ siue Lichenis Lactucæ sativæ

Lactucæ silvestris soporiferæ Fumi terræ D

Lupulorum ana m j.

G 6

Adrian.

Adianthi [*sive Capillorum Veneris*]

Polytrichi

Asplenii [*sive Ceterach*]

Cassithæ ana ʒ vj.

Seminis Halicacabi [*sive Alkekengi*] ʒ iiij.

si recens fuerit; alioqui sufficiet media quantitas.

Coquantur in aquæ & succi Cichorei æquis partibus in balneo aperto; deinde exprimantur, clarificentur, & syrupizentur in eodem balneo & vase lapideo aut vitreo; additis lib. iiij. paulo plus, minus, Sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabbari electi ʒ iiij. & Spice Nardi ʒ iiij. modulo exceptorum & ligatorum.

* Preponuntur quæ diutius coquenda.

A ʒ iiij.] ex veteri exemplari cum Rondel. legimus.

B Palud.] magis aperit quàm Apium hortense.

C Intubi dom.] omnia exemplaria inserunt Scariolam: quæ tamen eadem est cum Endivia aut Intubo domestica.

D Lactuc. sil.] Lactucam agrestem officina Belgica Antuerpia facile sibi procurabunt; ubi semel sata maximo & importuno proventus luxuriat; potissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oliverii Driesch, & pia memoria P. Coudebargi.

Oxyac-

Oxysacchara simplex, D. Nicolai.

℞. Sacchari albi P j.
 Succī Malorum Granatorum acetosorum
 ℥ viij.
 Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in
 vase stanneo, dum Syrupi crassamentum
 adsciscat.

Digerit materias cholericas phlegmati-
 mistas, quæ grauant stomachum & præcor-
 dia, & faciunt tertianas duplas inordina-
 tas, quas vocant erraticas, & similes quar-
 tanis duplis.

Oxysacchara composita D. Nicolai
Præpositi.

℞. Capillorum Veneris
 Linguae ceruinæ [*id est, Phyllitidis*]
 Scolopendriæ [*id est, Asplenii*]
 Polytrichi Hepaticæ Violarum
 Radicum Fœniculi Radicum Rusci
 Radicum Asparagi
 Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice : In succo Malorum *
 Granatorum, herbas & radices triduum
 macerato: quarto die parum bullire fini-
 to, cum forti expressione percolato. Po-
 stremò cum Sacchari ℥ ij. ex arte, ad iu- *

stam crassitiem concoquito.

Concalefacta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est: & lienis obstructions tollit.

Syrupus de Iuinbis D. Mesue.

℞. Iuinbarum numero LX.

Violarum

Seminis Maluæ ana ʒ v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactucę

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Aquæ fontis ℥ iiij. aut q. s.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

SYRUPVS iste confert raucitati, tussi & pleuritidi.

Syrupus Violarum D. Mesue.

℞. Violarum ʒ ij.

Seminis Cytoniorum

* Seminis Maluæ ana ʒ viij.

Iuinbarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ

Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ j. ℥.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussî à causa calida.

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Violarum recentium iam iam lectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab eis purpurea foliola, & ab eis virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo, & exprime. mox

℞. Expressi succi ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

SACCHARUM prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne Saccharo, tepesieri finito, & succum infundito: & rursum lento igne ad spissitudinem coquito; & emicantem in coquendo spumam continuo auferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat. Sed citò corrumpitur cū spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit: præsertim Lipsiæ, ubi eum vocant Succum Violarum.

BILIS acrimoniam obtundit: ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

Syrupus

Syrupus de Prassio D. Mesua.

- ℞. Prassii ʒ ij.
 Capilli Veneris
 Hyssopi ʒ j.
 * Calaminthæ Anisi Radicum Apii
 Radicum Fœniculi ana ʒ v.
 Seminis Maluę
 Seminis Fœnugræci
 Radicis Ireos ana ʒ iiij.
 Seminis Lini
 Seminis Cytoniorum ana ʒ ij.
 Passularum enucleatarum ʒ ij.
 * Ficum siccarum pinguium numero xv.
 * Penidiarum l j.
 * Mellis l ij.
 Aquę quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL oportet esse aromaticum & optimum:
 potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis,
 & à frigido tenacię humore excitatis,
 atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc
 est quòd senibus & asthmaticis plurimum
 conducatur.

Syrupus de Glycyrrhiza, D. Mesua.

- ℞. Glycyrrhizę rasę ʒ ij.
 Capilli Veneris ʒ j.
 Hyssopi ʒ β.

Aquę

Aquæ l' iiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde co-
quantur ad dimidias: colaturæ adde

Mellis optimi Penidiarum

Sacchari ana ℥ viij.

Aquæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat:
ideoque diurnæ tussi & pleuritidi auxi-
liatur.

Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.

℞. Hyssopi aridi Radicum Apii

Radicum Fœniculi Radicum Petroselinæ

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum

Tragacanthæ ana ℥ iij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularum magnarum enucleatarum ℥ j.

℥ iiij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum l' ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficac
est; humoresque excreatu difficiles exte-
nuat & educit.

Syrupus

Syrupus de Eupatorio D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apri
 Radicum Endiuiaë ana ʒ ij.
 Glycyrrhizæ Schœnanthi
 Cuscutæ Absinthii
 Rosarum ana ʒ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorii ana ʒ v.
 Raues Seni [*id est, Rhabarbari Orientalis*]
 Mastiches ana ʒ iiij.
 Spicæ Nardi Indicæ Asari
 Folii [*pro Folio pone Spicam Romanam*]
 ana ʒ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut lʳ viij.
 Succii Apri
 Succii Endiuiaë ana lʳ ij.
 Sacchari lʳ iiij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedegware & Suchaha, quæ hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopaciæ radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem, ma-
 loque

quoque corporis habitui succurrit. Humores enim crassos extenuat, roburque iecini honori adiicit. Vrinam mouet, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.
Thymi Calaminthæ
Origani ana ℥ x.
Anisi ℥ vj.
Passularum enucleatarum ℥ iiij.
Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum artem. Colaturæ adde
Mellis optimi ℥ iiij. β.
Condiatur cum
Cinnamomi Calami aromatici
Zingiberis ana ℥ j. β.
Ligentur in sindone, & in Syrupo suspendantur.

Syrupus de Stœchade compositus
D. Mesuæ.

℞. Florum Stœchadis ℥ xxx.
Thymi Calaminthæ
Origani ana ℥ x.
Anisi Pyrethri ana ℥ vij.
Piperis longi ℥ iiij.
Zingiberis ℥ ij.
Passularum enucleatarum ℥ iiij.
Aquæ quantum sufficit
Mellis

Mellis optimi p v.

Coquantur secundum artem lento igne: colaturæ adde mellis prædictas l v. & cum reponis, tunc condies sequentibus speciebus in sindone rara & munda suspensis.

Rx. Cinnamomi Calami aromatici

Spicæ Nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri

Piperis longi ana 3 j. β.

Contundantur grosso modo.

Ego in condiendo Syrupo de Stæchade utroque, pro Calamo aromatico mallem imponere Schozanthum aut Galangam: nam vero Calame aromatico iam caremus.

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, vt paralyfim, epilepsiam, spasmus, spasmus cynicum, tremorem: ac ventriculum firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesuæ.

Rx. Epithymi 3 xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana 3 xv.

Emblicorum Bellericorum ana 3 vj.

Cuscutæ

Fumiterræ ana 3 x.

Thymi Buglossæ Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodii Agarici

Stæchados ana 3 vj.

Rosa-

Rosarum Fœniculi
 Anisi ana ʒ ij. β.
 Prunorum num. xx.
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.
 Tamarindorum ʒ ij. β. *
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari P iiij. Sapæ P ij. *

Coquantur secundum artem.

SAPA est mustum optimum ad tertias decoctum.

ATRAM bilem, & alios humores vitos vacuat: ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum, vlcera maligna, fistulosa, pforam, lepram præcauet, curatque.

*Syrupus de Nymphaea D. Francisci
 Pedemontani.*

℞. Florum Nymphaeæ ʒ ij.
 Florum Vngulæ Caballinae aquaticæ
 Psyllii integri
 Acetosæ ana ʒ j.
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris
 Seminis Melonis ana ʒ iiij.
 Seminis Lactucæ Seminis Endiuia
 Seminis Scariolæ
 Seminis Portulacæ ana ʒ ij.
 Radicum Fœniculi ʒ i.
 Aquæ hordei quantum sufficit.

Sac-

Sacchari ℞ j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem: deinde aromatizentur cum

* Santali Citrini

Spicæ Nardi Indicæ ana ℥ j.

A Due sunt Nymphaeæ species: altera candidum, altera luteum florem habet; & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem, quæ albos habet flores, vocat Nenuphar; alteram verò, quæ luteos fert flores, appellat Vngulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.

SCARIOLA est species Endivia, quam nos in Germania vocamus Endiviam, (vulgò Gensdistel,) & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Vngula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse Fuchsius dextrè monet: apud aquas enim aut humentia loca plerumque nascitur.

BILIS flauæ feruorem extinguit: ideoque mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur: somnum quoque conciliat.

Syrup-

Syrupus de Papauere simplex
D. Mesua.

℞. Capita Papaueris albi recentia
Capita Papaueris nigri recentia ana ʒ lx.
Aquæ pluuiælis ℥ iiii.
Coquantur vsquequò remaneat tantum
aquæ ℥ j. β. Colaturæ adde
Sacchari & Penidiarum ana ʒ vj.
Fiat Syrupus secundum artem.
Valet ad catarrhum & tussim, causam
insomniæ.

Syrupus de Papauere compositus,
D. Mesua.

℞. Papaueris albi
Papaueris nigri ana ʒ l.
Capillorum Veneris ʒ xv.
Glycyrrhizæ ʒ v.
Iuiubæ numero xxx.
Seminis Lactucæ ʒ xl.
Seminis Maluæ
Seminis Cytoniorum ana ʒ vj.
Coquantur in ℥ iiii aque vsque ad duas;
& cum Sacchari & Penidiarum ana ʒ viij
Fiat Syrupus secundum artem.
VALET ad tussim siccam, phthisin,
catarrhum, in somniæ causam.

Syrupus

Syrupus de succo Myrtillorum.

A ℞. Succī Myrtillorum depurati ℥ viij.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est ut adferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHOL.

A ℥ viij.] *Cum hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribebatur, diversus sit, atque à Cordo ipso forsan concinnatus; malè legi his ℥ viij Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPUS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat: ob id fluorem alui antiquatum sistit; & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞. Myrtillorum ʒ xx.

* Rosarum Santali albi

A Sumach Balauftiorum

* Berberis ana ʒ xv.

* Mespilorum ʒ l.

* Succī Granatorum acidorum vel mazorum

Succī Pomorum agrestium ana ℥ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

* Sacchari ℥ iiij. secundum artem.

P. C.

P. C. SCHOL.

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit, à Cordo neglectas; simulq; ana ʒ xv legendum, & ʒ l, atque Sacchari ℥ iij, dextrè ait, ubi Cordus ʒ xxx, & ʒ c, ac Sach. ℥ v, nimie scripserat. Interim in aqua ℥ viij coquit Fuchsius; & succi Granatorum ac Cydoniorum ana ℥ β. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & scretum sanguinis.

*Syrupus de succo Acetosæ,
D. Mesuæ.*

℞. Succi Acetosæ depurati ℥ iij.
Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluber est: cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaque roborat.

Syrupus de Succo Boraginis.

℞. Succi Boraginis depurati ℥ viij.
Florum Boraginis recentium ℥ j.

Quam modicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur; dein colentur, cumque Sacchari ℥ iiij. fiat Syrupus.

H

S y c-

Succus Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum; alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum his descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eodem suo nitore ex arte reddidi. Fecissem quidem & aliis locis quamplurimis, nisi falcem in alterius messem indere penitus, minimè consultum visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat: maniacos & melancholicos iuuat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

Rx. Succu Buglossæ depurati ℥ viij.

* Florum Buglossæ recentium ℥ j.

* Sacchari ℥ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam quæ vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa. ideo rufa dimittenda est per noctem in frigido loco; & postridie exprimendus succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.

COR confortat, lætitiâque generat.

Syrupus de Lupulo.

* *Rx.* Succu Lupuli depurati ℥ ij.

Succi

Succi Fumiterræ depurati ℞ j.

Sacchari ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesue placet in capite De speciebus Volubilis. Exprimendus autem est Succus Lupulicium adhuc tenere sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

Iuleb Rosatum.

℞. Aquæ Rosarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit: sitim inexpletam sedat.

Iuleb Violatum.

℞. Aquæ Violarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque vt Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

*Mina Cytoniorum simplex,
D. Mesuæ.*

℞. Succī Cytoniorum depurati ℥ xij.
Coquantur ad medietatem, & affunde
A Vini veteris optimi ℥ v.
* Sacchari ℥ iij.
Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℥ v. Sacchari ℥ iij.] *Cordum hic
Vini ℥ viij. Sacch. ℥ xij. perperam legentem, &
Fuchsius quoque animadvertit, quare veram
utrobique lectionem reposui.*

VENTRICULUM roborat, & cibum
in eo continet.

*Mina Cytoniorum aromatica,
D. Mesuæ.*

℞. Succī Cytoniorum acetosorum ℥ xx.
Vini veteris optimi ℥ x.
Mellis despumati optimi ℥ vj.
Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.
Coquantur ad perfectionem; & aroma-
tizentur in sindone ligatis sequentibus:
Cinnamomi electi
Cardamomi minoris [al. maioris] ana
℥ iij.
Garyophyllorum ℥ ij.
Zingiberis Mastiches ana ℥ j. β.
Croci

Croci ʒ ij.
 Xyloaloës Macis ana ʒ j. β.
 Moschi ʒ j.
 Galliæ moschataæ veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest.

VENTRICVLVM, hepar, & cætera
 viscera roborat : appetentiam excitat,
 coctionem inuat : vomitum & lienteriam
 sedat.

Mel Rosatum D. Mesuæ.

℞. Rosarum rubearum nondum penitus
 apertarum ℥ ij.

Mellis optimi ℥ vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHVM confortat & mundi-
 ficat, & est digestium materiarum
 phlegmaticarum in stomacho & meseraï-
 cis contentarum.

Mel Rosatum aliud efficacius.

℞. Foliorum Rosarum rubearum nondum
 explicitarum contusorum ℥ ij.

Coquantur in aquæ cælestis ℥ iiij.

Colaturę fortiter expressæ adde

Succi Rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

H 3

Oxy-

Oxymel simplex D. Mesuae.

℞. Mellis optimi despumati ℥ iij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum; & coque secundum artem.

HVMORES crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, abstergit, atque aded obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum, Mesuae.

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apii ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Ruscii

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥ vi. aut quantum sufficit.

Colaturæ adde Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HVMORES crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis ac renum: urinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel

*Oxymel Scilliticum simplex**D. Mesue.*

℞. Mellis despumati ℥ iij.

Aceti scillitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, aulso contumaces separat & incidit: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu urinæ incontinentiam. Asthmaticis quoque prodest.

Oxymel Scilliticum compositum.

℞. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselinii Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ ℥ vj. aut q. s. Deinde colentur:

Colaturæ adde

Aceti Scillitici ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

H 4

Mel

Mel Anacardinum Azaravii.

R. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscam emittant: eam aquæ innatantem auferro, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblicæ Myrobalani sunt conditi.

Alii ita vocant Emblicorum decoctum, ad mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

R. Vuarum passarum ℞ iiij. Infundantur eis aquæ ℞ xij. aut q. s. & macerentur horis xxiiij. deinde coquantur ad remanentiam tertię partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYRVPORVM TRES SEQVENTES
VALERII CORDI DESCRIPTIONES
NUPER PRIMVM ACCESSERVNT.

Syrupus de Pyris Valerii Cordi.

R. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi

Succi Pyrorum Palatinorum
Sacchari clarificati ana ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius
maturefcunt, expreffum eorum fuccum
clarificatum cum Saccharo decoctum re-
pones, donec etiam Palatina maturefcant.
demum mifcebis.

Syrupus de Cichorio Val. Cordi.

℞. Rad. Fœniculi Cichorii ana ℥ iiij.
Linguae ceruinæ Scolopendrii
Capillorum Veneris
Trichomanes ana m j.

Aquæ Cichorii Succi eiusdem ana ℞ iiij.

Coquantur omnia fecundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ℞ iiij.

Et species fequentes petiæ illigatas
fufpends in Syrupo:

℞. Rhabarbari ℥ ij.

Rad. Spicæ Romanæ ℥ j.

Fiat Syrupus.

Syrupus Refectiuus, Val. Cordi.

℞. Daſtylorum enucleatorum

Ficum ficcarum pinguium

Xyloceratiſſimum enucleatorum

Vuarum Cubearum paſſarum

Vuarum paſſarum vulgariū maiorem &
minorem

H 5 Tama-

Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iiij.

Multi generosi recentis

Succi Cydoniorum ana l' vi.

Incidantur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contundantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundantur eis succus & mustum, mace- renturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ par- tis, aut ampliùs.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosacea l' ij. ex vna libra Amygdala- rum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati l' iiij.

Coquatur ad perfectionem: & cum repo- nis, tū suspende in Syrupō sequētes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas:

℞ Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatae

Cardamomi Zingiberis

Galangae Zedoariae

Garyophyllorum ana ℥ ij.

Ligni Aloës ℥ iiij.

Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum horum, vel alicuius eorum, vocant Arabes Nabuch; quo utuntur pro vino & melle in ca- lidis regionibus.

H V N C

Hunc Syrupum composui diuitibus
quibusdam in chronicis morbis, omnem
cibum & potum auersantibus: & compe-
ri mirum in modum vires reficere, alere;
& iam desperatos, refocillatis viribus,
sanitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

℞. Succi Ribes ℥ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis,
& reponatur.

Rob de Ribes Compositum.

℞. Succi Ribes ℥ iiij.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum
biliosum reprimit, sitim restinguit, alias-
que excretiones biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

℞. Succi Berberis ℥ viij.

Coquatur per se usque ad mellis spissi-
tudinem.

Rob de Berberis compositum.

℞. Succi Berberis ℥ iiij.

H 6

Saccha.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

R o b ex Oxyacantha, seu de Berberis,
easdemquas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum, D. Mesua.

℞. Succū Corticū viridiū iuglandiū ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuium humorum à capite,
& inflammationem excitantium confert.

Diamorum, descriptione Nicolai.

℞. Succū Mororum Celsi ℥ β.

Succū Mororum Rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sapæ ʒ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris vlcera, ad den-
tium affectus & gingivarum noxas, atque
ad omnia oris vitia gargarizatum proficit.

Diamoron aliud, D. Val. Cordi.

℞. Succū Mororum Rubi

Succū Mororum Rubi Idæi

Succū Mororum Celsi, siue de arbore,

Succū Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne secundum artem.

M O R O R V M omnium succus exprimendus est antequam perveniant ad maturitatem. Porro Mora Rubi Idei & Fraga citius maturescunt, quam alia: ideo oportet, ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alii maturescant. Sint autem succi uniuscuiusque l ij. Sacchari P j. ad quamvis eorum, id est, Sacchari l ij.

R V B V S Ideus est ille Rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora sine fructus vocantur Himpeer.

*Medulla sine Pulpa, seu Rob
Cerasorum.*

R. Cerasorum acetosorum quantum volueris: coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque; ac sine Saccharo repone, ut medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

R. Amarena Cerasa quantum libuerit; & cum modico vino coque: cocta per cribrum manibus exprime: expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque; & deinde

H 7

R. In-

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

AMARENÆ sunt magna Cerasa, gustus
vinosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen,
Ammerlinghe, & Amelber.

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti,
& adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species, in mi-
nutissimum puluerem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ j.

Zingiberis Galangæ ana ℥ iiij.

Cardamomi Garyophyllorum

Macis Ligni Aloës ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere con-
fectiones ex Cynosbatis, & Cornis, hoc
est, Corni fructibus.

LOHOCH.

Lohoch sanum & expertum,

D. Mesue.

℞. Cinnamomi Hyssopi

Glycyrrhizæ ana ℥ iiij.

Iuiubarum

Sebe-

Sebesten ana numero xxx.

Passularum enucleatarum

Ficuum siccarum

Dactylorum pinguium ana ʒ ij.

Fœnugræci ʒ v.

Capilli Veneris m j.

Anisi Fœniculi Ireos

Seminis Lini

Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ
clarissimæ l' iiij. ad consumptionem l' ij.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum l' ij.

Coquantur ad perfectionem : postea
insperge subsequencia, minutissimè in-
cisa & tusa:

℞. Pinearum mundatarum ʒ v.

Amygdalorum dulcium mundatorum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ *

Gummi Arabici Amyli ana ʒ iiij. *

Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè, do-
nec albescant.

Tussis & vocisque asperitati à frigidi-
tate natæ auxilio est: crassos in thorace &
pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino, D. Mesuæ.

℞. Pinearum ʒ xx. *

Amygdalorum dulcium

Auel-

Auellanarum affatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici

Glycyrrhizæ Succu Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amarorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeth l' iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda
incidantur minutissimè, & cum melle ex-
cipiantur.

MEL Tabarzeth est optimum, sincerissi-
mum atque odoratissimum mel, quale ex Dan-
tisco affertur.

P. C. SCHOL.

A Amygd.am. ʒ iiij.] Cum Cordus hic per-
uersè ʒ iiij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse,
Fuchsio quoque adstipulante, dico.

Tvs s i diurnæ, difficultati spiritus,
& asthmatis succurrit: humores in thorace
crassos incidit, & extenuat.

Lohoch de Papauere D. Mesue.

R. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amy-

Amyli ʒ iiij. *
Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ
Seminis Cytoniorum ana ʒ iiij.
Croci ʒ j. *
Penidiarum albarum ʒ iiij.
Syrupi de Papauere l' iiij.

Omnia contendantur & incidantur; atque cum Syrupo excipiantur, secundum artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet:

℞. Capitem Papaueris albi recentium
Capitū Papaueris nigri recentiu ana ʒ vj.
Seminis Lactucæ
Florū Violarum ana ʒ j.
Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.

Coquantur; & colaturæ adde
Sacchari l' iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hec Lohoch de Papauere appellatur etiam
alio nomine Diapapauer.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat:) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla, D. Mesuæ.

℞. Succī Scillæ
Mellis despumati ana l' j.
Coquantur secundum artem.

SCILL

SCILLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; qua sic est colligenda:

Rx. Scillas crudas tres aut quatuor: eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila siue mortario fictili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo, facto ex ligno Guaiaco siue Santalo: & deinde exprime, & utere.

E C L E G M A de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit; & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Loboch de Pulmone vulpis,
D. Mesuæ.*

Rx. Pulmonis vulpini siccati
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Anisi Seminis Fœniculi
Capilli Veneris ana ʒ j.
Sacchari clarificati ʒ xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Saccharo excipiantur.

A B S T E R G I T & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

* *Loboch ad Asthma D. Mesuæ.*

* Rx. Scillæ afflatæ ʒ iij.

Radi-

LENITIVA, ET SOLVT. 187

Radicum Ircos 3 ij. *

Hysſopi

Prassii ana 3 j.

Myrrhae rubear

Croci ana 3 β.

Cum mellis quantitate sufficienti fiat Lo-
hoch.

A d asthma & tussim antiquam valet:
humorem enim crassum tenuat.

LENITIVA,
ET SOLVTIVA.

Flores Casia fistula solutinae.

℞. Cannas seu siliquas Casia ponderosas,
& quæ non resonant concussæ: aperi eas,
& contentam in eis pulpam seu medullam
cum laminis & seminibus suis diligenter
euacua: exempta proiice super inuersum
& angustum cribrum, setis equinis con-
textum. Cribrum deinde pone supra bul-
lientis aque vaporem, & auerso cochlea-
ris conuexo Medullam Casia hinc & inde
ducito, vt per cribrum paulatim excerna-
tur: & si quid excretum est, aut penetra-
uerit, confestim subinde auferto, ne plus
quàm necesse est de vapore imbibat: idque
tam diu facito, donec quantum voles, col-
legeris. Porro cùm necessitas requirit, sem-
per

per recentes exprime Casiæ flores : repofiri enim acefcunt.

Si quis Casiæ flores fiue pulpam magis folutiua reddere uolet, in bullientem aquam proiciat folia Perfici, aut flores Perfici, & Prunellorum filueftrium, aut omnia hæc fimul: horum enim vapor & diffillata aqua foluit aluum, [fed debilibus ventriculis non conuenit.]

Mundificat fanguinem, & compescit omnem acuitatem, & fedat fitim, & propriè cum fucco Endiuia aut Taraxaci, depurato fecundum artem. Mundificat ftomachum, & educit choleram & phlegma, fine nocumento & exceffu; caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur, ac refoluit apoftemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum, fumpta cum diureticis & infufione Glycyrrhizæ; & prohibet generationem lapidis in eis: & confert febribus calidis.

Diacafia cum Manna.

R. Prunorum Damafcenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant fecundum artem ufque ad medietatis confumptionem: Cola; & in colatura diffolue

Pulpæ Cafie ℥ vj.

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.
 Mannæ optimæ Calabrinæ ʒ ij.
 Syrupi Violarum ʒ iiij.
 Sacchari Candi Sacchari Penidii ana ʒj.
 Sacchari Violati ʒ iiij.

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia,
 siue flores Casia.*

Est pro delicatis, qui habent stypti-
 cum ventrem; non enim est ingrati sapo-
 ris, nec molesta, sed salubris: lenit visce-
 ra, subducit aluum, purgat choleram, &
 mitigat febres.

Casia extracta sine foliis Sene.

℞. Prunorum numero xij.
 Violarum m. j.
 Hordei mundi Anisi Polypodii
 Seminis Carthami ana ʒ v.
 Capillorum Veneris Thymi
 Epithymi ana m. β. *
 Passularum exacinatarum ʒ β.
 Seminis Fœniculi ʒ ij.
 Seminis Portulacæ
 Seminis Maluæ ana ʒ iiij.
 Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quan-
 titate aquæ: colentur; in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℞ ij.

Pulpæ Tamarindorum ʒ j. *

Cin-

* Cinnamomi ℥ iiij.

Sacchari optimi ℞ j.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

Casia extracta cum foliis Senæ.

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine foliis Senæ ℞ ij.

Pulueris foliorum Senæ ℥ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit: lenit asperitatem intestinorum: remouet stypticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholerici & melancholicis auxilia præbet.

Casia extracta pro clysteribus.

℞. Violarum [id est, florum Violarum]

Violariæ [id est, foliorum Violarum]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariæ ana m j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuius beneficio Casia extrahatur, & canna eius interiùs lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ ℞ j.

Sacchari ℞ j. β.

Coque ad perfectionem secundum artem. Quidam addunt Diactridium, siue Scammoneam. Sed hoc nemo faciat insciis Doctoribus Medicis.

P A R T E

PARIETARIA, videlicet vera, qua
circa macerias & muros nascitur, sub stillicidiis
sectorum; & non silvestris istius herba luteis
floribus, qua dicitur Germanicè Tag und nacht.

Est lenitiua ventriculi, & lenis, &
est medicina pro delicatis, carens acuitate
& mordicatione, & omni excessu lax-
dente.

Electuarium Lenitium.

℞. Passularum enucleatarum ℥ ij.
Adianti nigri Violarum
Hordei mundi ana m. j.
Iuiubarum Sebesten ana num. xx.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum ana ℥ vj.
Fol. Senæ Polypodii ana ℥ ij.
Mercurialis m. j. β.

Decoquantur secundum artem in suffi-
cienti aqua: cola; & in colatura dissolue
Pulpæ Casiæ Pulpæ Tamarindorum
Pulpæ Prunorum Sacchari optimi
Sacchari Violati ana ℥ vj.
Pulueris Senæ ℥ iij. ℥ iij. β.

Confice secundum artem.

AD IANTVM nigrum, est Capillus Veneris
verus; qui Lugduno affertur.

Vsvs eius est in febribus humoralibus
& pleuresi: lenit enim & mollit in-
testina,

testina, & delet eorum stypticitem:
facile soluit sine molestia & laesione cho-
leram phlegmaticam & melancholicam.

*Electuarium Lenitivum de Manna,
Nicolai Alexandrini.*

Rx. Capillorum Veneris

Scolopendriæ [*hoc est, Ceterach vocata*]

* Hepaticæ [*hoc est, Lichenis*] ana ℥ iiij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Melonis Sem. Cucumeris

Violarum ana ℥ j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde
percolentur cum expressione: in colato
dissoluantur

Mannæ optimæ puræ

* Sacchari Violacei

* Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij.

* Tamarindorum

Sacchari Rosacei ana ℥ j.

Sacchari albissimi l. iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam:
postremò species sequentes iniiciantur:

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Florum Violarum

Florum Nymphææ Seminis Lactucæ

Seminis Scariolæ

* Seminis Portulacæ ana ℥ j.

Rhabar-

Rhabarbari electi

Foliorum Senæ ana ℥ j. ℥ j. *

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium. *

VTILE est ad purgandum sanguinem, ad cholera reprimendam & melancholiam : valet etiam ad hepar calefactum; & corpus vniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebesten, D. Bartholomæi Montagnane.

℞. Sebesten sine nucleis

Prunorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana ℥ v.

Aquæ Violarum ℥ j.

Aquæ Ireos

Aquæ Anguriæ ana ℥ vij. A

Succi Mercurialis depurati ℥ iiij.

Penidiarum ℥ iiij. *

Diapruni simplicis ℥ j. β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ *

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ℥ j. *

Diagridii ℥ iiij. β. *

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissimè teratur, & cum aquis extrahatur. Semina verò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur : & fiat secundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis:

℥ alio

alio nomine vocatur *Albateca*, siue *Baroga*, & *Melon Indicus*. Quidam per aquam *Anguriz* intelligunt succum eius, & non male: nam hic magis aluum lenit.

P. C. SCHOL.

A *Aquæ Anguriz*.] *Anguriam* esse *Melonem* seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interflinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen; oblongum, inspidum, cum lauore, semine maiusculo, rubro, unâ cum *Francisci Alexandrini Apolline* existimo; & falli *Fuchsum* dico.

CONFERT febribus cholericis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem februm, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

Medulla siue Pulpa Prunorum,
aut Diaprunum simplex.

℞. *Prunorum* magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris; & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimito: expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine *Saccharo* reponito.

Porro si medullam *Prunorum* laxati-
uam

nam requiris, ex dulcibus Prunis, aut Prunis Hungaricis magnis exiccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est ut conseruetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

*Diaprunum compositū, non laxatinum,
D. Nicolai.*

℞. Prunorum Damascenorum electorum
[siue Hispanicorum] num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emolliantur: excola: deinde decoctum eorum priuatim repones, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantum remaneat. Collectam deinde pulpam, & excolatum eorum decoctum, in quo bullierit Violarum ʒ β, lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si cum decocto Prunorum & Violarum Pulpa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris,

℞. Pulpe inspissatæ ℥ j.
Sacchari clarificati ℥ ij.
Pulpæ Tamarindorum

I 2

Pul-

Pulpæ Casiæ ana ʒ j.

Agita omnia simul supra ignem : deinde insperge subsequantium specierum puluerem :

℞. Santali albi Santali rubri

Spodii Rhabarbari

Cinnamomi ana ʒ iiij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ʒ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasenum, à Prunis Damascenis quæ capit.

Quidam ponunt Prunorum non num. centum, sed l' j. verum malè : nam ex Nicolao Alexandrino omnes alii hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamomum : sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit : & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca : nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectionem habere l' iiij. & β. & sic est. Impressi tamen codices mendosi sunt : habent enim l' ij. & β. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

Nico-

Nicolaus Alexandrinus non ponit semen Cucumeris : nam si posuisset, dixisset confectionem habere l' iij ℥ β. ℥ 3 j. Itaque hac 3 j. seminis Cucumeris, adiecta est à posterioribus : nihil tamen refert, cum potius conducat.

Per semina Cucubita, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla. Idq; semper intelligendum est, cum pulueres horum seminum ingrediuntur in confectiones quas-
cunque.

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medicamento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare, demonstrari posset.

D A T V R acutas & peracutas [febres] patientibus, & maximè Caufoni & Syncho, in principio, & in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

*Diaprunum compositum laxativum,
[seu solutivum,] D. Nicolai.*

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis
& calidis l' iiij.

Scammoneæ præparatæ ℥ ij.

Misce, & repone.

I 3

Dia-

Diacatholicon Nicolai.

- ℞. Pulpæ Casiæ fistulæ
 Pulpæ Tamarindorum
 Senæ mundatæ ana ℥ ij.
 Rhabarbari Violarum Polypodii
 * Anisi ana ℥ j.
 Penidiarum
 * Sacchari Candi ana ℥ j.
 Glycyrrhizę Seminis Cucurbitæ
 Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris
 Seminis Melonis ana ℥ ij.

Conterenda conterantur, & seminum
 quatuor maiorum nuclei incidantur: po-
 steà omnia simul conficiantur cum subse-
 quenti syrupo:

- * ℞. Polypodii ℥ iij.
 Coquantur in aqua cælesti q. s. addendo
 Sacchari optimi l' ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiorem
 vocat Catholicum; è quo desumpta est: is pau-
 lō aliter eam describit: sed quia impressum
 Nicolai exemplar in hac confectiōe valdè men-
 dosum est, malui ex concordī aliorum tradi-
 tiōe hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:
 emollit enim, alterat, roburque addit ie-
 ciatorosis & lienosis.

Ele-

*Electuarium Indum maius,
D. Mesue.*

R. Cinnamomi Garyophyllorum

Spicæ Indicæ Rosarum

Cassia lignea veræ [aut succedanei eius]

Macis

Cyperii [videlicet rotundi] ana ʒ iiij.

Santali Citrini ʒ ij. β.

Ligni Aloës

Nucis moschatæ ana ʒ ij.

Turbith optimi ʒ l. [id est, quinquaginta] *

Sacchari

Penidiarum ana ʒ xx.

Galangæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Afari

Mastiches ana ʒ j. β.

Diagridii ʒ j. ʒ iiij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur:

R. Succi Cydoniorum

Succi Granatorum Succi Apii

Succi Fœniculi, omnium depuratorum
ana l' β.

Mellis despumati optimi l' iiij. ʒ iiij. A.

Decoquantur succi cum melle, ad spissitudinem iustam, secundum artem.

I 4 P. C.

P. C. SCHOL.

A l' iij. ʒ iiij.] Cum Mellis triplum ad reliquorum pondera Cordus plerumque requiratur, hinc Mellis l' iij. ʒ. posuerat, ingredientia Sacchara pulueribus ceteris connumerans; quodalicubi tamen non effecit. Itaque num Sacchara pulueribus sint annumeranda, ut ex ratione Mel quoque triplicandum sit, nihil hinc Fuchsius, nihil Dessennius, nihil Apollonius fatus dignum; ut nec in Amygdala, Pineas, Dactylos recipientibus medicamentis; cum alioquin fusilibus interdum paginas repleant. Ceterum (ut hinc id obiter dicam) huius iam narrati dubii, Diaphœnicon admodum est controuersum [f. decisio incerta.]

EXCREMENTA humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, è ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit: crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat; verbi gratia, inflationem ventriculi, colicos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus,
D. Mesua.*

℞. Turbith optimi	ʒ	vj.	
Sacchari tantundem		Macis	
Garyophyllorum	Piperis	Zingiberis	
Cinnamomi electi			
		Carda-	

Cardamomi maioris

Nucis moschatæ ana ʒ vij.

Scammoneæ correctæ ʒ xij.

Mellis optimi despumati triplum, hoc
est ℞ ij. ʒ j. ʒ j. *

P. C. SCHOL.

Turbith ʒ vi.] Mihi, Desfennio, alijsq; A
videtur Cordus hic mutilus, Turbith tantum
sex drachmas huic medicamento indens, cen-
tum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicen-
tibus multis. Ego verò cum nulla ratione cen-
tum drachmas admittere queam, medicamenti
inscriptionis ratione habita, qua Indum mi-
nus appellatur, vix quinquaginta drachmas ad-
mittendas esse concedere possum, ut in Indo ma-
iori: n̄ in ambabus idem Scammenii pondus
citra controuersiam cerneretur. De decem tan-
tū drachmis aut duodecim, deq; viginti quin-
que drachmis legentibus quibusdam exempla-
ribus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pondere
hic varietas.

Interim si Turbith pondus (prater Cordi
mentem) augetur, augenda quoque erit, pro
triplicitatis ratione, mellis quantitas.

H A B E T intentionem maioris.

Confectio Hamech maior,
D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Chebulorum Indorum

I ʒ

Rha-

- Rhabarbari ana \mathfrak{z} ij.
 Agarici Colocynthidis
 Polypodii quercini ana \mathfrak{z} xvij.
 * Absinthii Thymi
 * Senæ ana \mathfrak{z} vj.
 Violarum \mathfrak{z} xij.
 Epithymi \mathfrak{z} ij.
 Anisi Fœniculi
 Rosarum ana \mathfrak{z} vj.
 Succi Fumi terræ \mathfrak{l} j.
 Prunorum num. lx.

Passularum maiorum enucleatarum \mathfrak{z} vj.

Infundantur omnia in seri quantitate
 sufficienti, & ponantur in vitreato vase
 angusti orificii, bene obturato, & dimit-
 tantur per dies quinque, [aut tres potius.]
 Postea ad ignem ferueant vna atque altera
 ebullitione: deinde colentur. In parte
 colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ \mathfrak{z} iiij.

* Pulpæ Tamarindorum \mathfrak{z} v.

Mannæ \mathfrak{z} ij.

Agitentur simul, & adiiciatur

* Sacchari in altera colaturæ parte clarifi-
 cati \mathfrak{l} j. β .

Coquantur simul ad mellis spissitudi-
 nem: deinde aspergatur subscriptarum spe-
 cierum puluis:

Scammoneæ bonæ \mathfrak{z} j. β .

Myrobal. Citrinorum Chebulorum

Indorum ana \mathfrak{z} β .

Belle-

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis Fumi terre ana 3 iij.

Spicæ Nardi Indicæ

Anisi ana 3 ii.

Confice secundum artem.

MORBIS omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia & cancro succurrit. In summa, omni foeditati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreata conuenit. [Melancholicis quoque utiliter datur.]

Confectio Hamech minor
D. Mesue.

℞. Myrob. nigrorum [id est, Indorum]
Chebulorum

Epithymi ana 3 l.

Fumi terræ Absinthii ana 3 xx.

Thymi Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana 3 x.

Stœchados Arabicæ

Chamedryos [videlicet vera]

Chamæpityos [id est, Iue moschata]

Bedeguaris [eius loca sume Carduum b. medi-
ctum]

Anisi ana 3 v.

Prunorum Iuiubarum

Is

Sebe-

Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum l j.

* Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias. Colentur, & colaturæ addantur Sapæ P ij.

Mellis despumati P j.

Scammonæ correctæ ʒ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

PVRGAT Melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt psora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, impetigo: & morbus Gallicus.

Diaphœnicon D. Mesuæ.

℞. Dactylorum Hieron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ʒij. ʒ ij.

Penidiarum ʒ j. ʒ j.

Amygdalorum [dulcium] ʒ v.

Turbith ʒ v. ʒ ij. ʒ.

* Scammonæ [i. Diagridii] ʒ ij. aliis ʒ iij. ʒ ij.

* Zingiberis Piperis longi

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Ligni Aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ʒ j. ʒ v.

A Mellis despumari triplum, hoc est, l j.

ʒ iij. ʒ vj.

Fiat

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis usus, tamq̃ dubiosa atque difficilis compositionis medicamento, adeo ut etiam à duobus Pharmacopœis vix eodem concinnetur modo; mirum inquam, hîc silere, nihilq̃ serii dicere (ut Euchsium si leam) Francisc. Apollinem, eundemq̃ tam inspidum esse, ut quid per Amygdala absolute hîc posita, intelligendum; quantum Scammonii (nam admodum diuersa est lectio) quantum Mellis, in quo hoc loco grandior, quàm in quouis alio medicamento, cardo versari deberet, sumendum sit, nihil Apolline dignum proferat, aut ridicula indicet atque scribat: cum tamen plurimis locis, verborum ac vocum inanium multas myriades temerè ac futiliter effundat. Quoniam verò (quantum ad Mellis quantitatem attinet) senèque hîc uniuersali regula abuti velle dicat Franciscus: per quam si Mellis triplum intelligat, nonne libra nouem Mellis hîc sumenda erunt, admodum à tribus procul? Num igitur ad auctoris mentem compositionem hanc se restituisse, ut inquit, gloriari debet? Hunc itaque, hunc Apollinem consulat Pharmacopœus oportet, ut radiis eiusdem illuminatus (nam undique ferè est sibi similis) unde quaque etiam cecutiis atque exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert:

206 L E N I T I V A,
item doloribus ventriculi, & aliis malis
ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus
diebus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ʒ ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridii ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

A Sacchari l' j.

Fiat confectio in rotulis, secundum ar-
tem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque
medicis est vsui.*

P. C. S C H O L.

A [j.] Mutilum in hac Sacchari quantitate
esse Cordum, si ad precedentis Diaphœnici,
aliásve cum Saccharo paratorum medicamen-
torum rationes contuleris, necesse est; Typogra-
phi forsax vitio. In eandem nihilominus nas-
sam satis imprudenter, immò pueriliter ceci-
dere

*dere Fuchsius & nonnulli alii : ita cecum caco
duce labitur.*

Diasena D. Nicolai.

R. Senæ ʒ iiij.
 Auellandarum tostarum num. L.
 Serici tosti ʒ ij.
 Lapidis Armeni loti ʒ j.
 Lapidis Lazuli loti ʒ iiij.
 Sacchari ʒ vj.
 Cinnamomi ʒ j.
 Garyophyllorum Galangæ Piperis
 Spicæ Nardi Indicæ Ocymi
 Foliorum Garyophyllorum
 Cardamomi
 Croci Zingiberis Zedoariæ
 Florum Rorismarini
 Macropiperis ana ʒ ij.
 Mellis despumati l' ij.

LAPIS Armenus, est similis lapidi Lazuli, sed non est tantopere ceruleus, sed magis viridis.

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atque saporem habent Garyophyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quartana tristitiaque affectis, lienosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

Bene.

Benedicta laxativa D. Nicolai.

℞. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

A Diagridii Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum

Spicæ Nardi Indicæ

Zingiberis Croci

Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco,
vel Calamus aromaticus]

Cardamomi minoris Seminis Apii

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci]

Granorum solis [id est, Milii solis] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc

* est, lʳ j. ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

*Per semen Asparagi & Rusci intellige carnem
& pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.*

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsi alio-
rumq; sententia, hæc Esula ʒ x. esse sumendas
arbitrantium: etenim cum Cordo ʒ v. suffi-
cere bona ratione dico. Brevis undique esse cogor.HYMORES pituitosos, potissimum
ad articulos decumbentes, elicit. A reni-
bus quoque & vesica purgat.*Electua-*

*Electuarium Elefchof sine Episcopi,
D. Mesue.*

℞. Scammoneæ Antiochenæ [vel Dia-
gridii]

Turbith optimi ana ʒ vj.

Garyophyllorū Cinnamomi Zingiberis

Myrob. Emblicorum Nucis moschatae

Polypodii ana ʒ ij. β.

Sacchari ʒ vj.

Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.

P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj.] *Prater exempla ex Mesue,
praterq̃ rationes, Fuchsius & Franciscus
Alexand. hīc ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitam elicit: fla-
tus quoque expellit: doloribus articulo-
rum, laterisq̃ prodest, itemq̃ colicis
cruciatibus: ad renes etiam & vesicam de-
cumbentes humores expurgat.

Electuarium de Psyllio D. Mesue.

℞. Succī Buglossæ domesticæ

Succī Buglossæ agrestis Succī Endiuīæ

Succī Apīi, omnium coctorum & despu-
matorum ana l' ij.

Succī Fumi terræ ʒ iij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas
subsequentia:

℞. Cu-

R. Cuscutæ Anisi Senæ ana ℥ β.
Capilli Veneris m. j.

A Asari ℥ iiij.

Spicæ Nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bullierint, co-
lentur: & colaturæ iniiciantur

Psyllii seminis integri ℥ iiij.

Macerentur per xxiiij horas, singulis
horis agitando: deinde sūme expressæ à
Psyllio mucilaginis l' iiij.

Sacchari albissimi l' ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem,
addendo pulueris

★ Trochiscorum Diarhodon

de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

★ Scammonii in Cytonio malo cocti ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticam potes intelligere
Boraginem, vel magnam illam italicam Bu-
glossam.*

P. C. SCHOL.

A Asari ℥ iiij.] Sic legendum esse, ritè quoque
Fuchsius monet. Cordus enim, Asari, Spicæ
ana ℥ ij. perperam hic legebat.

FLAVAM bilem euocat, febribus ar-
dentibus & curatu difficilibus auxiliatur;
dolori

dolori capitis & vertigini à biliosorum
humorum euaporationibus procreatis,
morbo regio, & iecori supra modum ca-
lesfacto.

Electuarium Rosatum D. Mesue.

℞. Succi Rosarum rubearum perfectarum
℥ iij.

Sacchari Tabarzeth [*id est, albi*] ℥ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem mollius-
culum, dum ad mellis consistentiam
usque densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iij.

Galliæ moschatæ veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens: ob id sa-
lubre biliosis affectibus, arthritidi calide,
cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum
dolori, ictero.

*Electuarium de Succo Rosarum
D. Nicolai.*

℞. Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albißimi ana ℥ j. ℥ iij.

Diagridii ℥ j. ℥ iij.

San-

Santali rubri Santali albi
 Santali citrini ana 3 vj.
 Spodii de Ebore 3 iij.
 Caphuræ 3 j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde triæ species adiiciantur.

Hæc compositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

*Diaturbith cum Rhabarbaro,
 D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi
 Hermodactylorum ana 3 j.
 Rhabarbari 3 x.
 Diagridii 3 iij.
 Santali albi Santali rubri Violarum
 Zingiberis ana 3 j. β.
 Mastiches Anisi Cinnamomi
 Croci ana 3 β.
 Sacchari albissimi triplum, hoc est P j.
 3 ij. 3 ij.

Potest fieri in liquida & solida substantia.
 Est Cholagogum, Phlegmagogum, &
 Melanogogum. [Verminosis & hydropi-
 cis vtile.]

Dia-

*Diaturbith mains D. Petri de
Tusignano.*

℞. Turbith optimi ℥ j.
Diagridii
Zingiberis ana ℥ iiij.
Cinnamomi
Caryophyllorum ana ℥ ij.
Galangæ Piperis longi
Macis ana ℥ j.
Sacchari albißimi ℥ viij. ℥ v.

EDUCIT phlegmaticos humores, &
purgat, & calefacit.

*Diaturbith minus Zezaris, ex Mesua *
cap. de Turbith.*

℞. Turbith albi & gummosi ℥ x.
Zingiberis ℥ v.
Mastiches ℥ iiij.
Sacchari albißimi ℥ vi. ℥ vj.
LEVITER purgat phlegma à stomacho.

*Diacarthamum D. Arnoldi A
de Villanova.*

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ℥ β.
Pulpæ Cytoniorum ℥ j.
Medullæ seminis Carthami ℥ iiij.
Zingiberis albi ℥ ij.

Dia;

Diagridii 3 ij.

B Turbith 3 vj.

* Mannæ granatę 3 ij.

Mellis rosati colati 3 j.

* Hermodactylorum 3 iiij.

Sacchari albissimi 3 x. 3 iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reseruare volueris, mel rosatum non conuenit addere.

PULPA siue caro Cytoniorum hic requiritur exsiccata.

P. C. SCHOL.

A Diacarthamum.] Cum apud diuersos auctores diuersimodè legatur Diacarthami descriptio, atque hanc quoque ab Arnoldi variare dicat Franciscus Alexander; Arnoldo tamen hanc acceptam feremus, tantisper dum eiusdem genuinam descriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris monstrauerit. Inter ea quoniam hanc utilem repererint multi, eam conficere Officinę possunt.

B Mannæ 3 ij.] 3 ij. hic legi debere vel pueri animaduertent, ita ut à tot tantisque viris (qui alioquin se satis emunctariis esse putant) id non esse olfactum, stupescam. Sed innumera huiusmodi hocce in libello restituta conspicias, ab aliis ne cogitata quidem; quorum rationes in aliud tempus seruamus.

PRODEST in euacuatione cholerae & phlegmatis.

Hiera

Hiera Picra simplex D. Galeni.

A

℞. Cinnamomi

Xylobalsami [*aut succedanei eius*]

Asari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Mastiches Chia ana ʒ vj.

Aloës non lotæ ʒ c.

Mellis despumati ℞ iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua
quàm solutiua esse debeat, cum aloë lota
conficienda est.

P. C. SCHOL.

*Vt ex ipsissima Galeni mente confectio hæc A
paretur, qualiq; modo à peritis medicis hodie
confici iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tan-
tùm imponenda sunt.*

CONTRA biliosos, putres, marcidosque
humores, qui ori ventriculi infederunt, re-
medio est; item iis quorum faciem pallor
decolorauit: iis quoque quorum oculis
obiectæ culicum aut pilorum imagines
obuersantur. Alui recrementa mediocriter
mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit
quibus iecur calidius exhibet negotium;
& stomachum iauat.

Hiera picra cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë
Agarici

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës non lotæ ʒ j.

Mellis despumati ʒ vj.

Hiera Picra composita D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ

Croci Schoenanthi Asari

Xylocasie

Xylobalsami } quorum loco sumantur suc-

Carpobalsami } cedanea, ut supra.

Violarum Absinthii Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

A Mastiches ana ʒ ij.

Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.

Mellis despumati ʒ viij.

P. C. SCHOL.

A Ana ʒ ij.] *Fuchsius ana ʒ β. legi vult, Cordum reprehendens; cum in idem recidant: concluduntur enim simplicia omnia unico ana: & Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exemplaria. Inanis itaque est Fuchsi reprehensio.*

FACIT ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias: stomachum quoque optimè purgat: affectiones hepatis emendat: splenis duritiam & densitatem emollit & extenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

Hiera-

*Hieralogodium, seu potius Hiera
Logadii, D. Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocynthidis
Polypodii ana ʒ ij.
Euphorbii Polii montani minoris
Cocci Gnidii ana ʒ j. β. ḡ vj.
Absinthii
Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ḡ xij.
Centaureæ minoris Agarici
Hammoniæ
Folii [aut succedanei eius]
Spicæ Nardi Indicæ Scillæ assatæ
Diacridii ana ʒ j.
Aloës Comarum Thymi
Cassæ lignæ Chamædryos Bdellii
Prassii ana ʒ ij. ḡ xiiij. A
Cinnamomi Opopanacis Castorei
Aristolochiæ longæ Leucopiperis
Macropiperis Melanopiperis Croci
Petroselinii Macedonici
Sagapeni ana ʒ β.
Hellebori nigri
Hellebori albi ana ḡ vj.
Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x. *
3 iij. ʒ j. ḡ iiij.

*Quadam exemplaria habent Colocynthidis
ʒ ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-
positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui
habet hanc proportionem.*

K

Cocci

Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. s. Alexandrinum Nicolaum sequi volumus impressum, qui habet 3 xvij. & hac compositio habet decimam partem Nicolai: itaque si 3 j. β. & ḡ xij. multiplicantur per decem, erunt 3 xvij.

Nota 3 ij. & ḡ xiiij. sunt decima pars drachmarum novem: in Nicolao autem Alexandrino impresso non novem, sed undecim legitur: sed hoc factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponentium, quamvis impressus codex pro xj. habeat 11. id est undecim per ciphras scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xj. indicat degradatio ponderis in tota hac confectio.

P. C. SCHOL.

- 1 3 ij. ḡ xiiij.] Fuchsius sinistrè ex Myrepso legit hic 3 j. tantum.
- 2 Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij.] In Nicol. Alex. non aduertit mendum Cordus. Non enim 3 xvij. sed 3 xvj. legendum esse, & ratio & Myrepso Fuchsi docent: quare in contextu 3 j. β. ḡ vj. rectè à Cordo posita sunt, præter suam ipsiusmet existimationem.

Exterminat diurnas & inueteratas passiones, id est, maniam, & omnes melancholias atque epilepsias. Scoromaticos, id est vertiginosos & spumantes, caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus,

vt vi-

ut videantur quasi demonium habere, qui appellantur spatii, data purgat, ne incendium aut lipothymia generetur corpori, quod superscriptis passionibus subiacet; quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit. Datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, spleneticis. Elicit menstrua. Nephreticos, arthriticos, & ischiadicos subleuat: Venena & venenatas passiones & morsus admodum persanat: Lepras & varias zermas emendat. Est autem sine ullo periculo; neque alias molestias infert accipientibus: daturque de ea ter in mense pondus drachmarum trium, cum mulsæ cyathis iij. & salis cochleari.

Hiera Pachii, ex descript. Nicolai Alexandrini.

R. Stœchados	Marrubii
Chamædryos	Agarici
Colocynthidis	ana ꝯ x.
Opopanacis	Sagapeni
Petroselinii	Mali terræ
Piperis albi	ana ꝯ v.
Cinnamomi	Spicæ Nardi
Myrrhæ	Folii
Croci	ana ꝯ iij.
Mellis despumati triplū, id est ꝯ cclxxxv.	
qui faciunt ꝯ iij. ꝯ iij. ꝯ v.	
Arida omnia in tenuissimum puluerem	
K 2	tundito:

tundito: liquores verò, opopanacem, fagapenum, electa & pura in mortario tundito. deinde in feruenti mortario cum melle despumato feruenti adhuc vnito, ac reliquis misceto, cum omnino leuigata fuerint. Cum verò mel ad dissoluendos hos liquores accipies, de suprascripta quantitate sumito, nihil addendo.

M A L V M terra, id est, radix *Aristolochia rotunda* vere.

Scribonius Largus mirum in modum effert huius *Hiera* virtutes, quemadmodum etiam *Marcellus*. Itaque non abs re fuerit tutò ea uti, cum & nos eius efficaciam aliquoties experti simus.

✠ hac nota significat Romanis scriptoribus denarium. Est autem denarius pondus Romanum, drachmâ paulò grauius. Nam drachma octo faciunt unciam, cum denarii septem constituent unciam: non rarò tamen indifferenter pro drachma accipitur, sed malè.

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, cephalalgicos: facit ad deprauatam in vtrambet partem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit: Prodest ad articulare morbum, ad spinæ totius & lumborum dolo-

dolorem. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter acescit cibus, aut assidue nauseant aut salua abundant. præcipuè verò Melancholicis benefacit, &c.

*Catharticum Imperiale, D. Nicolai
Alexandrini.*

R. Diagridii

Sacchari ana ʒ viij.

Cinnamomi Nardi

Saxifragiæ

Polypodii ana ʒ iiij.

Garyophyllorum

Zingiberis

Celticæ [id est, Spica Celtica]

Macropiperis Melanopiperis

Cardamomi

Amomi [eius vice sume nostrum Calamum aromaticum] ana ʒ iiij.

Mellis despumati P j. ʒ iiij. ʒ vij.

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt, mediam habet figuram, & magnitudinem inter Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur Stinplei, [aut Steinpoley.]

CAPVT optimè purgat, os bene olens reddit: ex stomacho & toto corpore vtramque bilem deducit.

K 3

Pul-

Pulvis medicaminis Turbith,
D. Avicenna.

℞. Zingiberis albi
Mastiches ana ʒ x.
Turbith subtiliff. puluerizati ʒ x.
Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.
Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos: da-
tur pueris, mulieribus, senibus, & humi-
dis, delicatis & otiosis.

Pulvis Senæ preparata,
D. Montagnana.

℞. Senæ mundatæ ʒ xij.
Zingiberis
Macis ana ʒ iij.
Cinnamomi
Tartari ana ʒ j. β.

Hæc in puluerem redacta commiscean-
tur.

Dosis ʒ j. ante cenam.

PURGAT caput mirabiliter.

Pulvis aut Tragea laxativa.

℞. Turbith ʒ j.
Zingiberis Cinnamomi
Mastiches Galangæ
Cardamomi minoris

Garyo.

STERNVT. ET NASALIA. 229

Garyophyllorum

Anisi Hermodactylorum

Diagridii ana ℥ β.

Foliorum Senæ ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Purgat choleram, phlegma & melancholiam.

Puluis Sternutatorius.

℞. Radicum Pyrethri ℥ β.

Castorei ℥ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ℥ j.

Maioranæ m. j.

Misceantur : fiat puluis lege artis.

Nasalia.

℞. Calaminthæ

Maioranæ Radicis Ireos

Seminis Nigellæ Castorei

Seminis Staphysagriæ ana ʒ j.

Hellebori albi Pyrethri

Nucis moschatae Myrrhæ rubæ

Euphorbii ana ʒ ij.

In pulueres singula conterantur : deinde cum Ladani ʒ vj. & melle modico formentur nasalia.

K 4

SVR

224 SUPPOSITORIA ET PILVLÆ.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle & sale simul coctis ad debitam crassitiem.

Species ad Glandes, aut Suppositoria acuta conficienda.

℞. Hellebori albi
Granorum Colocyntidis ana ʒ j. β.
Esulæ præparatæ
Hermodytylorum ana ʒ j.
Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni
3 ij.
Misceantur puluerizata.

PILVLÆ.

Pilula Alephangine, D. Mesue.

℞. Cinnamomi Cubebarum
Ligni Aloës
Calami aromatici Macis
Nucis moschatæ
Cardamomi
Garyophyllorum A sari
Mastiches Schœnanthi
Spicæ Indicæ
Carpobalsami [aut succedanei eius] ana ʒ j.
Abfin-

Abſinthii ſicci Rosarum ana 3 v.

Conterantur groſſo modo, & infundantur in aqua ꝑ duodecim, & coquantur lento igne in duplici vaſe, uſque ad conſumptionem duarum partium, id eſt, ad remanentiam tertiæ partis: deinde exprimantur fortiter, & colentur. In colaturæ ꝑ duabus diſſolue Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vaſe lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum ſiccata, ꝑj. agitentur ſimul continuè in Sole: deinde addantur pulueris Myrrhæ, Maſtiches ana 3 v. Croci 3 iij. Deinde quod reliquum eſt colati decocti ex aromatibus etiam affundito, & exiccentur ad Solem vel in ſtufa, admiscendo ſubinde quod denſatum eſt, liquido: & linteo puro vas obtegatur, aduerſus incidentium muſcarum & fordiū iniurias. Poſtremò reponatur maſſa, & fiant Pilulæ parvæ, cū neceſſitas requirit.

PILULÆ Alephangina compoſita ſunt à Meſue, ut confortent potiùs ſtomachum & cerebrum, quàm ut alium ducant. Propterea Aloën toties lotam requirit, & nullum ſolutivum medicamentum eis admiscet, ſed confortantia omnia, niſi quis ſolum Aſarum excipiendum eſſe contendat.

Iſtæ Pilulæ ubique ſunt in frequenti uſu, ſed rariffimè ut decebat conficiuntur. nam detrachunt ponderi & numero aromatum, & augent

K 5

pound

pondus Aloës : quidam etiam impurissimam Aloën admiscunt, aut ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cū tamen omnia aromata tenuissimis consistant viribus, quae facile inter decoquendum resolvuntur : adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quae incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam, voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massa Pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & Aloën in colatura dissolunt : alteram autem partem aromatum in minutissimum pulverem redactam, inter exiccandum massae admiscunt; non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putridis, pituitosis purgant, & induratum dolorem dissipant : ventriculum roborant, & concoctionem eius iuvant.

Pilula Assaieret, D. Avicenna.

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione

Galenī ʒ ij.

Mastiches.

Myrobal. Citrinorum ana ʒ β.

Aloës optimæ ʒ ij.

Syrus

PILULÆ.

Syrupi de Stœchade q. s.

Fiat Massa

BILEM flauam & pituitam sine molestia è ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caputè ventriculo dolent, conueniunt; nec non in subtilibus catarrh̃is.

Pilula Arabica, D. Nicolai.

℞. Aloës optimæ ʒ iiij.

Radiciſ Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

Mastiches Diacridii Afari

Rosarum ana ʒ j.

Castorei ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Lætitiā generant, mentisq̃ue vigorem conseruant: Visum acuunt, auditumq̃ue amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

Pilula Arthritica sine Arthetica,

D. Nicolai.

℞. Hemodactylorum Turbith.

K 6

Agg.

- Agarici ana ʒ iiij.
 * Colocynthidis Casia lignee veræ
 Spicæ Nardi Indicæ
 Garyophyllorum
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 * Macis Galangæ
 * Zingiberis Mastiches
 * Allæ foetidæ Fœniculi
 Anisi Saxifragiæ
 Seminis Asparagi
 Seminis Rusci [id est, Brusci]
 Rosarum
 Granorum solis [id est, Milii solis]
 Salis gemmei ana ʒ β.
 * Scammonii ʒ ij.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succi Fœniculi q. f.
 Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pul-
 pa illa carnosæ accipi debet, abiectis corneis seu
 osseis seminibus: idq; semper est obseruandum.*

VALENT ad podagram, aliosque ar-
 ticulorum dolores.

Pilule de Agarico D. Mesua.

- * R. Agarici ʒ iiij.
 Ireos
 * Prassii ana ʒ j. Turbith ʒ v.
 Hieræ picræ ʒ iiij.

Colo-

Colocynthis
Sarcocollæ ana ʒ ij.
Myrrhæ ʒ j.
Sapæ quantum sufficit.
Fiat Massa

Ego consulerem, ut Hiera picra nondum melle commista acciperetur, hoc est, species eius aromatica cum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hiera picra simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum, ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & alijs thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula Aurea, D. Nicolai.

℞. Aloës Diacridii ana ʒ v.
Rosarum
Seminis Apii ana ʒ ij. β.
Anisi Fœniculi
Mastiches ana ʒ j. β.
Crocī
Pulpæ Colocynthis ana ʒ j.
Mucilaginis [seu infusionis] Tragacanthæ q. s.
Fiat Massa.

CAPUT expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deiciunt.

Pilula Aggregatina, D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum
 Rauced. Seni ana ʒ iiij.
 Succu Eupatorii
 * Succu Absinthii ana ʒ iiij.
 Diacridii ʒ vi.
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Agarici Colocynthidis
 Polypodii ana ʒ ij.
 Turbith optimi
 * Aloës ana ʒ viij.
 Mastiches Rosarum
 Salis gemmei Epithymi
 Anisi Zingiberis ana ʒ j.
 Electuarii de succo Rosarum Mesue q. s.
 Fiat Massa.

RAVED Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

SUCCI Eupatorii & Absinthii debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Weyssaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic eris faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Pilula

Pilule Benedictæ, D. Nicolai.

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒvj.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

Humores pituitosos, potissimum
ad articulos decumbentes, eliciunt: à re-
nibus quoque & vesica purgant.

*Pilule Cochiae D. Rhasis 9. ad
Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.

Scammonæ ʒ ij. β.

Turbith Stœchadis ana ʒ v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOECHAS eum simpliciter & indefinitè
ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalicæ [Pilulæ] rectius appellan-
tur, quòd scilicet caput magna efficacia
expurgent, ex eoque ac nervis humores
crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis, 9. ad Almansor.
ad faciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum

Spicæ Nardi Indicæ

Mastiches.

Xylo-

Xylobalsami [*aut succedanei eius*]

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Cinnamomi

* Xylocastæ veræ [*id est, Cassia lignea*]

Afari [*videlicet radicem eius*] ana ʒ j. ʒ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat Puluis.

Pilula de Colocynthide, D. Mesua.

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellii mollis

* Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Nigellæ Cymini Carmeni

Origani Persici

Nasturtii albi Salis gemmei

Absinthii ana ʒ j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, *id est, Orientale, ex Carmania regione.*

ORIGANVM Persicum, *idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.*

NASTURTIVM album, *id est, Thlaspi, Germanicè Wegekressen: significat etiam Meretich.*

VALENT ad affectus pituitosos & melancholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilula

Pilula de Eupatorio maiores
D. Mesua.

℞. Myrobal. Citrinorum
Succi Eupatorii Mesuæ
Succi Absinthii ana ʒ iiij.
Raued Seni [*id est, Rhabarbari*] ʒ iiij. β.
Mastiches ʒ j.
Crocī ʒ β.
Aloës bonæ ʒ v.
Succi Endiuix quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICE profunt in febribus intermittētib; biliosis, morbo regio, iccinorisq; obstructionibus.

Pilula de Euphorbio D. Mesua.

℞. Euphorbii
Colocynthidis Agarici
Bdellii mollis
Sagapeni ana ʒ ij.
Aloës ʒ v.
Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

A dēmittendam hydropicorum flauam aquam, & materiam tumoris discutendam valent: Opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata.

Pilule

Pilula Foetida maiores, D. Mesua.

℞. Sagapeni Hammoniaci
 Opopanacis
 Bdellii mollis Colocynthidis
 Seminis Rutæ
 Aloës Epithymi ana ʒ v.
 Hermodactylorum
 Esulæ minoris ana ʒ ij.
 Scammonæ ʒ iiij.
 Cinnamomi Sylicæ Nardi Indicæ
 Croci Castorei ana ʒ j.
 Turbith ʒ iiij.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Euphorbii ʒ ij.
 Succī Porri [præsertim foliorum] q. s.
 Fiat Massa.

VACVANT pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iuncturarum, ventericuli, colico, alphis, elephantia, & albaras.

Pilula Foetida, D. Rhafis.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhafis ʒ x.
 Colocynthidis interioris ʒ v.
 Euphorbii ʒ ij. β.
 Castorei Piperis Assæ foetidæ
 Saga-

Sagapeni Opopanacis Scitaragi

Sinapi ana 3 j.

Centaureæ minoris Elaterii ana 3 v.

Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur: deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est herba similis Thlaspi maiori, id est Merretich: Latine vocatur *Lepidium maius*: Germanice, Roskressen, Psaffertwurtz, Romschkressen, & Maurkressen: accipienda autem sunt radices eius, aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum Cucumeris asinini exsiccatum.

Pilule de Fumo terre. D. Avicenna.

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrob. nigrorum [id est, Indorum] ana 3 v.

Aloës 3 vij.

Scammoneæ 3 v.

Succi Fumi terræ clarificati quantum sufficit, ut formetur ter hæc massa: nam cum primò fuerit siccata massa, plus succi est addendum; & rursus exsicce-
tur; idque tertio est faciendum.

EDUCUNT è corpore humores bilio-
sos, acres & salfos: ideoque aduersus om-
nia cutis vitia valent.

Pilule

*Pilula de Hermodactylis maiores,
D. Mesue.*

℞. Hermodactylorum
Myrobal. Citrinorum
Aloës Turbith Colocynthidis
Bdellii mollis Sagapeni ana ʒ vj.
Castorei Sarcocollæ Euphorbii
Opopanacis Seminis Rutæ
Seminis Apii ana ʒ iiij.
Crocī ʒ j. β.
Succi Caulium quantum sufficit.
Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

Pilula Indæ Haly, D. Mesue.

* ℞. Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]
* Hellebori nigri Polypodii ana ʒ v.
Epithymi Stœchados ana ʒ vj.
Agarici Lapidis Lazuli loti
* Colocynthidis
* Salis Indi [*aut Salis gemmei*] ana ʒ iiij.
Succi Eupatorii inspissati
Spicæ Indicæ ana ʒ ij.
Garyophyllorum ʒ j.
Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ xij.
Succi Apii quantum sufficit.
Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
can-

cancrum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholicum morbum, & inde ortum timorem & mœrorem, quartanam, icterum spleneticum, & dolorem splenis.

*Pilula Hieræ simplicis, Galeni,
lib. 6. Tuenda val.*

R. Aloës ʒ L.

A

Cinnamomi

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Afari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Mastiches Chiæ ana ʒ iij.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia A conficiantur, & veluti apud peritiores hodie usus obtinuit, Aloës ʒ xlv. & Croci ʒ ij. s. tantum hîc indenda sunt.

ADVERSUS vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata, profunt.

*Pilula de Hierâ composita,
D. Nicolai.*

R. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ

Croci

Schœnanthi

Afari

Xylocastie

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Carpo-

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Violarum Absinthii

Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthis

Mastiches ana ʒ j. [al. ʒ ij.]

Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij.

Fiat Massa cum aqua Endiuiae.

OPREM ferunt vitiis capitis, nervorum-
que ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilule Hieræ, cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës bonæ ʒ j.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

AVXILIANTVR stomachicis, asth-
maticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis
à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilule de Lapide Lazuli, sine Cyaneo,
D. Mesue.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi Polypodii ana ʒ viij.

Scammoneæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut Gemmei ana ʒ ij. ℞.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum Anisi ana ʒ iiij.

* Specierum Hieræ simplicis Galen ʒ xv.
Succi

Succi Endiuia quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
ex bile vsta natos.

Pilula de Lapide Armenio,

D. Mesue.

℞. Lapidis Armenii loti & præparati

Hieræ pictæ ana 3 v.

Epithymi Agarici

Polypodii ana 3 viij.

Scammonæ coctæ in Cytonio 5 iij.

Garyophyllorum 3 j.

Salis Indi [aut Gemmei] 3 j. β.

Cum succo Endiuia conficiatur Massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam
multiplicem vtramque clemēter vacuant:
ob id morbis inde natis conferunt.

Pilula de Mezereo D. Mesue.

℞. Foliorum Mezerei præparatorum 3 v.

Myrobal. Citrinorum 3 iiij.

Myrobal. Chebulorum 3 iij.

Confice cum Thereniabin vel Tama-
rindis in aqua Endiuia dissolutis q. s.

THERENIABIN sine Tereniabin, est
Manna Orientalis, que Græcis vocatur Drefo-
meli & Aëromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-
gant, seu aquas: ob id hydropem sanant.

Pilula

Pilule Lucis maiores, D. Mesue.

℞ Rosarum Violarum Absinthii
Colocynthis Turbith Cubebarum
Calami aromatici

Nucis Moschatæ

Spicæ Nardi Indicæ Epithymi

Carpobalsami [*aut succedanei eius*]

Xylobalsami [*aut succedanei eius*]

Seselios Seminis Rutæ

Schoenanthi Asari

Mastiches Garyophyllorum

Cinnamomi

Anisi Fœniculi Apii

Cassæ lignæ [*videlicet vera*]

Croci Macis ana ʒ ij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Raued Seni [*hoc est, Rabarbari*] ana ʒ v.

Agarici Senæ ana ʒ v.

Euphrasiæ ʒ viij.

Aloës Succotrinæ ad pondus omnium,

id est ʒ viij. & ʒ ij.

* Succu Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa
educunt, visumque roborant.

Pilu-

Pilule Lucis minores, D. Mesuae.

℞. Xylobalsami [*aut succedanei eius*]
 Carpobalsami [*aut succedanei eius*] ana ʒ j.
 Chelidoniae [*videlicet maioris radicis*] ʒ v.
 Rosarum Violarum Absinthii
 Euphrasiae ana ʒ iiij.
 Senae Epithymi
 Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Myrobal. Bellericorum
 Myrobal. Emblicorum
 Agarici Colocynthidis
 Schœnanthi Lycii
 Lapidis Lazuli loti ana ʒ ij. β.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succī Fœniculi aut Chelidoniae quantum
 sufficit.

Fiat Massa.

Idem quod priora possunt; atram ta-
 men bilem magis vacuant.

Pilule Mastichinae Petri de Ebano, A
sive Conciliatoris.

℞. Mastiches ʒ iiij.
 Agarici optimi ʒ iiij.
 Aloës electæ ʒ x.
 Infundatur Agaricus in Aceto & Oxy-
 melle

- * melle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exiccetur: deinde formetur Massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syropo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

- A *Eo quod Cordus bis eandem pilularum harum descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.*

Præservant stomachum ab omni ægritudine: leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi; & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis: & vitia matricis corrigunt.

*Pilule de Aloë & Mastiche,
D. Nicolai.*

℞. Aloës ʒ j. Mastiches ʒ β.
Garyophyllorum
Rosarum rubearum ana ʒ j.
Crocī Diacridii ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthii.

Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

Pilule

Pilula de Aloë lota.

℞. Aloës lotæ cum succo Rosarum rubearum ʒ j.

Agarici Trochiscati ʒ iiij.

Mastiches ʒ ij.

Specierum Diamoschi dulcis ʒ β.

Cum vino Maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscerareliqua, oculos, vterum putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilula de Rhabarbaro,

D. Mesue.

℞. Raved. Seni [*id est, Rhabarbari*] ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Succi Absinthii

Mastiches ana ʒ j.

Myrobal. Citrinorum ʒ ij. β.

Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ʒ β.

Trochiscorum diarhodon ʒ iiij. β.

Hieræ picræ simplicis ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iccinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

L 2

Pilula

*Pilula Pestilenciales Rufi, quæ aliter
De tribus vocantur.*

R. Aloës electæ ʒ ij.
* Myrrhæ optimæ ʒ j.
* Croci sinceri ʒ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ aduersus pestiferæ luis
contagia populatim grassantia pōllent.
Humores etiam ventriculo infarctos edu-
cunt.

*Pilula de Sarcocolla Haly,
D. Mesuæ.*

R. Sarcocollæ ʒ iiij.
Turbith ʒ iiij.
Colocynthidos
Zingiberis ana ʒ j. β.
Salis Gemmei ʒ j.
Aquæ Rosarum q. s. Fiat Massa.

PITUITAM vacuant : ob id pituitosis
affectibus commodant.

* *Pilula Sine quibus esse nolo,
D. Nicolai.*

R. Aloës optimæ lotæ ʒ xiiij.
Myrobal. Citrinorum
Myrobal. Chebulorum

Myro-

Myrobal. nigrorum [*id est*, Indorum]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabbari Mastiches Absinthii

Rosarum Violarum Senę Agarici

Cuscutæ ana ʒ j.

Scammoneæ præparatæ ʒ vj. β.

Dissoluatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti; & cum hac dissoluta Scammonea formetur Massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam: valent propriè ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

Pilula Stomachicæ Alkindi, D. Mesuæ.

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. nigrorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ iiij.

Rosarum Mastiches ana ʒ ij.

Cardamomi Ligni Aloës

Santali Citrini Cubebarum

Garyophyllorum Schœnanthi

Nucis moschatæ ana ʒ j.

Raued Seni [*id est* Rhabbari] ʒ β.

Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa [cum vino odorifero & melle.]

L 3

Cere-

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

Pilule Stomachicae D. Mesuae.

℞. Myrobal. Citrinorum Aloës
Turbethi ana ʒ x.
Rosarum Spicæ Indicæ
Mastiches ana ʒ ij. β.
Anisi ʒ j. β.
Salis Indii [*aut salis Gemmet*]
Croci ana ʒ j.

Formetur Massa cum succo Absinthii.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilule Imperiales Magistrales,
seu incerti auctoris.*

℞. Cinnamomi
Amomi [*eius loco sumatur Acorus verus*]
Anisi Mastiches
Cardamomi minoris
Zingiberis Zedoariæ Maceris
Nucis Moschatæ
Garyophyllorum Croci
Cubebæ Ligni Aloës Turbethi
Terreniabin [*id est, Manna*] Agarici
Folio-

Foliorum Senæ

Spicæ Indicæ [*addunt alij*]

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Rhapontici veri [*id est, Rhabarbari,*] ad
pondus omnium

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cum Syrupo Rosato aut
Violato.

MODICVM solunt; & plurimum
confortant stomachum, & omnia inte-
stina frigida: muniunt virtutes naturales,
remouent frigiditatem, clarificant san-
guinem & spiritum.

Pilule de Opopanace D. Mesuæ.

℞. Opopanacis Hermodactylorum

Sagapeni Bdellii mollis Ammoniaci

Colocynthidos ana ʒ v.

Croci Castorei

Myrrhæ rubræ Zingiberis

Piperis nigri Macropiperis [*id est, longi*]

Cassie lignæ Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Scammoneæ ʒ ij.

Turbethi ʒ iiij.

Aloës ʒ xij.

L 4

Cogan-

Cogantur in massam cum infusione
gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmum cy-
nicum, gonagram, podagram, & aliorum
articulorum dolores, morbosque partium
neruofarum frigidos.

Pilula de Quinque generibus Myrobal.
D. Nicolai.

R. Quinque genera Myrobalanorum
Agarici Diacridii Colocynthidos
A Senæ ana ℥ β.
Epithymi Turbethi Anisi
Marathri [seu Fœniculi] Mastiches
Lapidis Lazuli præparati ana ℥ ij.
Aloës ℥ j.

Formetur massa cum succo Absinthii.

P. C. SCHOL.

A Ana ℥ β.] Cum Cordus hic ana ℥ β. depræ-
uatè posuisset, Fuchsius aquè malè ℥ ij. β. le-
gendum putat.

EDVCUNT humorem cholericum,
phlegmaticum & melancholicum; & cla-
rificant sanguinem.

Pilula de Octo rebus, sine Octomera.
D. Nicolai.

R. Aloës Diacridii ana ℥ ij.
Interioris Colocynthidis Epithymi
Aga-

Agarici Mastiches Dauci Cretici
Myrob. Chebulorum Absinthii ana ʒ ij.
Cum succo Solani conformetur massa.

P V R G A N T humores crassos à capite:
visum clarificant; & cataractas oculorum
prohibent.

Pilule de Serapino, D. Mesue.

ʒ. Sagapeni Ammoniacy Opopanacis
Bdellii ana ʒ ij. Sem. Apii Ammios *
Harmalæ [id est, seminis Ruta siluestris]
Anisi ana ʒ j.
Acori [id est, Calami aromatici]
Cassie lignee veræ Calaminthæ A
Centaurii [minoris scilicet]
Polii Costi Salis gemmei ana ʒ β. *
Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.

Cogantur in massam cum aqua aut suc-
co Matricariæ. —

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue
Seitaragum Indum. sed Clementius Clementi-
nus loco eius posuit Cassiam ligneam.

P. C. SCHOL.

Cassie] Seitaragi Indi (quod Lepidium hoc A
loco interpretandum) apud Mesuem legi, rectè
olfecit Euchsium; fallig. Cordum & Clementi-
num dextrè censet.

P O L L E N T ad ischiadem, podagram,
& reliquarum iuncturarum dolorem, ac
etiam vteri; mensesque promouent.

L 5

Pilula

Pilula de Bdellio maiores, D. Mesue.

- ℞. Bdellii ʒ xij. Ammios ʒ iij.
 Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū
 * Conchularum venerearum adustarum
 Succini aut Karabæ ana ʒ ij. β.
 Maceretur Bdellium in succo foliorum
 Porri, & conficiatur massa.
 VALENT ad fluxum hæmorrhoidum &
 vlcerum in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.

- * ℞. Cynoglossæ rad. Opii
 Seminis Hyoscyami ana ʒ iiij.
 Myrrhæ Troglodyticæ ʒ vj.
 Turis masculi ʒ v.
 Caryophyllorum ʒ ij.
 Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.
 Cum aqua rosarum conficiatur massa.
 MAGNAM vim obtinet in tenuibus si-
 stendis destillationibus, ac doloribus mi-
 tigandis.

Pilula Bechica.

- * ℞. Pineorum nucleorum
 Amygdalorum ana ʒ j. β.
 * Glycyrrhizæ ʒ vj.
 Succin

Succi Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Cum aqua Rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollent,
& gutturis ac faucium asperitatem.

Pilula Alephangina D. Valerii Cordi.

R. Myrobalan. Chebulorum

Myrobalan. Citrinorum

Myrobalan. Indorum

Myrobalan. Bellericorum

Myrobalan. Emblicorum ana ℥ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Dictamni nostratis radicum Absinthii

Rosarum ana ℥ iiij.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur priùs in aquæ clarissimæ fontanæ ℞ iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ℞ vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimò Rosas adiiciendo, coquantur vsque ad tertias. Coletur postea validè exprimendo. Hinc in colatura dissolue.

Aloës optimæ & lotæ, ac rursùm exiccatae
℞ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad so-

L. 6. lem.

Iem, aut in stufam; & agitentur sapissimè,
 vt concrefcens in margine Aloë liquido
 commifceatur: cùm verò mellis fpiſſitudi-
 nem fuerint cōfecuta, tunc adde ſequentiū
 ſpecierum puluerem minutiffimè tritum:

℞. Galagæ Cyperi Zedoariæ Doronici
 Ligni Aloës Cinnamomi Schœnanthi
 Nardi Celticæ radicularum

Nucis Moſchatae

Macis Cubearum Cardamomi

Garyophyllorum ana ʒ iiiij.

Maffiches.

Succini [*id eſt, Caraba*] ana ʒ vj.

Myrrhæ Croci ana ʒ iiiij.

Agitentur optimè cùm Aloë ſpecies, &
 fiat maſſa cum diligētia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-
 bent habere, exemptis nucleis ſiue lignis.

PILVLÆ iſtæ Alephangine ſunt efficaces,
 imò efficacioreſ prioribus. Relinquimus tamen
 unicuique liberum arbitrium, alterutram vel
 utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Dictamnus Creti-
 cus, ſed radices Diptamni, quæ vulgò in uſu
 ſunt, & propriè cortex radicum eius. Germani-
 cè vocatur *Aſchvurtz*, proptereà quòd folia
 * eius ſunt ſimilia Fraxina ardori: & hæc eſt vera
 Fraxinella, vulgò ab Italiſ dicta.

Aloën lauandi modus in poſtrema huius li-
 bri parte, quæ eſt De præparatione ſimplicium
 medic. docebitur.

TRO.

TROCHISCI.

Trochisci de Vipera, D. Andromachi.

R. Carnis viperinæ, cū anetho, sale & aqua
coctæ ℥ viij.

Panis tritici purissimi, triti & cribrati, ℥ ij. *

Formentur trochisci cum iusculo, in
quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ; &
inungantur cum Opobalsamo, aut Oleo
Macis aut Garyophyllorum, aut Nucis
moschata: sed Oleum Garyophyllorum
propius accedit ad naturam Balsami. Sic-
centur in loco vmbroso, libero, ventoque
perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vo-
cant *Tirum*, Itali verò *Marassam* & *Scurzio-*
nem, ut scribit *Nicolaus Leoniceus*. Ingre-
diuntur autem hi Trochisci in *Theriacam*. Apud
nos verò nondum licuit videre hoc serpentum
genus. Igitur ex Italia peti debent veri Tro-
chisci de Vipera.

Trochisci Scillitici Andromachi.

R. Scillæ affatæ P j.

Farinę Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

L 7

Tro-

Trochisci Hedychroi, D. Aëtii,

℞. Mari [*sine Maiorana, aut loco eius Dictamni Cretici*]

Asari Sampfuchi

Aspalathi [*eius loco sumatur semē Agni casti*]

Opobalsami [*eius loco accipiat Oleum Garyophyllorum*]

Schoenanthi

Calami aromatici [*eius loco sumatur Galāga*].

Phu Pontici ana ʒ j. ḡ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ʒ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folii [*aut succedanei eius*]

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Cassæ ana ʒ iij. β. ḡ xv.

Amomi [*aut succedanei eius*] ʒ ij. ḡ xij.

* Mastiches ʒ β. ḡ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit : formentur Trochisci.

MARVM herba est non dissimilis Maiorana : Eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

SAMP SV CHVS, id est, Maiorana. Quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Cotula foetida, quæ etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidam odoratus. Eius loco accipe Lignum Aloës, aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM

FOLIUM.] Pro Folio sume Spica Romana
radicum, Macis, ana partes aequales.

Hi Trochisci appellantur ab Arabibus Alin-
daracaron; à recentioribus verò, ut Nicolao,
sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

Trochisci Hedychroi, D. Galeni.

ry. Corticum radicum Aspalathi [ipsius lo-
co sumatur semen Agnicasti]

Calami aromatici [sume eius loco Galangam]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam]

Mastiches ana 3 vj.

Schoenanthi Cinnamomi ana 3 xij.

Amomi Casia *

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]
ana 3 xv.

Nardi Indicæ

Folii ana 3 xvj. *

Myrrha Croci ana 3 xij. *

Omnia subtilissimè trita cum vino Fa-
lerno, in Trochiscos formentur: qui in
umbra exsiccentur, & Opobalsamo aut
Oleo Garyophyllorum inuncti reponan-
tur.

G A L E N U S in libello De Theriaca ad Pam-
philianum scripto, ad hunc modum precipit
conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt
enim proximis non ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere
semen.

semen Agnicasti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Aspalatum legatur aut accipiat.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesum, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè positam, hîc ex Andernaci versione restitui.

Trochisci Hedychroi alii, Galeni.

R. Mari Amaraci [id est, Maiorana]

Asari Aspalathi ana 3 ij.

Schoeni [id est, Squinantibi]

Calami odorati Phu Pontici

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Opobalsami [aut succedanei eius]

Cinnamomi Costi ana 3 iiij.

Myrrhæ

Folii Malobathri [aut succedanei eius]

Nardi Indicæ Croci

Cassæ ana 3 vj.

Amomi [aut succedanei eius] 3 xij.

Mastiches Chiæ 3 j.

Vini Falerni quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in vmbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum vincti.

Pro.

TROCHISCI. 257

Pro Maro, sume Diſſamnum Creticum.

ASPALATHI loco ſume Lignum Aloës,
aut Santalum Citrinum, aut ſemen Agni Ca-
ſſi, ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo, ſume Galangam.

Pro Opobalfamo, ſume oleum Garyophyl-
lorum.

Pro Malobathro, ſume Spica Romana radi-
ces; aut Spica Romana Radicum, & Macis
ana partes aquales.

CASIA, id eſt, Caſia lignea aromatica, A
ſimilis Cinnamomo.

AMOMI loco ſume vocatum Calamum
aromaticum.

MASTICHE Chia, id eſt, Maſtix è Chio
inſula, qua eſt optima.

HÆC eſt genuina Hedychroi compositio,
ut Galenus dicit; & hac debet ingredi Theria-
cam Andramachi ſenioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad
hunc modum carmine deſcribit compositiōnem
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compositio-
nem docet. Nam omnia coniungit coniunctio-
nibus copulatis, & hoc eſt, QVÆ & ET.

Trochiſci Cyphi, D. Damocratis. A

R. Carnium Vuæ paſſæ albæ & pinguiſ-
ſimæ

Terebinthinæ coctæ ana 3 xxiiij.

Myr-

Myrrhæ

Schoeni [*id est, Schoenanthi*] ana ʒ xij.

Calami vnguentarii ʒ ix.

Cinnamomi ʒ iiij.

B Bdellii Onychis Nardi Spicæ

Casię optimæ [*qua est similis Cinamomo*]

Cyperi purgati

Arceuthidum maximarum & pinguiſſi-
marum ana ʒ iiij.

Aspalathi ʒ ij. ʒ. Croci ʒ j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum
& incorporandum.*MELLIS & Vini parum debet addi, ut
tantum cum his conficiantur Trochisci.**CARNES. Vua passa atque Iuniperi bac-
cas recentes & pingues minutissime conscindito
tunditoq; deinde Bdellium Myrrhamq; affuso
vino diluito: postea reliqua omnia in tenuissi-
mum puluerem redigito: ac demum adhibito
modico mellis despumati optimi, Trochiscos for-
mato.**Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.**Per Vuas passas hic intellige eas quas vocant
Vuas Cybibas, vulgo Cibebe.**TEREBINTHINÆ cocta. Quomodo
coquatur Resina Terebinthina, ostendam infe-
rius in tractatu De preparatione medicamen-
torum.**CALAMVS vnguentarius, id est, aroma-
ticus verus; pro quo sume Galangam; quia
hodie*

hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERVM purgatum precipit accipien-
dum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt
obsite radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Juniperi.
hic autem debent accipi Juniperi magna gran-
des bacca: quoniam autem caremus ipsis, vul-
garis & minoris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni Casti,
ex mente Galeni de Succedaneis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur l. 2. Antid. A

Onychis, Bdellii.] Fuchsius unà cum B
Cordo duas hic distinctas res legit, intelligit ac
desendit mordicus. Matthiolus verò atque
Franciscus contrà, unà cum Andernaco &
Martiano Rota Galeni interpretibus pro unica
eademque re, ambas eas voces intelligendas esse
strenuè contendunt, & Unguim Bdellii tanquam
Bdellium ungui simile, legendum esse sentiunt
atque volunt.

Trochisci Ramich, D. Mesuæ.

Rz. Succii Acetosæ [aut loco eius succi Cydo-
niorum austerorum] \mathfrak{z} xvj.

Rosarum \mathfrak{z} j.

Granorum Myrti \mathfrak{z} ij.

Bulliant parum, & colentur: colaturæ
addan-

addantur Gallarum iamiam tenuissimè
tritarum ʒ iij.

Coquantur denuò aliquantulum: dein-
de inspergatur sequentium specierum mi-
nutissimus & optimè commistus puluis:

℞. Rosarum ʒ j.

Santali Machoziri ʒ j. ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ j. ʒ iiij.

Carnium Sumach Spodii ana ʒ j.

* Succi Agrestæ ʒ vij.

* Succi granorum Myrti multum tritorum
ʒ iiij.

* Ligni Aloës

Garyophyllorum

Mastiches [al. Macis]

Nucis Moschatæ ana ʒ iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde ex-
siccantur: exsiccata rursus in tenuissimum
pulverem terantur; & formentur Trochisci
subtiles, cum Camphoræ aureo vno, &
aqua Rosarum q. s. Exsiccantur in vmbra
libera: exsiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, im-
becilla firmant: & lubrica viscera ac inte-
stina, choleram morbum sistunt, acrimo-
niam obtundunt, animum reddunt tran-
quillum, omnem hæmorrhagiam cohi-
bent: ob quam naribus sanguine fluenti-
bus flando impelluntur, aliis medicamen-
tis miscentur.

Tro.

Trochisci de Cappare, D. Mesue.

℞. Corticum radicum Capparis
 Seminis Agni Casti ana ʒ vj.
 Seminis Nigellæ veræ Calaminthæ
 Succu Eupatorii, idest, Gratiolæ]

Acori

Amygdalorum amarorum

Sem. Nasturtii Ammoniacy

Foliorum Rutæ

Radici Aristolochiæ rotundæ veræ ana
 ʒ ij.

Cyperu

Scolopendriæ ana ʒ j.

Formentur Trochisci cum Hammonia-
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati
 reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, &
 non Lingua ceruina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc A
 apud Cordum mansisse cum Fuchsio me-
 ritò conqueratur, nos eam hîc ex vetustis par-
 tim exemplaribus, partim ex Minoritarum in
 Mesuem (ex quibus pleraque alia) restitutio-
 nibus, suæ integritati reposuimus. Qui, in-
 quam, Fraterculi hoc nomine herclè plurimum
 laudis ac præmii merentur, quòd extra profes-
 sionem etiam ea in re plura præstiterint soli,
 quàm innumeri alii; quamquam eos cassitare
 quan-

quandoque, & iudicio carere interdum satis sit in confesso: laborem interim indefessum, quem in restituendo impenderunt, negotiumq; ipsum tam ingens, tantiq; commodi nobis prestitum haud exosculari, magniq; efferre praconiis non debemus. Immerito itaque nimisq; quàm deceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

A d splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

*Trochisci de Eupatorio
D. Mesue.*

Rx. Tereniabin [*id est, Manne*]

Succi Eupatorii ana \mathfrak{z} j.

* Rosarum \mathfrak{z} β . Spodii \mathfrak{z} iij. β .

Spicæ Nardi Indicæ \mathfrak{z} iij.

Rhabarbari Afari

Anisi ana \mathfrak{z} ij. β .

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in vmbra libera ventoq; perflata exiccati reponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIVM Mesue, intelligendum est *Gratiola*.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

Tro-

Trochisci Diani, seu potius, Diaion, A
D. Nicolai.

℞. Florum Violarum viridium ʒ v.

Amyli ʒ iiij.

Seminis Papaveris albi ʒ ij. ʒ j.

Rhabarbari ʒ j. ʒ ij.

Seminis Plantaginis ʒ j. *

Balsami [loco eius Oleū Garyophyllorū] ʒ j.

Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliās vocantur
hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS, hoc loco oportet intelli- B
gere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri
Citrini, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, Aqua Ro-
sarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diani.] Horum Troch. duas descri- A
ptiones in idem recidentes, alterius pondere
tantum triplicato, mendoq; in Rhabarbari pon-
dere sublato, temerè Cordus posuerat. Mancè
enim ibidem ʒ j. quod & Fuchsius ritè ani-
maduerat, positus erat, cum ʒ j. ʒ ij. ut
restitui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B
Fuchsius docet: non enim Dialencoion, hoc
est, ex Violis albis, quas Cheyri vocamus, sed
Dia-

Diaion, hoc est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes hic intelligenda veniunt.

EXCALFACTIONES mitigant, alvumque emolliunt.

Trochisci de Lacca, D. Mesue.

℞. Laccæ mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Abſinthii

Berberis

Succi Eupatorii [*id est, Gratiolæ*]

Rhabarbari

Aristolochiæ longæ

Costi

Aſari

Amygdalorum amarorum

Rubæ Tinctorum

Aniſi

Apii

Schœnanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere cum aqua Eupatorii.

Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.

Trochisci de Lacca valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas movent.

Trochisci Diarhodon D. Nicolai.

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.

Spodii [*id est, Eboris combusti*] ʒ ij.

San-

TROCHISCI.

265

Santali rubri 3 j. β. ḡ vij.

Santali albi 3 j. ḡ xij.

Croci 3 ij. ḡ viij.

Camphoræ ḡ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rhabarbaro

D. Mesuæ.

R. Raved boni [id est, Rhabarbari] 3 x.

Succi Eupatorii [id est, Gratiolæ] 3 iiij.

Rosarum 3 iiij.

Spicæ Nardi Indicæ Anisi

Rubiæ tinctorum Seminis Apii

Absinthii Asari ana 3 j.

Amygdalarum amararum 3 iiij.

Formentur Trochisci autem unius pondere, cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis D. Mesuæ.

R. Berberis 3 ij.

Spodii Xyloaloës

Seminis Acetosæ Mastiches

M Galliæ

Gallię Moschatę verę

* Spicę Nardi Indicę ana ʒ j.

Rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iiij.

Aquę Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxycanthę valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

*Trochisci Gallię Moschatę,
D. Mesuę.*

R. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambre ʒ iiij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthę cum aqua Rosarum factę quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corque roborant : vomitum & alui profluuium sistunt : oris atque adeo corporis totius odorem commendant.

*Trochisci Aliptę Moschatę,
D. Nicolai.*

* R. Ladani purissimi ʒ iiij.

Styracis Calamitę ʒ j. β.

Styracis rubrę ʒ j.

Ligni Aloës ʒ ij. Ambre ʒ j.

Camphorę ʒ j. Moschi ʒ β.

Aquę

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymia-
ma, aridum illum & nigrum corticem; sed
resinam Syracis; quæ subrufa aut flava est,
id est, optima Syrax.

VALENT pueris patientibus asthma
& constrictionem pectoris, & etiam non
valentibus lac retinere. Fit inde optimum
fumigium & odoriferum: & assumuntur
etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue,
cap. de Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in
calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phleg-
ma crassum cum cholera mistum. Et præ-
cipuè educunt ex pectore crassos humores,
putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue,
cap. de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Vini infusionis Zingiberis q. s.

Formentur Trochisci.

M. 2

Tro-

Trochisci de Charabe, D. Mesua.

R. Charabis aureos vj.
Cornu cerui vsti
Gummi Arabici affati
Corallii rubri vsti Tragacanthæ
Acaciæ Hypocistidis
Balaustiorum florum
Mastiches Laccæ
Papaueris nigri affati ana aureos ij.
Turis Croci
Opii ana aureum j. β.
Mucilaginis Psyllii quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe, siue ex Succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vndecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha, D. Rhasis.

℞. Myrrhæ ʒ iiij.
Lupinorum ʒ v.
Foliorum Rutæ Menthaſtri
Pulegii ceruini Cymini
Rubiæ tinctorum Aſſæ foetidæ
Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.
Succi

TROCHISCI.

269

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRUM est siluestris Men-
tha, pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIVM Cerninum, id est, Dicta-
mnus Creticus.

PROVOCANT menstrua; & sedant
passiones, quæ ex retentione menstru-
rum proueniunt.

Trochisci de Alkekengi, D. Mesuæ.

℞. Fructuum Alkekengi ʒ iiij.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iiij. β.

Boli Armeniaci

Gummi Arabici

Turis

Sanguinis Draconis

Papaueris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Amyli

Pinearum ana ʒ vi.

Seminis Apii

Charabis

Boli [aut eius loco Terra sigillata]

Hyoscyami

Opii ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio

ALBATECHA, siue Batega, est Melon
magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-
M 3 cabi

cabi valent ad renum & vesicæ vlcera, &
natam inde dysuriam.

Trochisci de Rosis, D. Rhæsis.

- * R. Rosarum 3 iiij.
- * Ligni Aloës
- * Spicæ Nardi Indicæ Mastiches
- Cassia lignæ [aut succedanei eius]
- Florum Squinanthi Cinnamomi
- Absinthii ana 3 j.
- Vini veteris quantum ad formandum Tro-
- chiscos satis fuerit,

Sunt efficaces ad multos affectus, præ-
sertim ad ventriculi dolorem, malam co-
ctionem, febres antiquas, hydropem in-
cipientem, & illos maximè quibus for-
ma corrumpitur.

Trochisci de Camphora, Mesuæ.

- R. Rosarum 3 iiij.
- Spodii Glycyrrhizæ ana 3 ij.
- Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
- Seminis Cucumeris
- Seminis Melonis
- Tragacanthæ Croci
- Gummi Arabici
- Spicæ Nardi Indicæ ana 3 j.
- Santali citrini 3 ij. β.
- Ligni Aloës Cardamomi Amyli
- Cam.

TROCHISCI.

271

Camphoræ ana ʒ ij.
 Sacchari Tabarzeth
 Tereniabin [*id est, Manna*] ana ʒ iij.
 Mucilaginis Psyllii cum Aqua Rosacea fa-
 ctæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt
 ad febres ardentes, bilis & sanguinis
 feruorem, ventriculi & hepatis intem-
 periem calidam, & ab his sitim inexplē-
 tam: icterum quoque ac phthisim & he-
 cticam curant.

*Trochisci de terra sigillata,
 D. Mesuæ.*

℞. Sanguinis Draconis
 Gummi Arabici assati
 Trochiscorum Ramich
 Rosarum rubrarum Seminis Rosarum
 Amyli assati Spodii Acacię
 Lapidis Hamatitidis Hypocistidis
 Florum Balaustiorum Boli Armeniaci
 Terræ sigillatę [*vel Boli Armeni*]
 Corallii rubri Charabis ana ʒ ij.
 Margaritarum Tragacanthæ
 Papaueris nigri ana ʒ j. β.
 Seminis Portulacæ assati
 Cornu ceruini vsti Turis
 Gallarum Cypressi
 Croci ana ʒ ij.

M 4

Aquæ

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ʒ ij.

SPODII.] Pro Spodio sume Ebur combustum preparatum.

SEMEM Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exsiccati rubescunt.

GALLÆ Cypressi, etiam vocantur Nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolute scriptas habent.

SUNT admodum efficaces ad spurum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti; ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti; ad menses immodicos, vtero iniecti vel pubi illiti; ad mictum sanguinis, in vesicam iniecti, & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio, Mesue.

R. Rosarum rubearum ʒ xij.

Spodii ʒ x. Seminis acetosæ ʒ vj.

* Seminis Portulacæ

Coriandri præparati & tosti

Pulpæ Sumach ana ʒ ij. β.

* Amyli affi Florum Balauustiorum

Baccarum Berberis ana ʒ ij.

Gummi Arabici affati ʒ j.

Agre-

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui
fluore: inflammationem ventriculi & he-
patis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio, D. Mesuæ.

R. Rosarum Absinthii

Anisi ana ʒ ii.

Raued [*id est, Rhabarbari*]

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*]

Asari Seminis Apii

Amygdalorum amarorum

Spicæ Nardi Indicæ Mastiches

Folii ana ʒ j.

Succi Endiuixæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut
radicum Spica Romana & Macis ana partes
æquales.*

OBSTRUCTIONES ventriculi & he-
patis, & ab his dolorem, & febres anti-
quas tollunt: dictas partes reliquasque
nutritorias roborant; ac appetentiam ex-
citant.

Trochisci Albandal, D. Mesuæ.

R. Pulpæ Colocynthis ʒ x.

Incidentur minutissimè, & fricentur
cum Olei Rosacei ʒ j.

M ʒ

Deinde

Deinde fume Tragacanthæ
Gummi Arabici Bdellii ana ʒ vj.

Macerentur hæc in Aqua Rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formantur ex prædicta Colocynthide Trochisci: qui siccentur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissimè; & rursus formantur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & Compositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos: suntq; salubriores quàm ipsa Colocynthidis.

P. C. SCHOL.

ʒ x.] Cordum hîc falli Bernardus Desse-
nius in suis illis verbosis Commentariis, mi-
serè exclamat, eò quòd ʒ x. pro ʒ x. ut ipse
inquit, hîc posuerit: cum ipsemet hac in re
(ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto
erret caelo. Verùm in alio Dispensariolo Sexa-
tus sui iussu emisso, dextrè respuit, à suis
collegis forsân monitus. Proinde quid Fuchsius,
artis nostræ (ut & plurimis aliis locis liquet)
nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc lo-
co suis annotationibus imaginando deliret,
nescio. Mihi breuitati studendum est.

Trochisci Bechii albi.

R. Sacchari albißimi ℥ j.
Sacchari Candi optimi.

Sac-

TROCHISCI.

275

Sacchari Penidii ana ℥ iiij.

Ireos ℥ j. ℥ vij.

Amyli ℥ ij. ℥.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum
Aqua Rosacea factæ quantum suf-
ficat.

Formentur Trochisci parui, & signen-
tur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & dif-
culty spirantibus.

Trochisci Bechii nigri.

℞. Succu Glycyrrhiæ ℥ iiij.

Syracis Calamitæ ℥ j. ℥.

Sacchari Candi ℥ ij. ℥.

Specierum Diaireos Salomonis

Specierum Lohoch sani ana ℥.

Sacchari Penidii ℥.

Sacchari albissimi ℥ ij. ℥ iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyss-
sopi factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam resar-
ciunt: & prosunt his qui patiuntur tussina
calidam & siccam: leniunt pectus, & fa-
cilitant sputum.

M 6

TRO

TROCHISCORVM DVÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptiones nuper his ultimis
editionibus accesserunt.**Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Lacca electæ ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iiij aquæ cælestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis : In colatura deinde coquito rad. Rubiæ tinctorum ℥ iiij. donec remaneat ℥ j β. Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas ℥ iiij Lacca; & ad ignem coquito, donec Lacca dissolvatur. Postea colato & exprimito, & abiice superfluitates Lacca. Colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito; & insperge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ

Radiciſ concauæ

Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Afari radicum

Curcumæ Cinnamomi Ligni Aloës

Nucis moschatæ Schoenanthi ana ℥ j.

Samphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optimè, & formen-
tur Trochisci drachmæ vnius pondere.

R A-

RADIX *concaua*, *Holuvurtz*, qua falso
appellatur *Aristolochia rotunda*.

Hos Trochiscos composui aliquibus
obstructione splenis hepatisque laboran-
tibus; & præsentis auxilio id malum cura-
verunt.

Trochisci de Succino, Valerii Cordi.

℞. Ambrae excellentissimæ
Succini albissimi ana ʒ j.
Succini Phalerni
Succini cerei ana ʒ iiij.
Succini nigri Camphoræ
Margaritarum non perforatarum
Margaritarum perforatarum ana ʒ ij.
Onychis Dentaliorum
Entaliorum Umbilici marini
Lapidum cancrorum
Synodontum Ligni Aloës
Cinnamomi
c hœnanthi Nucis moschatæ
Cubebæ
Cardamomi Croci
Cyperi rotundi
Zedoariæ Doronici ana ʒ j.

Conterantur omnia minutissime, &
conficiantur Trochisci cum mucilagine
Tragacanthæ albissimæ in aqua Maioranę
dissolutæ.

AMBRA est Succinum Orientale.

M 7

S v c

SUCCINUM est quod Arabibus vocatur *Carabe*, Germanis *Agstein* sive *Bernstein*: *Sudanum*, Gentor: *Gallis*, *Ambre*. Est enim *Succinum* nihil aliud quam *Ambra Germanica*.

Phalernum, id est, flauum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod cera colorem habet, non adeo pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur *Gagates lapis*, Germanicè *Suvarizer Agstein*, oder *Suvarizer Bernstein*.

Inter emendum album *Succinum*, vitare oportet scobem & ramenta: nam hac solent pro albo *Carabe* vendi. Cum enim *Cereum* aut *Phalernum Succinum* tornatur, candida ramenta remittit. Ideoque integras glebas candidi *Succini* emere oportet. Est enim valde pretiosum.

Onychis, id est, *Blatta Byzantie*.

Umbilici marini, Germanicè *Meerbonen*.

Lapidum Cancrorum, id est, quos vocant *Oculos cancrorum*.

Synodontes lapides sunt in capite *Synodontis* piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis accipiantur lapilli qui bini inueniuntur in capitibus piscium fluuiatilium, quos *Raulpersken* Germanicè vocant.

Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillita.

cillitatem cordis, ad paralyſim, ſi dentur in aquis appropriatis, cum Betonicae floribus, aut Lauendulae, aut Tiliae: & ad ſuffocationes & ſtrangulationes vteri valent.

OLEA.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foueam ponatur: ſupra id aliud fictile anguſti orificii inuerſum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimque incifis plenum: cui ſubducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt deſtillet liquor, & ne ligni ſegmenta delabantur. Bene autem aptentur, & luto ſapientiae circumlinantur fictilium orificia, ne quidquam expiret. Poſtea inferius fictile uſque ad collum ſuperioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa & ſupra fictile ſuperius accendito; atque ardere finito aliquot horas. Poſtremo liquorem qui deſtillauit, auferro. Cuius uſus eſt purgandis ſordidis vlceribus.

EMENDAT cutis infectiones, ſerpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quae in tibiis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

Oleum.

Oleum ex Iuniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicetur per artem distillandi, ut Vinum sublimatum. Quia verò minoris emittitur quàm ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius non indicabimus.

*Oleum Nardinum simplex,
D. Mesua.*

℞. Spicæ Nardi aromaticæ ℥ iiij.
Vini Aquæ ana ℥ ij. β.
Olei Sesamini ℥ j. β.

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde Oleum; & colatum reponatur, abiecta Nardi Spica.

VAS duplex, Gracè vocatur **DIPLOMA**: constat duobus crateribus, altero alteri imposito, ita ut in unum aromata & oleum coniciantur; in alterum verò aqua fundatur, qua subiectis prunis calefacta suo tepore unguenta & olea decoquit. Est autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis qua decoquuntur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri magno-

magnoperè iuuat: naribus iniectum, caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

*Oleum Nardinum compositum,
D. Mesuæ.*

R. Spicę Indię ℥ iij.

Sampfuchi [*id est, Maiorana*] ℥ ij.

Xyloaloës Enulę Folii Indi

Calami aromatici [*eius loco sumatur Galāga*]

Foliorum Lauri

Cyperi Schœnanthi

Cordumeni ana ℥ j. β.

Contundantur omnia grosso modo:
deinde affunde illis

Aquæ fontanę

Vini ana quantū sufficit, i. circiter ℥ xiiij.

Olei Sefamini ℥ vj.

Macerentur per noctem: deinde coquantur in Diplomate, id est, duplici vase, secundum artem.

P R O Folio Indo, recipe Spica Romana
radicum, Macis ana ℥ vj. [*non ℥ vj.*]

Oleum Costinum, D. Mesuæ.

R. Costi amari [*optimi & veri*] ℥ ij.

Casix [*aut succedanei eius*] ℥ j.

Summitatum Sampfuchi ℥ ij.

Vini quantum sufficit

Olei

* Olei Sefamini ℞ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomo similis accipi debet.*

CALEFACIT, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos. Canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus, D. Mesua.

℞. Macropiperis [*id est, longi*]

Melanopiperis [*id est, nigri*]

A Leucopiperis [*id est, albi*] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorū Myrob. Emblicorum

Myrobal. Indorum ana ʒ v.

Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniacy ana ʒ ij. β.

C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutę viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquę quantitate sufficienti ad tertias. Colaturę adde olei de Cherua ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem aquę.

P. C.

P. C. SCHOL.

Ana ʒ iij.] *Cordus malè ʒ iij. hic ha-* A
bebat.

Ammoniacy.] *Hyoscyami fœdè in Cordo B*
legebatur.

ʒ ij.] ʒ xij. *vitiosè Cordus scripserat, ut C*
hac omnia ritè à Fuchsio quoque dicuntur:
quamquam à Monachis hausta esse non dubi-
tem.

I V V A T morbos neruorum frigidos, vt
 paralyfin, spasmus, spasmus cynicum,
 tremorem, epilepsiam: adhæc ischiadem,
 & cæteras arthritidis differentias, & vteri,
 coli, renum, vesicæ affectus frigidos, quia
 calefacit, tenuat, terget: ob id obstru-
 ctiones aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragora, D. Nicolai.

R. Olci P v.

Succi malorum Mandragoræ ʒ viij.

Succi capitum Papaueris hortensis ʒ vj.

Succi Hyoscyami albi ʒ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ʒ ij.

Opii Styracis ana ʒ j.

Confice sic: misce simul omnes succos,
 oleo; atque in vitreo vase, obstructo orifi-
 cio, Soli exponito per decem dies. Vnde-
 cimo die coquantur in duplici vase vsque
 ad con-

ad consumptionem succorum : deinde ubi refrigerari cœperit, cola : & colato oleo adde Styracem & Opium ; & confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facile in oleo dissolvitur :

OPIVM verò sincerum in oleo dissolui non potest. Igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, & sæpè misceatur : nam nisi in aqua aut vino dissolvatur, non commiscebitur oleo.

Non habentur apud nos Mandragora pomina : ergo loco succi Mandragora pomorum accipe infra scriptam decoctionem :

℞. radicem Mandragora, id est, Corticum radicem eius ℥ j. Contundantur, & coquantur in aqua sufficiente ; & colatum decoctum succis adde.

AD nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur : pulsibus brachiorum & plantis pedū illitum, quocumque modo vigiliis fatigatū celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Mastichinum, D. Mesuæ.

℞. Olei Rosacei ℥ xij.

Vini odoriferi ℥ iiij.

Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

CERE.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores du-
ros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio D. Mesue.

R. Euphorbii ʒ β.

Olei Cheyrini ʒ v.

Vini odoriferi tantundem. Coque secun-
dum artem usque ad consumptionem vini.

Iuvat maximè frigidus cerebri &
neruorum affectus, cephalalgiam, hemi-
craniam, lethargum, naribus immis-
sum. Articulorum quoque & hepatis, & splenis
dolores, illitum lenit.

*Oleum Castorei, D. Iacobi
de Manliis.*

R. Castorei Styracis calamitæ

Galbani Euphorbii

Cassia lignea veræ Croci

Opopanacis

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Spicæ Nardi Indicæ

Costi ana ʒ iiij.

Cyperi Schœnanthi Macropiperis

Melanopiperis Sabinæ

Pyrethri ana ʒ ij. β.

Olei P iiij.

Vini odoriferi P ij.

Con-

Confice sic : Galbanum & Opopanacem in vino seorsim dissolue : deinde reliqua omnia contusa cum oleo & vino coquito ad consumptionem vini in duplici vase. Postea cola, & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanace oleo adfunde : & iterum coque ad consumptionem vini : & repone, sapius miscens in posterum, ut Galbanum & Opopanax in vasis fundo subsidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes aggritudines frigidas, praesertim nervorum & iuncturaru: medetur paralyfi, spasmo, tetano ; & sedat acerrimos rigores, & flogora febrium, si spina dorsi linatur.

*Oleum Scorpionum simplex,
D. Mesua.*

- * R. Scorpiones numero xx. vel xxx. secundum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum P ij.

- * Macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies xxx caniculares ad solem, vel pluribus diebus : postea colatum ad usus reponere.

LAPIDEM renum & vesicae frangit & expellit, lumbis, pubi, peritoneo illitum, aut per meatum urinarium injectum.

Oleum

*Oleum Scorpionum compositum,
D. Mesue.*

R. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ Cyperi

Corticum radicum Capparis ana \mathfrak{z} j.

Olei Amygdalorum amarorum \mathfrak{p} j. β .

Macerentur in oleo contusæ radices ad
Solem feruidum diebus viginti : deinde
coquantur aliquantulum in duplici vase,
iniectis ad ultimum Scorpionibus num.
xv. postea iterum serenis diebus xxx ad
Solem macerentur. Postremo excolatum
oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est
Holuvart ζ , sed radix lutei coloris, odore &
sapore Aristolochis longæ. Affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum, Nicolai.

R. Formicarum alatarum quantum vis
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl.
postea excolatum oleum repone.

VALET ad confortandum coitum,
vnguendo partes destinatas genera-
tioni.

Oleum

Oleum Lumbricorum terrestrium.

Rx. Vermium terræ P β.

Olei oliuarum P ij. Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum:
deinde percoletur & referuetur.

NERVOS in frigidatos confortat; &
utile est doloribus iuncturarum.

Oleum Vulpinum, D. Mesuæ.

Rx. Vulpem, detracta pelle, & abiectis in-
teraneis: incidatur in partes, & coqua-
tur in Aquæ fontanæ &

Aquæ marinæ ana P ij. ℥ iiij.

Olei veteris clari P ij. ℥ ix.

Salis ℥ iiij. Inter coquendum adiace

Anethi Thymi ana P j.

Coquantur autem quousque ab ossibus
recedat caro, & aqua consumatur: deinde
coletur oleum, & excolatum ad vsus suos
referuetur.

Qui prope mare non habitant, sumant aquam
salsam, id est, Muriam; siue aquam fontium
salforum, ubi salina fuerint. Porro ad coquen-
dam Vulpem non sufficit aquarum prescripta-
rum quantitas: ideo accipe quantum abundè
satis fuerit, & fortiter ultimè oleum expri-
me.

Ad podagras, reliquasque arthritidis
spe-

species, ac dorsi, renumque dolorem est
efficacissimum.

Oleum de Cappare.

℞. Corticis radicis Capparis ʒ j.

Corticis Tamarisci

Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ [id est, Asplenii]

Cyperis ana ʒ ij.

Rutæ ʒ j. Aceti

Vini optimi ana ʒ ij.

Olei maturi ℥ j.

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolori splenis, ac omni eius agitudine.

Oleum de Lateribus, D. Mesuæ.

℞. Laterem aut regulam rufam antiquissimam, ex rufo luto ductam: eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excanduerint: deinde è prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousque se oleo impleuerint: postea oleo exempta in tenuissimum pulverem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & secundum
N artem

artem luto chymistico iuncturas vitreorum claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito; & elicitedum reponito.

CONVENIT omnibus morbis frigidis. Est enim calidum, penetratiuum, resolutiuum: mollit dura, & discutit tumores. Opitulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, obliuionem, paralyfin, spasmus, dolorem dorsi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & nervorum morbos: medetur spleni, vesicæ renibus.

Oleum Terebinthinae.

℞. Resinae Terebinthinae aut Lariceae quam in Germania Terebinthinam vocamus, ℞ iij.

Eam pone in capace Retortam, super Cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita ut Cucurbita aut Retorta arenae imponatur. Primum autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, ultimò fuscum & crassum. Horum vnumquodque per se auferto, & reponito.

CONFERT omnibus ægitudinibus frigidis, & maximè nervorum.

Oleum Tartari, seu Vini Facum exsiccatarum.

℞. Tartari puri ℞ iij.

Pom

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus aut regulis aut fictilibus, vel per se, donec omninò excandescat Tartarum. Postea impone in sacculum laneo panno factum, & suspende in cellario: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor; quem repone. Porro reverà hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

V A L E T ad faciem tergendam, & erugandam.

Oleum Cydoniorum, D. Mesua.

℞. Cydoniorum non excorticatorum
Succi Cydoniorum ana quantum sufficit.

Incidito Cydonia; & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est, immaturum, ut excedat eius quantitas succi mensuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abiice posthac Cydonia, & adde recentia: & rursus macera & coque: inde etiam tertio recentia Cydonia impone; & prædicto modo omnia perage. Tum repone diligenter obstruam, ne expiret.

Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo ut maiorem diligentiam impendant.

Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum: sistit sudorem: restaurat resolutionem, lapsas vires: corroborat nervos & vires: confortat digestiuam.

Oleum Sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiij.
 Serpylli m. ij.
 Foliorum Myrti m. j.
 Abrotoni Sisymbrii ana m. β.
 Casia lignæ veræ ℥ ij.
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone; ac infunde oleum, ut supra species emineat. Tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea exprime, & expressum oleum infunde recentibus speciebus: & hoc etiam tertio facito.

Folia vera Myrti accipi debent, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.

SISYMBRIUM, id est, Mentha aquatica. Est & aliud Sisymbrium in montibus nascens, multò odoratius: quod melius esset, si ubique haberi posset.

OMPHACINUM, id est, ex immaturis oliuis expressum.

LASSITUDINI utile est; & morbis cerebri & nervorum prodest: ob id in balneo

balneo inunctum, paralyfim iuuat, & spaf-
mum cynicum, vulgò torturam oris, na-
ribus iniectum: & auribus immiffum, à
flatu tinnitum diffipat: menses ciet: ac
morfui fcorpionis prodeft.

Oleum Vitellorum oncorum.

℞. Oua recentia numero centum; coquito
donec penitus indurentur. poftea vi-
tellos eorum exime, & comminutos *
affa in fartagine, mouendo donec rufe-
fcant, & pinguedinem quandam remit-
tant: deinde offam feruentem iniice in
facculam pilis contextum, & exprime:
quodque expreffum fuerit oleum, re-
pone.

E X P E R I E N T I A plurima probatum
eft, cutim expurgare: impetiginem, ferpi-
ginem, & alia cutis vitia perfanare: ca-
pillos regnere: & vlcera maligna & fi-
ftulofa curare.

Oleum Hyperici, Iacobi de Manliis. *

℞. Summitatum Hyperici iamiam matu-
refcentis ʒ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus iij.
Bulliant deinde in vafe duplici, obthura-
to orificio vafis. Poftea exprime; & re-
centis Hyperici par pondus iniice; & ite-

N 3 rum

rum macera, & coque, & exprime. Tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

* R. Terebinthinæ claræ ℥ iij.

Olei veteris clari ℥ vj. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini: postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

CALIDUM est & siccum, stypticum: ob id cōsolidat vulnera incisorum nervorum, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ: & prouocat vrinam.

Olenæ Irinuræ.

R. Olei ℥ vj. Vini ℥ j.

Lauetur oleum ter in aqua calida: deinde effusa aqua, adde vinum; & insperge Macis ℥ iij.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructio vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, vsque ad consumptionem vini dimidii. Postea exprime oleum; & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera, vt prius, diebus octo: deinde exprime oleum, & recentis Iridis confusæ par pondus iniicito: tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viij macerato, &

to, & rursum exprime. Postremò etiam
 tertio exprime, & aliam Iridem adde, &
 similiter omnia perage: deinde in dupli-
 civase oleum vnà cum vltimò inspersa Iri-
 de aliquamdiu coquito. Ad vltimum dein-
 de exprime, & repone oleum: cumque vi-
 deris subsidere ad fundum vasis Iridis
 puluerem, leuiter cola.

*Cum ita permutatur crebrò Iris, oleo singu-
 lis vicibus aliquid decedit: ideò boni ponderis
 ꝑ vj. olei accipiantur.*

ATTENVAT, resoluit, maturat, & di-
 gerit malos humores phlegmaticos pe-
 ctoris & pulmonis: faciliat sputum &
 anhelitum: sedat tussim & frigidos dolo-
 res hepatis, splenis, & maximè matricis:
 resoluit dura apostemata, & mollit duri-
 ties: & confert spasma, doloribus iun-
 cturarum, & foetori narium.

*Oleum Irinum, D. Nicolai
 Alexandrini.*

A

℞. Olei sextarios x.
 Aquæ sextarios iij.
 Radicum Iridis ꝑ iij. ꝑ iij.
 Crini domestici radicis ꝑ xv.
 Cyperi viridis radicem ꝑ vj.
 Helenii ꝑ iij. Anchusæ ꝑ ij.
 Cinnami Assæ Spicæ ana ꝑ j.
 Contundantur radices & aliæ species;
 N 4 & ma-

& macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit; deinde refrigerari finito. Ultimò exprimito; & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est qua habet olei uncias ponderales xvj. 3 v. 3 j.

CRINON domesticum, id est, Lilium odoratum album, quod in hortis plantatur.

Non ubiq; habentur radices Cyperi virides: idcirco aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campana, videlicet radicem eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant. Tinguntur ea radice unguenta, & cera.

B CINNAMUM, idem est quod Cinnamomum.

C ASSÆ] Ego hic non dulcem Assam, sed foetidam ponerem: licet tamen utriusque 3 β. accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cum Myrepsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, reuerè Fuchsius hanc erroneam dicit.

Cin-

Cinnamum.] *Cinnamomum* imò legendum: B
aliquantulum nempe differunt, ut alibi dixi-
mus.

Alia.] Num huius loco *Casia*, cum *Fuchſio*, C
legendum sit, videndum. Interea fallitur *Cor-*
dus, *Azam* hinc foetidam intelligendam pu-
tans.

VSVRPATUR ad diuturnum catar-
rhum, naribus illitum. Ozænas & putre-
dines narium aufert: tinnitum aurium,
cum aceto & ruta & amygdalis amaris
commistum, & auribus iniectum, tollit:
asthmaticis, gargarismo adhibito, opi-
tatur: hæmorrhoidas veteres inunctum,
siue colo iniectum, educit.

Oleum Moschelinum, D. Nicolai.

R. Olei puri P viij.

Aquæ P iij.

Folii [aut succedanei eius] A

Spicæ Nardi Indicæ

Costi [odorati & veri]

Mastiches ana ʒ iij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [in eius penuria corticis Cin- B
namomi]

Casiæ lignæ veræ ana ʒ j. β.

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Garyophyllorum Bdellii ana ʒ j.

N s Mo.

C Moschi 3 vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic : Folium, aut eius succedaneum, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum, & Bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera : postea coque supra lentum ignem in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ : deinde reliqua omnia in tenuissimum pulverem redacta insperge, excolato & expresso oleo, & iterum macera, & coque parumper : ultimò deinde Moschum admisce ; & repone, & pátete vt aromata subsident. Ea interdum oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum : apud quem non puri, sed Punici olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Folio sume radicularum Spica Romana, Macis ana 3 j. β.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

D Nux Indica híc non significat grandem illam nucem qua ubique Indica nux vocatur, sed nucem Moschatam. Nam veteres Græci eam appellant Caryon sine Carydion Indicon, id est, Nucem siue Nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrepsicon, id est, Nux unguentaria siue odorata : & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. Quod diligenter in hoc oleo notandum est.

P. C.

P. C. SCHOL.

Aquæ] Fuchsius vinum aque loco sumen. A
dum satis aptè dicit.

Xylocinnamomi] Nicolai Alexandrini B
exemplar Xylocinnamilegit.

Moschi 3 vj.] Nimia certè quantitate: C
quare forsàn 3 ij. legende erunt, ut pro duo-
bus ij. inferius in unum contractis, u scriptores
olim cecutientes legerint.

Nux Indica.] Nux Indicas hodie passim D
vocatas Fuchsius hoc loco intelligendus, non
Nux Moschatas vulgò appellatas, contendit:
eo quòd hæc veteribus Græcis cognitas non
fuisse constet. Verùm idipsum & de Goryophyl-
lis ac Moscho, hanc compositionem quoque in-
gredientibus, dici posset: quod non perpendit
Fuchsius. Posterioris etenim seculi composi-
tionem hanc esse, quod omnia hic commemorata
cognovit, est indubitatum.

E s t optimum ad omnem frigiditatem
corporis, potissimùm ventriculi, & ad
dolorem lateris, foris inunctum. Stran-
guriosis & colicis, & ad omne nervorum
vitium illitum optimè facit. Miscetur
epithematibus & emplastris quæ ad sto-
machi & renum affectiones adsciscuntur.

Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusæ quan-
tum

N 6

tum

tum libuerit, pone in vase vitreo; & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram; & macera ad solem, aut in loco calido aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice; macera quoque & cola.

Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.

E S T calidum, apertiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calefacit renes, vesicam, matricem; & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmò, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum Oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resoluit vapores & apostemata, tumores & durities: & mitigat dolores & rigores febrium: prouocat somnum & sudorem.

Oleum

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

VALET ad plura: aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert nervis & membris nervosis; & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDAT frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutivum: mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citiùs maturat apostemata.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, Weysshornungsblū, weyssaprillenblum, Weyss Iosepsstebe. Fit vt Rutaceum.

N 7

VA-

V A L E T ad emolliendas vuluæ duritias,
præclusionesque.

Oleum Ligustrinum, D. Mesuæ.

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprium, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri, florente vite, aut paulo post, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

Ligustrum est arbuscula salicis ferè folio floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucosis: Germanicè vocatur Reynweyden & Mustholtz. Nasceitur copiosè ad Rhenum, & in Misnia, Hestia, Suevia, Wittenbergensi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalekreut.

P A R T E S nervosas roborat, & capillos à canitie vindicat.

Oleum Sambucinum,

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

L E N I T, abstergit, & mundificat cutim: medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, oppilato: & plurimùm confert doloribus iuncturarum.

Oleum Iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iase.

Iaseminum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

Est Iasma flos similis Violis aut Cheyri, admodum odoratus: nascitur in frutice, qui multis viticulis ascendit pergulas & concamerationes, vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.

OPITVLATVR corporibus quæ calefactionem laxationemque desiderant.

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoiis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violem.

DOLORES neruorum aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ Myrti, & oleo omphacino, hoc est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum.

Myrtus vera apud nos non nascitur: neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos: vt plurimum enim ex Hispania & Italia afferuntur: ideo necesse est vt vino odorato aspergantur.

RE-

REFRIGERAT & adstringit: ideoq. cœliacis affectibus subuenit: sanat igne ambugta: pustulas erumpentes illitu emēdat: attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, luxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti, & oleo Omphacino, id est, immaturo: quemadmodum oleum Myrsillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, idè sumo folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur denuò, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut . . . m est proxime in oleo Myrsillorum.

CEREBRUM, nervos, cor & ventriculum roborat.

Oleum Menthae.

Oleum Menthae fit ex Mentha crispa sativa, & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

VENTRICULUM refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitum,

mitumque reprimat: appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

Oleum Absinthii.

Oleum Absinthii fit ex Absinthio Pontico, & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

Absinthium Ponticum nos non habemus, quod videlicet non adeò calidum est, sed suavioris odoris, & valdè adstringens. Nostrum verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est; & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scribit: idèò corrigendum est cum Rosis, quæ dimidiam eius pondus equent.

CALEFACIT, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimùm verò ventriculum: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum, fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis, & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

REFRIGERAT & astringit: inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit; erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

Oleum

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum [Martiarum,] & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.

NYMPHÆATVM oleum vires habet Violati: refrigerat tamen magis quam Violatum, & minus quam Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur; & Veneris tentiginem prohibet, genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo Vere ex oculis Populi arboris contusis, & oleo veteri clato, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum, D. Nicolai Alexandrini.

R. Olei ℥ lxxxvj. (faciunt ℥ vij. ℥ ij.)
Vini ℥ iij.

Gemmarum Populi arboris recentium,
Veris initio collectarum ℥ iij.

Gemmae Populi diutissime terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, & quotidie saepe agitentur. Octava deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum: & reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secundò & tertio recentes Populi gemmae addantur.

Gemma Populi, id est, oculi Populi.

EXPEDIT ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicumque dolor fit.

Oleum

Oleum Amygdalorum dulcium.

Rx. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida: contendantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ Rosaceæ modico: postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suave in cibis; & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma: sedat tussim & ardorem urinæ, vesicæ & vulvæ excoriatæ, cum fistula injectum.

Oleum Amygdalorum amarorum.

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

APERIT oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium: lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrsica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben. Fit autem ex
tuso

tuso affatoque, affusa Rosacea aqua, fructu isto.

Fructus hic ipse Auellana magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudis pinguem quendam nucleum, fungosa & alba tunica inuolutum. Afferitur ex Syria & Arabia.

OLEVM Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos: aluum soluit; sed ventriculo aduersatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *

Oleum de Cherna.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherna, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi, & Mira solis; à Germanis Wunderbaum, Zeckensame, & Heydnisch Sprinkorner.

PRODEST psoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus foedis, aurium doloribus:

bus: potu aluum ciet, si quis aquis grauat-
tur: lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E semine vtriusque Papaueris tam albi
quàm nigri exprimitur oleum, eodem
modo quo ex Amygdalis, Balano Myre-
pfica, & Cherua.

IMPINGVAT, asperam arteriam le-
nit; febrium ardorem mirigat, & inso-
mniam.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami
semine, eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ fit per destillationem, ex
maiori Lauendula, quæ Spica vocatur.

Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit,
quàm in Gallia Narbonensi: ideo potius emen-
dum est à mercatoribus, qui illud è Gallia af-
ferunt.

CALEFACIT, ac discutit.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facilè
fieri potest: quoniam verò in magna co-
pia

pia affertur ex Italia & aliunde, ideò facile
emittitur à Materialistis.

CALIDVM est & apertiuum : mitigat
colicam & frigidos dolores ventris, sto-
machi, capitis, hepatis, splenis, renum,
matricis, neruorum, iuncturarum : deni-
que omnibus ægitudinibus frigidis con-
fert.

Oleum Sesaminum.

OLEVM Sesaminum exprimitur è Se-
sami semine, eodem modo quo de sem.
Papaueris.

*Sesamum verum affertur ex Alexandria
Ægypti Venetias ; nunc ex Italia & Hispania:
unde ematur sincerum ; nam adulteratur oleo
Nucum & Papaueris ; sed odore & sapore faci-
le deprehenditur à peritis dolus.*

OLEVM Sesaminum impinguat, auget
sperma, lenit guttur & omnem asperita-
tem & duritiem : & clarificat vocem.

Petroleum Flammum.

PETROLEVM clarum, quoddam est
album, quoddam verò aurei coloris. De-
fluit autem ex petris in Italia & plerisque
aliis locis, vnde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur : essentiæ te-
nuitate in altum penetrat, digerit: proinde
mate-

materiam omnem excrementosam consumit: ob id epilepsiae, paralyfi, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, uteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrum, siue Naphtha nigra, crassius est quam flauum. Gignitur autem in agro Borchdorpiano & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est*, Naphtha.

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM

PRETIOSVM EVRICII CORDI,

qui Valerii pater fuit, huic libro ex

Valerii Cordi scriptis nuper

additum.

R². Iridis Illyricae

Zarnabi longi [*id est*, Zedoaria]

Zarnabi rotundi [*id est*, Zurrumbath]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana 3 iiij.

Garyophyllorum

Nucis moschatae Macis

Arceuthidum [*id est*, gran. Iuniperi]

Cassie Cinnamomi Santali citrini

Ben-

Benzoi ana ℥ ij.

Croc Afari

Maioranę Schœnanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyper longi &
rotundi ana ℥ j.

Camphoræ ʒ ij. Moschi ʒ j.

Hæc omnia trita macerentur in vino
Rhenano ter sublimato, diebus octo. Po-
steà diligentissimè distillantur in balneo.
Distillatæ deinde aquæ quæ primò exiue-
rit, cape ℥ vj. in quibus dissolue optimæ,
candidissimæ, electæque Myrrhæ ℥ ij.
sic tenuissima & præstantissima pars Myr-
rhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior verò
instar fecis subsidet, quæ nequaquam est
separanda aut excolanda: quoniam in fun-
do dimissa ipsum Opobalsamum aliquot
annis conseruabit incorruptum.

VNGVENTA.

*Vnguentum Agrippæ Regis,
D. Nicolai.*

℞. Radicum Bryoniæ P ij.

Radicum Cucumeris asinini P j.

Scillæ P β. Ireos ℥ iij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

O Ceræ

Ceræ albissimæ ℥ xv.

Olei albissimi ℥ iij.

Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo: deinde coquantur, postea exprimantur: & in colato oleo & expressio resoluatur in cera, & fiat vnguentum secundum artem.

Apud Nicolaum Alexandrinum invenitur idem vnguentum: sed impressi codices non habent radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.

Oportet omnes istas radices & tribulos esse recentes. quod si necessitas urgeat, & non sint ad manus recentes; tunc sume siccatas, & affunde vini optimi ℥ iij.

A TRIBULI aquatici sive marini, sunt Wassernusse: & ipsi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

A Tribuli aquatici.] Desseñnius verò contrà, non fructus, sed radices hîc intelligendas esse putat.

HYDROPICS, omnibusque corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinas movet: extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renum utile.

*Vnguentum Apostolorum,
D. Anicenne.*

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Ham-

Hammoniacy ana ʒ xiiij.
 Aristolochiæ longæ Turis masculi
 Bdellii ana ʒ vj.
 Myrrhæ Galbani ana ʒ iiij.
 Opopanacis Floris æris ana ʒ ij.
 Lithargyrii ʒ ix.
 Olei, si fuerit æstas l' ij.
 In hieme autem l' iiij.

Aceti quantum satis est ad Hammonia-
 cum, Galbanum, & Opopanacum dis-
 soluenda.

Confice secundum artem.

*FLOS Æris propriè significat grana qua-
 dam parua, quæ è partibus æris prosiliunt, cum
 refrigerantur affusa aqua panes aenei: hoc ta-
 men loco solet poni viride æris.*

Es r efficac contra vulnera & vlcera
 difficilia, & fistulas: consumit carnem
 mortuam, & consumptam restaurat; du-
 ram mollit: & plagas sanat.

Vnguentum Aregon, D. Nicolai.

R. Rosmarini Maioranæ
 Radicis Iari Serpylli Rutæ
 Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. β.
 Foliorum Lauri Saluiæ
 Sabinæ ana ʒ iiij.
 Pulicariæ maioris
 Pulicariæ minoris ana ʒ iiij.
 Radicum Bryoniæ ʒ iiij.
 O 2 Lau-

- * Laurcolæ ℥ iiij. β.
- * Nepetæ ℥ iiij.
- * Mastiches
- * Olibani ana ℥ j. β.
- * Pyrethri
- * Euphorbii ana ℥ j.
- Zingiberis
- * Piperis ana ℥ iiij. β.
- Adipis vrsini
- * Olei Laurini ana ℥ iiij.
- Olei moschellini ℥ β.
- Petrolei clari ℥ j.
- Butyri ℥ iiij.
- Olei communis ℥ v.

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem: deinde coquantur; additis, circa cocturæ medium, siccis reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, &

Ceræ ℥ j. ℥ iiij.

OLEVM debet esse purum & vetus. Porro auctores non ponunt certam mensuram olei: quidam iubent accipi ℥ v. vel quantum sufficit. Sed tantum herbarum & radicum pondus & quantitas, non potest bullire in ℥ v. olei: ideo accipe olei ℥ medicinales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras; & coque ad consumptionem aqua, & cola.

IARVS est vera Serpentaria: pro qua ponitur Aron recenter effossum.

PVLICARIA, id est, Conyza, Germanice

nicè vocatur Duruvurtz, & est similis Enula Campana in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor. Nascitur humidis locis, & exiccatis aquis, circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis Thymelæa, id est, planta in qua nascitur Coccum Gnidium. Eius loco sumer radices vel folia Cocci Gnidii.

OLEVUM Moschellinum suo loco descriptum est.

P. C. SCHOL.

Et affunde aquæ.] Cacutit Cordus in aqua A
unguentum coquens, cum in vino coquendum esse ratio dicat.

Caterum cum unguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item dolori colico, renum, articulorumque.

Vnguentum Martiatum,
D. Nicolai.

A

R. Cerae albæ ℥ ij.

Olei ℥ viij. [aut quantum sufficit.]

Rorismarini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutæ ℥ vi. [al. ℥ iij.]

Tamarisci [foliorum scilicet] ℥ vj.

O 3

Maio-

Maioranæ Sabinæ
 Balsamitæ Saluiæ
 Ocymi Polii [*videlicet veri*]
 Calaminthæ Artemisiæ Enulæ
 Betonicæ Brancæ vrsinæ Spargulæ
 Herbae venti Pimpinellæ Agtimoniæ
 Absinthii Herbae paralyfis
 Herbae sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci
 Herbae Crassulæ Millefolii
 Semperuiæ Chamædryos Centauræ
 Centumneruiæ Fragulæ Terrahit
 Quinquefolii ana ʒ iiij. β.
 Radicum Hibisci [*id est, Althææ*]
 Cymini Myrthæ ana ʒ iiij.
 Fœnugraci ʒ j. β.
 Butyri ʒ j. ʒ ij.
 Vrticæ Violarum
 Papaueris nigri
 Menthae Saracenicae Menthae crispæ
 Lapathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris siluæ Maturellæ
 Herbe moschatae
 Alleluija Lingua ceruinæ Crispulæ
 Camphoratae Styracis calamitæ
 Medullæ ceruinæ ana ʒ β.
 Adipis vrsini Adipis gallinacei
 Mastiches Turis ana ʒ j.
 Olei Nardini ʒ ij.
 Herbae omnes in Maio mense colligan-
 tur, & incisæ macerentur in vino odorife-
 ro per

ro per dies septem : octauo deinde die co-
quantur , donec ferè consumatur vinum :
postea cola : & colaturę expressę adde
oleum , & coque denuò donec consumatur
vinum : mox adde ceram & reliqua secun-
dum artem.

In hoc vnguento multa sunt herbarum no-
mina , quę apud probatos Auctores nusquam
inueniuntur : idcirco aliquis non facillè ea in-
terpretabitur.

NICOLAVS Præpositus loco Maiorana
habet Esbrium , alii autem habent utrumque.
Sed non constat quid sit Esbrium : alii enim
dicunt Maioranam esse , alii Saluiam : sed
utrumque ingreditur hoc vnguentum , tam
Maiorana quàm Salvia.

BALSAMITA , id est , Mentha aqua-
tica.

BRANCA vrsina vera , quę Romana co-
gnominatur , accipi debet , quę habet radices
longas , multas , glutinosas , sapore Tragacan-
thę. Et alio nomine vocatur Acanthus : quę
verò Germanicè vocatur Bernclauv , & ha-
bet Anethi umbellam , & semina odore &
sapore cuminum , nihil minus est quàm Branca
vrsina ; nam semper illam Romanam Brancam
vrsinam intelligunt auctores omnes. Est autem
urbana & hortensis herba Branca vrsina
vera.

SPARGULA , id est , Gallion : Germani- B
cè vocatur Ranriken & Sprengelblum. Her-

ba est denso, numerofo, cōferio & odorato flore.

C PIMPINELLA, quā Auctor intelligit, est Sanguisorba, quæ Germanicè Bluißdroflein vocatur.

HERBA Paralyfis, id est, Himelschuffel.

D HERBA Sanctæ Mariæ, secundum interpretationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crasula pinguis habet folia: nascitur in muris & intactis: Germanicè vocatur Fettebenne, siue Donnerkraut.

CENTVMNERVIA. i. Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica, quam dicant esse Orobum.

LUMINARIS maioris auctor Ioannes Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrtha habet Cimarium Myrti. Sed nescio quā bene: non tamen improbo. Porro Nicolai Alexandrini impressum exemplar habet Cymini & Myrtha: sed Nicolaus Præpositus pro Myrtha habet Myrrham; sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex speciebus Capilli Veneris.

MENTHA Saracenica, Germanicè vocatur Unser Frauvē Mintze. Herba habet folia oblonga, Laphio minora, & in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos, ferè ut Tanacetum: tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS, id est, herba Turcha: quam nos in Germania vocamus Carduum benedictum.

MA-

MATRISSILVA, id est Periclymenum: Germanicè vocatur Speklilien: ascendit arbores ut Vitis: flores habet longos, reflexos, & odore Lili. Nurembergæ in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in siluis.

MATVRELLA, id est, Phu; id est, Valeriana maior. Impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturellam, sed Marathrum, id est, Fœniculum: sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum: Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA quæ sit herba, non constat recentioribus: alii enim Bupthalmum, alii Herbam Cancris sic vocant, nec indicant figuram herbe Cancris: ego autem ponerem eius loco Bupthalmum, id est, Cotulam maiorem, non foetidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est Rostum Ciconia; altera est parua, & non habet acus, sed est herba admodum parua: folia habet similia Cöcaue radici, id est, Holvuriz: odorem habet in Maio mense Musci. Nascitur umbrosis locis iuxta Concauam radicem, id est Holvuriz. In Maio tantum reperitur. Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidam dicunt esse Abrotonum siluestre siue album; sed perinde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut codices impressi ostendunt. ideoq; & eius modum subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

ADVERSUS frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

*Unguentum Martiatum magnum,
D. Nicolai Alexandrini.*

R. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vj.
Pet. verò Cond. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxvj.
 Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.
 * Amaraci ℥ ij.
 Esbrii Sabinæ
 Balsamitæ Ocymi
 Elelisphaci [*id est, Salvia*]
 Polii [*scilicet veri*]
 Calaminthes Artemisæ Enulæ
 Betonice Brancæ vrsinæ
 Herbæ venti
 Pimpinellæ Argemoniæ Absinthii
 Herbæ paralyfis
 Herbæ Sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci Herbæ Crassulæ
 Semperuiæ Millefolii
 Chamædryos Centaureæ
 Centumneriæ Fragulæ

Quin.

Quinquefolii
 Herbe Terrahit ana l j. β.
 Radicis Euifci [*feu Ibisci*] Cymini
 Myrthæ ana p j.
 Fœnugræci p β. Butyri ℥ v. F
 Vrticæ Violarum
 Papaueris rubri
 Menthe alterius [*ideſt, Mētha criſpa ſatiua*]
 Lapathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris filuæ Marathri
 Herba mofchata
 Alleluia Lingua ceruinæ Criſpula
 Camphorata Styracis
 Medulla ceruinæ
 Adipis viſini
 Adipis gallinacei ana ℥ iii.
 Turis ℥ ij. Olei Nardini ℥ j.

Conſice hoc modo : Herbas omnes at-
 que radices in fine Maii menſis, vel circa
 Solſtitium æſtium collectas, minutim in-
 ciſas in vini ſufficienti quantitate mace-
 rato per dies ſeptem : octaua deinde die
 coquantur lento igne, donec propemo-
 dum vinum ſit conſumptum : poſtea cola
 & expreme, & affunde colaturæ expreſſæ
 olei prædictos ſextarios, & iterum coque,
 donec omnis aqueus herbarum ſuccus cum
 vino in vaporem reſolutus fuerit : deinde
 adde Ceram in partes confractam ; & pau-
 lo poſt Adipes, Butyrum atque oleum
 Nardinum ; ad vltimum verò Styracem, *
 O 6 atque

atque Tus in minutissimum puluerem trita : melius tamen esset, optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, vnâ cum Cera indere : nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax calamitarius rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento, quòd tam parum olei tot herbarum libris addatur : præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura euanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio, secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana, qua capit mensurales uncias viginti olei : pondere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem sextarii olei, faciunt in hoc vnguento ℞ viij, ℥ iiij.

ESBRIUM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Saluie : ego autem acciperem pro Esbrio Maiorana capitula, summitates & flores.

AMARACUM ego hîc non credo significare Matricariam, cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere : nam utraque Amaracus vocatur : si autem Maioranam inieceris, multò odoratiùs vnguentum fiet, quàm si Matricariam indideris.

HERBA venti, id est, Parietaria vera.

PIMPINELLA, hîc non significat Germanicam Pimpinellam acris radice, quam Itali vocant

vocant Saxifragiam; sed eam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutsstöffleyn. Radicem habet rubram, Tormentilla sapore. Nasclitur in pratis una eius species, altera in montibus; & Itali acetariis miscent: habetq; cucumeris odorem.

QVIDAM non habent Cyminum, sed Cimas Myrtha: est autem Myrtha idem quod Myrtus. Alii habent Myrrham, sed malè.

PRO Papauere rubeo habent alii Papauer nigrum: est autem rubrum Papauer idem quod agreste Papauer, in agris nascens.

MARATHRUM, id est, Fœniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse corruptum; & censeo pro Marathro legendum esse Maturellam, id est, Phu maius, cuius radices accipi debent.

Lingua ceruina est herba qua hodie improprie Scolopendria nominatur.

P. C. in vtrumque vng. Martiatum Schol.

Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè monet, non Martianum, sed Martiatum nominandum esse.

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam B non Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, C non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo hîc intelligendam esse vult; sed acrem herbam, Saxifragam à multis appellatam, Germanis Pimpinella nomine cognitam; idq; ea.

propter, quod adstrictoria sua facultate, huius medicamento Sanguisorbam malè conuenire existimet: quasi verò nihil unguentum hoc preterea recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo prius (imò forsan in ea fabricatum) quàm Germania unguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hinc intelligendam esse contendo.

D Herba Sanctę Marię.] Hanc Persicariam esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Fuchsius quoque inquit: sed eam esse quam Saluiam Romanam, & Mentham Grecam, seu Costum hortensem, ac Lassulatam Etruscis vocari censet, Unser frau vven Mint? Germanis dictam, à Mentha Saracenica diuersam. Qua in re falli nihilominus Fuchsiū existimo, Mentham hanc Grecam cum Saracenica confundentem, eandemque facientem, cum diuersa sint: nē Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Italis tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hinc quoque consulendi atque credendi sunt.

E Mentha Sarac.] Hanc Mentham Saraceniam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpiū libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonaus: que hoc loco intelligenda erit; quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

F Myrthę.] Fuchsius Myrrha legi mauult, nescio quam bene: cum unguentum Martiatum paruum

paruum Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliq̃ adstringentia admittat hoc vnguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterum hocce in vnguento, ut & multis aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Euchsio & Francisco Alex. est facilitatum: ita ut huius Apollo non vsque adeò, veluti Thraasonicè premitit, nebulosis suis radiis Pharmacopœos vibret, neque irradiet; quin in densa adhuc caligine aquè ut prius versentur atque deambulent. Quod tamen illi condonandum foret; eo quòd adolescentem se fateatur; nisi sue illius ætatis iuuenilis iudicio vacuus, & hinc temeraria rei Pharmaceutices sibi in experta, ac (ut locis mille liquet) ignorata scriptione, Apolline abusus, illiq̃ iniurius, tantum dixum plus equo contaminaffet. Sed hæc, quoniam vesperscit, citis si voles, quadrigis.

A d frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis, ac ilii dolorem; ad paralyticos, arthriticos, ischiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores; ad tumores, durities, spasmos, & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

Vnguen-

*Vnguentum Martiatum paruum,
D. Nicolai Alexandrini.*

- ℞. Foliorum Lauri ℥ iij.
 Rutæ ℥ ij. β.
 Amaraci [*id est, Maiorana*] ℥ ij.
 Rosmarini ℥ j. β.
 Foliorum Myrthæ ℥ j.
 Esbrii [*accipe summitates Maiorana pro Esbrii*]
 Balsamitæ
 Ocymi ana ℥ vj.
 Butyri ℥ v.
 Styracis Medullæ ceruinæ
 Adipis vrsini
 * Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.
 Mastiches ℥ iiij. Turis ℥ ij. β.
 * Olei Nardini ℥ j.
 * Olei oliuæ q. s.
 Cera mundissimæ quantum sufficit.
 Ego Olei acciperem ℥ vj.
 Cera verò ℥ iiij.
 Pet. verò Cond. olei ℥ xxiiij. sumendas esse
 dicit.

Porro hoc quoque vnguentum conficies
 ut proximum.

MYRTHA, *id est, Myrtus. sunt autem
 accipienda folia vera Myrti, quæ ex Italia
 afferuntur, & non eius planta quam voca-
 mus Germanicè Heydelber.*

P. C.

P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei, &c.] Si omnia huiusce Dispensatorii loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaq; restituenta mihi essent, simulq; singulorum rationes scriptis reddere deberem, in densum volumen, præter institutum, libellus omnimodò extumeret. Hic attamen (priusquam sese negotium subducatur; ad calcem enim ferè perductus sum) pedem figere, aliquidq; serii propalare, tempus & locus opportunus summopere urgere videntur: ut puta, si quid salis Francisco Alex. inesset, atque vel minimum haberet rerum medicamentarum pharmaceuticarumve peritiæ, experientiæq; (ut omnibus numeris absolutum opus se promulgasse arroganter sibi persuadet) non ita leuiter oscitanterq; aliorum errores incogitantiaq; etiam euidentissimas transcriberet, & alioquin pagellas multas tadiofa, atque inani dicacitate repleret, conspargaretq;. Consultat ille, queso, vulgares tantùm vniuersalesq; componendorum miscendorumq; medicamentorum normas, tum à seipso etiam conscriptas formulas; vel si volet, etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet; herbarum materialiumve libra, num olei binas ad minus requiras. Carnis libris duabus aque libram coctura sufficere si dixeris, à cocì puero nonne etiam rideberis? Itaque cum Cordus hæc in unguento suo ex sensu, olei hæc libras sex tantum,

tum, ad herbarum materialiumve libras plures duodecim (qua quantitate vix madescerent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum esse in contextu sonant verba: ego verò multas addens olei libras, ex sex vigintiquatuor effeci, necdum sufficere pro tanta materia copia scio, si oleo, ut regula & ratio docent, materia sunt contegenda. Simili insuper cecitate, ut in hoc unguento, omnes Dispensatoriorum combinatores visi sunt, in unguento Mariato magno. Vbi enim Nicolai Alex. aliorumque exemplaria, olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta sex multo pinguius, necessario reposui; rationes, errorumque causas hinc prateriens. Bone Deus, tot tantosque Aristarchos mirum est tanta laborare coryza, ut tantum interval- lum, nempe à sex ad sexaginta sex; à sex insuper ad vigintiquatuor, non olfecerint; adeoque evidentes res animadvertisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis neglectum fuerit, colligere facile queas: quod asterisci, prater omnium scio expectationem, ita frequentes, locorum non omnium, sed precipuorum tantum, in hocce tam exiguo enchiridio animadversorum indicatui demonstrare possunt. Quocirca, ut ingenuè quid sentiam tandem proferam, relique summam semel explicem; tot inter hodie Dispensatoriorum divulgatores, nullum panè digni quid Pharmacopœis cōsarcinasse protulisseque video; nihilque ferè prater aliorum ignavias transcripisse, ac in suas chartas transfudisse, acta egisse;

egisse ; errata , & ineptias , erratis atque ineptis accumulasse comperio : ita ut posteriora prioribus etiam nonnunquam deteriora , Pharmacopæis que inutiliora , esse conspiciantur. Eiuscemodi igitur omphacini rabulismi valeāt. Sed pedem retrahere , receptūque canere tempestivè , satius est , priusquam malè audiens , vilis ineptusque apothecarius , sordidusque immò olidus unguentarius , à medico quopiam Dispensatorii corrasore appeller , nulla ratione cum seplasiario conferendo ; à quo corripere reprehendere posse , equitas vetitat , piaculumque putatur. Silere itaque volo , ne in Lacca labyrinthum aliquem incautus incidens , illudere quempiam existimer. Verùm gallus in suo flerquilinio audet.

Caterum hic obiter etiam referre volo , unguentum Aregon olei quoque magna tabescere penuria.

Ad podagram frigidam , siue calidam , paralyticos , arthriticos , nephriticos , ischiadicos , & ad omnia vitia & dolores nervorum valet.

Unguentum album.

℞. Cerussæ in aqua Rosarum lotæ ℥ xvij.

Lithargyri albi loti ℥ j. β.

Olei Rosati ℞ ij. ℥ iiij.

Ceræ albiissimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Qui-

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum: nam alii addunt albumina Ovi, alii non addunt Lithargyrium: alii non Ceram, sed Tragacanthum admiscunt.

POLLET aduersus vlcera, scabiem, & adustionem, intertrigines, & inflammationem.

*Vnguentum Dialthææ simplex,
D. Nicolai.*

℞. Radicum Althææ P ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana P j.

Olei P iiij. Cere P j.

Terebinthinæ ℥ ij. Resinæ ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ P viij, aut quantum sufficit: quarta die coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem: eam deinde exprime: mox

℞. Expressæ mucilaginis P ij. & coque cum oleo: cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

EMOLLIENTI vim habet: calefacit, & humectat.

*Vnguentum Dialthææ compositum
D. Nicolai.*

℞. Radicis Althææ P ij.

Semi-

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Scillæ recentis ℥ vj.

Olei ℥ iiij.

Ceræ ℥ j.

Terebinthinæ

Gummi Hederæ

Galbani ana ℥ ij.

Colophonix

Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur
tribus diebus in ℥ viij. aut sufficienti
quantitate aquæ : deinde coquantur do-
nec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reli-
qua : ac fiat secundum artem vnguen-
tum.

VALET propriè ad dolorem pectoris ex
frigidity & pleuresi : & super pectus
inunctum sanat omnia loca : in frigidata
calefacit : molliciat & humectat.

Vnguentum Egyptiacum
D. Mesuæ.

℞. Æruginis ℥ v.

Mellis optimi ℥ xiiij.

Aceti fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vn-
guentum spissum, & colore purpureum.

ÆRVGO, est viride aris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistur-
lasque extergit : carnis excrescentiæ me-
detur, vehementerque exsiccat.

Vnguen-

Vnguentum aureum D. Mesue.

℞. Cera citrina ʒ vj.
 Olei boni ℥ ij. β.
 Terebinthina ʒ ij.
 Resina Colophonia ana ʒ j. β.
 Turis Mastiches ana ʒ j.
 Croci ʒ j.

Confice secundum artem.

VULNERA certò & salubriter glutinat.

*Vnguentum Citrinum [aut Citreum,]
 D. Nicolai.*

* ℞. Boracis ʒ ij. Camphora ʒ j.
 Corallii albi ʒ iiij.
 * Amenti dulcis ʒ j.
 Umbilici marini
 Tragacanthæ albiſſimæ
 * Amyli ana ʒ iiij. Cryſtalli Entalii
 Dentalii Turis albiſſimi
 * Nitri * Marmoris albi ana ʒ ij.
 Gerſe ſerpentariæ ʒ j. Ceruſſæ ʒ vj.
 Axungia porcinæ recentis, non ſalitæ, ſed
 præparata & mundata ℥ j. β.
 Seu caprini præparati ʒ j. β.
 Adipis gallinacei præparati ʒ j.

Confice ſic: Axungiam porcinam atque
 adipem gallinaceum in vitreato vaſe li-
 qua ſimul; & impone tepidis adhuc, cor-
 ticum

ticum Citrei mali satis magnam quantita-
tem, & macerentur per mensem vnum.
Postea eximito cortices, & eliquatis adi- *
pibus, vt dictum est, adde seuum capri- *
num: deinde addantur reliqua tenuissimè
trita: vltimò verò insperge Camphoram
subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concor-
dare exemplaria in ponderum characteribus.
Nam quidam pro \mathfrak{z} , ponant \mathfrak{z} ; & econtrà.

BORAX est Niri species, qua aurum fer-
ruminant Aurifabri.

AMENTUM dulce, est Gypsum, quod in A
capillatas venas scinditur: [al. Alumen pla-
mosum.]

VMBILICI marini, lapilli sunt inuenti
in litore maris, figura Fabarum magnarum:
Germanicè vocantur Merbonen.

ENTALIVM testaceum quiddam est ma-
rinum, Fistula modo longum & concauum,
foris strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-
ua, dentatam rimam habens.

NITRYM est Salpstra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpenta-
rie vera preparata, vt infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce.] Amiantum veterum A
esse id, permale verterunt Fuchsius & Francis.
Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabu-
la, doctis licet veterum vocibus quandoque sint
confor-

conformia, non expropter semper reipsa eadem sunt, nec esse debent, idemq; significare. Quod in re doctos etiam viros interdum hallucinato videmus.

FACIET maculas emendat: scabiem in quacumque corporis parte exterit; cicatrices extenuat; ruborem oculorum & vstiones ex insolatu factas aufert; & ea quæ aspera sunt, læuigat.

Vnguentum Populeum
D. Nicolai.

R. Oculorum Populi arboris recentium ℞j. β.
* Axungia porcina preparata ℞ iij.

Oculi Populi contundantur, & mace-
rentur in Axungia, donec sequentes herbe
colligi queant æstate.

℞. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimaram Rubi tenerrimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani

Vermicularis

Lactucæ

Semperuiuæ maioris

Bardanæ

Violaria

Scatuncelli ana ℥ iij.

Herbe contundantur & misceantur ocu-
lis Populi & Axungia, & dimittantur per
dies decem: deinde coquantur supra len-
tum ignem, cum vini odorati sufficienti
quantitate, donec vinum consumatur: po-
stea

Itē colentur & exprimantur, & expressum
vnguentum reponatur.

MANDRAGORÆ folia ubique haberi
non possunt; idē duplex pondus foliorum Hyos-
cyami sumendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperui-
na minor, linguam non mordicans.

BARDANA id est, Lappa maior, cuius
radicem precipite esse accipiendam Nicolaus Ale-
xandrinus.

SCATVNCELLVM, reuera est Umbili-
cus Veneris, seu Cymbalaris, & non Krentz-
kraut. Folia habet pingua, concava vt Cymba-
lum, radicem Aro similem: perquam pauci
eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet; &
temporibus illitum, somnum conciliat.

Vnguentum Fuscum, D. Nicolai.

R. Olei P j. β.

Ceræ nouæ ℥ iiij.

Colophonix

Picis naualis

Sagapeni

Mastiches

Galbani

Terebinthine

Confice secundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

P

Vnguen-

*Vnguentum Diapompholygos,
D. Nicolai Alexandrini.*

Rx. Olei Rosacci
Cera albæ ana $\frac{z}{3}$ vj.
Succi fructus vuc Lupinæ quantum sufficit.
Cerussæ $\frac{z}{3}$ ij. Plumbi vsti & loti
Pompholygis Turis puri ana $\frac{z}{3}$ j.
Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihili albo. Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Galmes flug.

VVA Lupina, id est, Solanum sine Solatrum.

AD exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda tibiæ ulceræ, aliorumque locorum concaua vel dissipata, valet; replet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ, D. Guilielmi
de Varignana.*

Rx. Corticum medianorum Castanearum
Corticum medianorum Glandium
Corticis mediani Quercus arboris
Myrtillorum
Caudæ equinæ Gallarum
Corticum Fabarum
Acinorum Vuarum
Sorborum immaturorum siccorum

Mespi-

Mespilorum immaturorum siccatorum

Foliorum Pruni siluestris

Radicum Chelidoniæ ana ʒ j. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis l' viij aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colatura lauentur sequentia nouem vicibus; semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescumque lauaris.

R. Cera nouæ ʒ viij. β.

Olei Myrtillorum

Olei Mastichini ana l' j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

R. Corticis mediani Castanearum

Corticis mediani Glandium

Corticis mediani Quercus arboris

Gallarum ana ʒ j.

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum Acinorum vuarum

Sorborum siccorum ana ʒ β.

Trochiscorum de Charabe ʒ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina quæ sunt in uvis.

SORBA sunt fructus similes Mespilis: Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel, & Drecksetke.

PRUNVS siluestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæ.

P 2 morrhoi-

morroïdas sistit, ac laxatos renes conciliat, [menses retinet.]

*Vnguentum de Arthanita maius,
D. Mesue.*

R. Succi Arthanitæ ℥ iij.
Succi Cucumeris asinini ℥ j.
Olei Irini ℥ ij.
Butyri vaccini ℥ j.
Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.
Polypodii ℥ vj.
Euphorbii ℥ β.

Arida omnia contundantur, & mace-
rentur in succis per dies octo: affuso etiam
oleo in vase vitreo, diligenter obturato:
nona deinde die coquantur lento igne ali-
quandiu, postea colentur: Colaturæ adde
Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.
Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consum-
ptionem succorum: postea adde
Ceræ ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Ferueant simul, donec lique scat cera:
postea insperge sequentium rerum tenuis-
simum puluerem:

R. Scammoneæ Aloës Mezereon
Colocynthidos ana aureos v.
Euphorbii aureos ij.
Salis gemmæ aureos iij.
Turbiti aureos v.

Pipe-

Piperis longi Zingiberis
Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidos ana aureos v. meus autem manuscriptus Mesue habet aureum j. quod magis probo: sed textum nolui immutare.

ARTHANITA est Cyclamen; siue Cyclaminus: quidam malè vocant Paxem porcinum. Si radices eius non adsint recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter l' vj. contundantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Glycyrriza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deiicit, ob id hydropicos mirè iuuat, ferosum excrementum largè vacuando: vermes quoque necat, & educit: adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

*Vnguentum de Arthanita minus,
D. Mesue.*

℞. Succi Arthanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice Filicis

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ℥ ij.

Oesypi [*id est, Hyssopi humida*] ℥ v.

Olei Irini l' ij.

Bdellii Hammoniæ ana ℥ j. β.

P 3 Aceti

Aceti quantum satis est ad Hammonia
cum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vj.

* Corticum radicū Capparis ℥ j. β.

Spicæ ℥ iij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed
eam herbam quæ Germanicè vocatur *Waltfa-*
ren, & *Creutzfaren*.

CATHENGIT significat Ebulum : est
autem hoc vocabulum valdè corruptum in plu-
rimis exemplaribus.

OESYPYS, id est, Hyssopus humida, &
est pinguedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos
dissoluit, & strumas.

Vnguentum Potabile.

℞. Butyri recentis sine sale ℞ iij.

Rubiæ tinctorum

Castorei

Spermatis Ceti

Tormentillæ [radicū] ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vi-
ni consumptionem, ac fiat vnguentum
secundum artem.

DATVR ad consolidandum casum ex
alto. [Sumitur ab uncia dimidia ad inte-
gram.]

Vnguentum

Vnguentum Rosatum, D. Mesue.

℞. Axungia porcinę recentis quantitatem
 quam volueris, & lauetur in aqua ca- *
 lida nouies, & tandem cum aqua
 frigida lotionē vltima: deinde teratur
 cum ea Rosarum rubearum recentium *
 æquum pondus, & dimittantur mar-
 cescere per dies septem: postea coquan-
 ter cum facilitate, ac percolentur, &
 rursus tantundem Rosarum rubearum
 teratur cum ea, & dimittatur per alios †
 dies septem marcescere, atque adfunda-
 tur succi Rosarum pars dimidia, olei
 Amygdalini pars sexta, & rursus con-
 coquantur cum facilitate, dum succi
 euanescent. Quodd si parum Opii in *
 aqua Rosarum colliquatum inter deco-
 quendum iniicitur, fit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpe-
 tas sedat: Cephalalgiam calidam, & ven-
 triculi ac hepatis intemperiem calidam
 mitigat.

Vnguentum Pectorale.

℞ Mucilaginis seminis Psyllii
 Tragacanthæ
 Gummi Arabici Seminis Lini
 Fœnugræci ana ʒ j. *
 p 4 Adi-

Adipis gallinæ Medullæ vituli
Butyri recentis loti cum aqua Violarum
ana \mathfrak{z} j. β .

Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana \mathfrak{z} j.

Ceræ albæ quantum sufficit: fiat vnguentum.

MIRIGAT dolores pectoris & tussim:
digerit, maturat, faciliat sputum, & res-
soluit pleuresin.

Vnguentum Album Caphuratum.

R. Olei Rosati P j.

Ceræ albæ \mathfrak{z} iij.

* Cerussæ \mathfrak{z} vj.

* Albi ouorum num. iij.

Caphuræ dissolutæ cum aqua Rosarum ex
arte \mathfrak{z} ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Rubrum Caphuratum.

R. Olei Rosati P j. β .

Lithargyrii \mathfrak{z} ij.

Minii \mathfrak{z} iij. Cerussæ \mathfrak{z} j. β .

Tuthiæ

Caphuræ ana \mathfrak{z} iij.

Ceræ \mathfrak{z} ij. in æstate: Sed in hieme \mathfrak{z} j.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum
pistillo plumbeo.

CERO-

CEROTA.

*Cerotum Infrigidans Galeni,
ex Mesue.*

℞. Cerae albę ʒ j.

Olei Rosati omphacini ʒ iiij.

*

*

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceri. Oleum verò Omphacinum antequam Rosas recipiat, sapius est laundum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

REFRIGERAT febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

Cerotum Santalinum, D. Mesue.

℞. Rosarum ʒ xij.

Santali rubei ʒ x.

Santali albi

Santali citrini ana ʒ vj.

Boli Armeniaci ʒ vij.

Spodii ʒ iiij. Camphorę ʒ ij.

Cerae albę ʒ xxx. Olei Rosati ℥ j.

Confice secundum artem.

OLEUM Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

P 5

P H L E-

PHLEGMONAS & intemperatura
omnes calidas ventriculi, hepatis, & pan-
tium aliarum potentissimè extinguit.

*Cerotum Stomachale Galeni,
D. Mesua.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xx.
Foliorum Absinthii ʒ xv.
Mastiches ʒ xx.
Spicæ Nardi Indicæ ʒ x.
Cere mundæ ʒ iiij.
Olei Rosacei ℥ j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum lauentur, & excolata omni aqua rur-
sus ad lentum ignem resoluantur: deinde
alia omnia insubtilissimum puluerem tri-
ta, inspergantur.

VENTRICULUM & hepar roborat:
horum dolorem à frigido lenit, appe-
tentiam excitat, coctionem iuuat.

EMPLASTRA.

*Emplastrum Diachylon simplex,
D. Mesua.*

℞. Mucilaginis Fœnugræci
Mucilaginis seminis Lini
Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.
Olei

Olei veteris clari ℞ iij.

Lithargyrii ℞ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum, à succis viscosis siue mucilaginibus: hodie corrupto nomine dicunt Diachylon.

Mucilagines istæ debent esse spissæ & viscosæ: ideoq; oportet ut quantitas seminum & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagines.

SCIRRHOS hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipfas etiam chæceradas & durties reliquas emollit & suuat.

*Emplastrum de Mucilaginibus,
seu Diachylon compositum.*

℞. Mucilaginis Radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Ulmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iiij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. β.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ β.

Ceræ nouæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in vino optimo, & conficiatur secundum artem Emplastrum.

Porro hieme licet oleorum & Terebinthine pondus augere.

VLMS arbor est que vocatur Germanicè Tlmen & Rustern. Cortex eius medius est similis cortici Tilia: Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camomilla.

MATVRA T apostemata, & mollit durities; partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum, Filii Zacharie, ex Mesue.

℞. Lithargyrii mundi tenuissimè triti, & per cribrum excussi ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

** Mucilag. rad. Althææ*

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos

Succi Scillæ

Oesypi

** Glutinis Alzanahan ana 3 xij. β.*

** Terebinthinae ℥ iij.*

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Con.

Conficiatur secundum artem Empla-
strum.

Succus Scilla, est mucilago ex trita Scil-
la expressa.

Oesypus, est pinguedo lanarum succi-
darum; cuius faciendi modum in ultimo tra-
ctatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharma-
copoliis *Hyssopus humidus*.

Gluten Alzanahan vel *Alchanach*, si-
ue *Alzanach*, est *Ichthyocolla*, id est, gluten,
siue colla piscium: vulgò *Hausenblasen*. [Alii
sumunt *Limacum succum*.]

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam
& spissitudinem Ceroti.

RESOLVIT & maturat omnes duri-
ties & inflammationes.

Emplastrum Diachylon paruum,
D. Mesue.

℞. Lithargyri ℥ vj.
Olei veteris clari ℥ j.
Mucilag. Psyllii ℥ iiij.
Mucilag. Hyoscyami ℥ j. β.
Mucilag. seminis Lini
Mucilag. radicum Maluæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Empla-
strum, Ceroti alicuius spissitudine.

TVMORES calidos digerit & matu-
rat.

P 7 Empla-

*Emplastrum de Meliloto,
D. Mesuæ.*

- ℞. Meliloti ℥ vj.
 Florum Chamæmeli
 Fœnugræci Baccarum Lauri
 Radicum Althææ
 Absinthii ana ℥ iiij.
 Seminis Apii
 * Cordumeni Ireos Cyperi
 Spicæ Nardi Indicæ
 Casiæ lignæ
 * Ammios ana ℥ ij. β.
 * Sampfuchi [*id est, Maiorana*] ℥ iiij.
 Hammoniæci [*id est, Harmoniæci*] ℥ x.
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana ℥ v.
 Terebinthinæ ℥ j. β.
 Ficum pinguium num. xij.
 * Seui caprini
 Resinæ ana ℥ ij. β.
 Ceræ ℥ vj. Olei sampfuchini
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.
 Confice Emplastrum sic:
 ℞. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.
 Fœnugræci
 Chamæmeli seorsum præter prædicta ana
 ℥ iiij.
 Coquantur in l' iiij aquæ aut quantum
 sufficit, donec remaneat l' j. deinde om-
 nia

nia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissimè incisæ & contusæ, & optimè misceantur. Postea ad ignem simul liquefiant Terebinthina, Seuum caprinum, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei Sampsuchi ana circiter ℥ v. Cum deinde omnia sunt mista, addantur pulueres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere. ℥ vj. ingredientis Meliloti vnà cum reliquis aridis tundito, & iisdem permisceto: postea & ad decoctionem priuatim Meliloti m. iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissoluito: Olei verò Sampsuchini atque Olei Nardini accipere tum oportet ana circiter ℥ vij. aut ℥ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

O L E I Sampsuchini compositio suprà traditur in tractatu de Oleis.

Per Oleum Spica, Mesue intelligit oleum Spica Nardi, siue oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lauandula maioris, quæ hodie Spica vocatur; neque eius olei quod vocant oleum Spica.

EMOLLIT omnem duritiem quæ in iecinore, liene & ventriculo existit. Dorem

lorem item vehementer sedat, hypochondriaque tensa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesuae,*
cui sub Vnguenti nomine
describitur.

℞. Lithargyrii subtilissimè triti

Aceti vini ana l' j.

Olei veteris l' ij.

- * Fiat coctione secundum artem Emplastrum.

FACIT nasci carnem in vulneribus; & consolidat ea.

Emplastrum Oxycroceum,
D. Nicolai.

℞. Cere Picis Colophonie

Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniæ Myrrhe

Libani [id est, Turis]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti
sufficienti quantitate dissoluantur, & rur-
sum ad lentorem coquantur, donec ace-
tum in vaporem evanuerit: tum addan-
tur liquefactis simul Cera, Pici, Colo-
phonie & Terebinthinæ: postquam om-
nia

EMPLASTRA. 353

nia sunt commista, inspergito etiam Myr-
tham, Libanum & Mastichen subtilissimè
trita : ad vltimum verò etiam Crocum
per se in tenuissimum puluerem redactum.
Et fiat secundum artem Emplastrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Empla-
strum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc A
modum tradit Oxycrocei confectionem. Alii au-
tem qui ex eo hoc Emplastrum scripserunt, ter-
tiam eius partem describunt : & cum ζ iiij. in
tres partes diuidere conarentur, tertiam earum
partem statuerunt ζ j. ζ iij. itaque resultat
 ζ j. Nam ter tria nouem faciunt : quapropter
nos malumus ex fonte haurire huius Empla-
stri confectionem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchs. prauè hinc cen- A
set Cordum in ponderum ratione errare, re non
bene ab ipso met ponderata.

PRODEST ossibus fractis, item par-
tibus quæ dolore aliquo affliguntur: duri-
tiam denique omnem emollit & discutit.

Emplastrum Apostolicon, D. Nicolai.

Rx. Lithargyrii ζ vj.

Ceræ fuluæ

Colophonix ana ζ ij.

Propoleos

Visci

- * Visci quercini ana ʒ j.
 Hammoniæ
 Lapidis calaminaris ana ʒ vj.
 Mastiches Olibani
 * Mumia ana ʒ iiij.
 Terebinthina Bdelii Galbani
 Myrrha Aëris vsti Squammæ aris
 Viridis aris Sarcocollæ
 Dictamni Cretici
 Aristolochia rotundæ
 Opopanacis ana ʒ iiij.
 * Oleis veteris quantum satis erit.
 Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit: quare nonnulli ʒj. iniiciunt.

PROPOLIS non sunt sordes alueariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hiemem foramina alueariorum obturant: Germanicè vocatur Bet & Nebenvvax: eam apes colligunt ex oculis Populi & Berula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc est, Dervogelleym auß Eichenmistell gemacht.

SQUAMMA aris est duplex: una est crassa, que

EMPLASTRA. 355

que vocatur Germanicè Kupferschlack; altera farina modo tenuis & rufa: hæc vocatur Kesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum & renum; sagittas ac surculos corpori infixos extrahit.

Emplastrum Apostolicum, D. Nicolai Alexandrini.

℞. Lithargyrii ʒ xvij.
Cera rubra
Colophonæ ana ʒ vj.
Propoleos
Visci Quercini ana ʒ iij.
Hammoniæ
Lapis Calaminaris ana ʒ ij.
Turis Mastiches
Mumiæ ana ʒ j. β.
Terebinthinæ Galbani
Bdellii Myrrhe
Chalcu cecaumenu Sarcocollæ
Lepidos chalcu Opopanacis
Dictamni Cretici Aristolochiæ
Prasii viridis ana ʒ j.
Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolynum: deinde omnia sigillatim secundum artem

artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus ultimò addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncie sex.

CHALCV CECVMBNV, id est, *Æris vsti.*

LEPIS Chalcu, id est, *Squama aris: Germanicè Kufferschlag, vel Kesselbraun: & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraun vocatur.*

PRASIUM viride hic significat *Æruginem, id est Viride aris.*

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concauitates earum pura carne replet; repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

R. Olei	℥	ij.
Cerussæ	℞	j. β.
Ceræ albæ	℥	iiij.

Coquan-

EMPLASTRA.

357

Coquantur secundum artem, & fiat
Emplastrum.

OPITVLATUR excoriatis à calcea-
mentis, & scapellatione, vel ab alia causa.

Emplastrum griseum, de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.
Lithargyrii ℥ ij. Cerussæ ℥ β.
Tuthiæ ℥ j.
Terebinthinæ ℥ vj.
Cerae albæ ℥ j. β.
Seui ceruini ℥ ij.
Turis electi ℥ v. Mastiches ℥ iiij.
Myrrhæ ℥ ij. Camphoræ ℥ j. β.
Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifat vlcera.

Emplastrum viride.

℞. Cerae nouæ Resinæ
Terebinthinæ ana ℥ iiij.
Olibani [id est, Turis] Mastiches
Viridis æris ana ℥ iiij.
Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

℞. Cerae albæ
Resinæ Pineæ
Seui vaccini
Picis

Picis naualis Terebinthinæ Olibani
Myrrhæ ana ℥ j.

Olei quantum sufficit : fiat Emplastrum.

VLCERA phlegmone carentia , præ-
fertim partium neruofarum , terget , &
carne implet.

*Emplastrum de Crusta panis,
Montagnana.*

R. Mastiches Menthæ Spodii

Corallii rubri

Santali rubri

Santali albi ana ℥ j.

* Crustæ panis tostę & maceratę in aceto
per horam mediam ℥ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ℥ j.

Farinę hordei , quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum , & his
qui cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri,
D. Mesnæ.*

R. Turis Mastiches

Myrrhæ ana ℥ j.

Baccarum Lauri ℥ ij.

Cyperi

Costi ana ℥ β.

Mel-

PRÆPARATIONES QVORVMD. SIMP. 359
Mellis calidi colati quantum ad cogen- *
dum satis est.

Si verò triplum Cyperi, & stercoreis vac-
carum aut caprarum sicci ad pondus om-
nium accipiatur, erit efficacius ad hydro-
pifin, & inflationes discutiendas.

VENTRICVLI, intestinorum, hepa-
tis, renum, vesicę, vteri, & partium alia-
rum dolorem à flatibus aut intemperie fri-
gida ortum placat.

PRÆPARATIONES QVORVNDAM SIMPLICIVM.

*Aloën cum Aromatibus
ablundi modus.*

℞. Aloës purissimę & cribratę ʒ j. *

Casę lignę

Spicę Nardi Indicę

Asari Schoënanthi

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Cinnamomi Ligni Aloës

Croci Mastiches

Lacę ana ʒ iiij.

Decoquantur aromata in aquę quanti- *
tate sufficienti, secundum artem in duplici
vase;

vase; deinde colentur. In colatura dissolue Aloën, continuè agitando : & pone ad solem in vitrea aut vitreata patina, donec exsiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro tectam soli exponere, ne aliquid incidat. Quodd si hieme lauanda est Aloë, in estuarium ad fornacem ponatur : oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, & si quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

℞. Aloës purissimæ & tritæ ℥ ij.

Aquæ cælestis q. s. aut ℥ vi.

Misceantur in patina vitrea, ita vt aqua calefacta prius infundatur : deinde subside finito sordes & calculos ; & puram pinguemque aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim excolato, & sordes in fundo abiicito; postea colaturam tectam linteolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est : & qui eum primus inuenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignorauit : nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum,

*dum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos
verò rectius modum trademus.*

*R. Aristolochiæ longæ
Schœnanthi ana ʒ ij.*

*Decoquantur in aquæ l' iiij. aut q. f.
donec remaneant l' iiij.*

Colaturæ insperge

Lacæ integræ l' j. ʒ iiij.

*Decoquatur Lacca deinde lento igne,
donec aqua fiat coloris sanguinei: & quid-
quid in Lacca boni fuerit, dissoluatur;
tum per filtrum aut laneum pannum cola,
& remanentes sordes abice. Excolatam
verò & sanguinei coloris aquam lentis
prunis in duplici vase usque ad mellis spif-
situdinem coquito, & tepidam massam in
Trochiscos fingito. Hic itaque verus est
modus abluendi Laccam.*

Plumbum lauandi modus.

*R. Mortarium plumbeum: in eum infun-
de aquam caelestem, & agitato aliquot
horas aquam in mortario, donec aqua
colorem acquirat liuidum, & crassescat
in modum limi. Limum hunc per lin-
teum exprime, & exiccatum repone
[in pastillos.]*

*Limatura ferri, quam Scoriā vocant,
preparatio.*

*R. Limaturam ferri optimi, aut Chaly-
bis,*

bis, aut Squamam, hoc est, Batituram
 eius: purga eam ab omnibus immundi-
 tiis, hoc modo: Proiiciatur in aquam cla-
 rissimam, & fricetur manibus: postea
 sordidam aquam effunde totam, deinde
 impone limaturam in vitream patinam,
 & affunde modicum aceti, vt tantum hu-
 mectetur, nec emineat acetum: postea
 macera diebus xxx. ultimò tere, & reponere.

Scammoneam preparandi modus.

℞. Scammonee optime ℥ iiij.

Contere in subtilissimum puluerem:
 deinde insperge illi olei Violati optimi
 modicum, vt fiat massa: deinde excava
 aliquot Cydonia mala magna, & in caui-
 tatem eorum impone massam Scammo-
 nee, & coöperi foramina Cydoniorum:
 postea assa in fornace cum pane, donec
 Cydonia perfectè sint assata: deinde exime
 Scammoneam, & impone sequenti diluto:

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥ j.

Succi Cydoniorum ℥ iiij.

Conterantur Myrobalani, & miscean-
 tur cum calefacto Cydoniorum succo, &
 stent in infusione horis xxiiij. deinde leni-
 ter cola: colaturam verò infunde Scammo-
 nee, & optimè simul misce: ultimò in
 loco calido exicca, & exiccatam reponere
 Scammoneam: [quod Dacrydium, Dia-
 crydium & Diagridium vocant.]

Colocyn-

Colocynthis preparatio.

1. Colocynthis pulpę P j.
dellii

ragacanthę ana 3 xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè:
ragacanthum verò & Bdellium dissolue
in aquę Rosarum q. l. & dissoluta insper-
se incise Colocynthidi, & fac Trochiscos,
quos in sicco aliquo loco siccabis: exsicca-
tos deinde Trochiscos iterum subtilissi-
mè terito, & reforma Trochiscos, adhibi-
ta Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.
Porro Trochiscorum Alhandal confe-
ctio, est vera Colocynthis preparatio.]

Scille preparatio.

2. Scillam magnam, recentem, neque
putridam, neque gelu flaccidam: abiice
eius exteriores aridas tunicas: inuolue
deinde eam massę siue pastę pistorum
unde panis fit: assato postea in furno
cum panibus, donec panes percocti
fuerint: hinc è furno exime Scillam, &
figillatim omnes tunicas detrahe, &
funiculo traiectas in calido loco exsic-
cato: abiicito verò medium Scillę cor,
unde germen enasci solet. Porro Scilla
non est incidenda ferreo aliquo cultro,

Q 2 sed

sed è ligno solido aliquo facto : nam
contrahit à ferro venenosam quandam
rubiginem.

Mezerei fol. preparatio.

℞. Foliorum Mezerei quantum libuerit
ea macera in aceto vini horis xxiiij. po-
steà exsiccentur: cum verò uti iis voles,
contere, & in contundendo abiice eo-
rum venas & neruos.

Esula rad. preparatio.

Esula tam maior quàm minor, præpa-
ratur eodem modo quo Mezereon.

Gersam Serpentariae faciendi modus.

℞. Radices Serpentariae veræ, vel loco
eius radicem Ari, id est, Aronis ꝓ iij.
Terantur subtilissimè, & affunde eis
aquæ Rosaceæ ꝓ iij. deinde exsiccentur
ad solem in vitrea patina, linteolo recta.
Posteà secundò tantum aquæ rosaceæ
affundito, & simili modo exsicca: ter-
tiò eadem aquæ Rosaceæ quantitas in-
spargatur: & ultimò siccata farinam
cum vino odorato in Trochiscos siue
orbiculos finge, & repone. Ingreditur
autem hæc Gersa vnguentum Cirrinum,
& re-

& reliqua quæ ad nitorem cuius confi-
ciuntur.

Spodium preparandi modus.

℞. Eboris in partes secti ℞ j.

Pone id in nouum & nondum cre-
matum fictile, & crudo operculo tegi-
to, & iuncturam luto figulino dili-
genter oblinito: postea in fornacem
figuli mitte, & cremari finito, donec
fictilia percocta sint: deinde exem-
tum Ebur in tenuissimum puluerem te-
rito & cribrato, & infunde ei in pati-
na vitrea aquæ Rosarum ℞ ij. & exsicca-
ri finito. Deinde secundò terito, & alias
℞ j. aquæ Rosaceæ affundito, atque simi-
liter exsicca. Tertiò etiam terito, & ad-
misce aquæ Rosarum ℞ j. in qua diligen-
ter dissolutæ sint Camphoræ trita subti-
lissimè ʒ iiij. Tere omnia in tabula mar-
morea durissima, & finge Trochiscos:
quos repone in denso vase aliquo, ne ex-
pirent Porro si Ebur habere non poteris,
loco eius fume Cornu ceruinum, & simi-
liter præpara: est enim hoc quoque efficax
medicamentum ad multa, præsertim con-
tra venena.

*Ebur crematum, melius est ut [non] oper-
culo fictili fiat. aliàs enim non candidum, sed ni-
grum sit.*

Q 3 Pul-

Pulmonis Vulpini preparatio.

℞. Pulmonem Vulpis recentem : extrahe ex eo arteriam siue fistulam , & laua in vino odorato calefacto : mox ollæ impositum , exsicca in tepido furno : deinde exsiccatum repone in loco sicco , & inuolue Absinthio , ne putrescat.

Hepatis Lupini preparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini preparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito , & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam , Apium , Petroselinum , Leuisticum , & similia : deinde sanguinem eius , qui ex arteriis fluxit , excipito , & concreescere finito : atque aqueum illud effunde ; grumos verò sanguinis in furno exsicca. Mactandus autem est Hircus Veris exitu , id est , principio æstatis , cùm Sol Cancrum ingressus est.

Adipum vel Pinguedinum preparatio.

℞. Adipem vel Pinguedinē cuiuscunque anima.

animalis; & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa, aut cruenta appareat: deinde minutim incisam liqua in duplici vase; & eliquatam in frigido loco repone, sine sale.

Medullarum preparatio.

Medullas ex ossibus anferro Autumni initio, & laua, & liqua in duplici vase, secundum modum qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum præparatione.

Oesypum faciendi modus.

℞. Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgata, ex collo, feminibus & femoribus ouis detonsæ, quantitatem satis magnam; infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter, quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissime ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem; iterumque aquam refundito, donec spumet, & subidentem pinguedinem auferro, & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreseat.

Q 4 supra

supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauto, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & pinguedo linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine Hyssopus humida: sed non bene prae paratus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquendi
modus.*

℞. Resinae Terebinthinae, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, ℥ j. affunde ei aquae ℥ xxiiij, & coque in magno vase, donec odorem amittat, & inspissetur, aded ut refrigerata digitis in pulverem teri queat. Hoc modo vsta [seu cocta potius] resina ingreditur in quendam Unguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopole totius ferè Europa, succum Prunorum silvestrium, id est, Schlehen safft. Sed hac, quam describemus, propius ad vera Acacia vires accedit.

℞. Sc-

PONDERVM RATIO. 369

R. Seminum Thamarindorum

Sumach ana ℥ ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ celestis [seu pluuiæ] ℥ viij. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas, ad spissitudinem iustam; deinde repone, vt Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

PONDERVM
RATIO.

PONDERA quibus hodie Medici vtuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Vncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinum, Granum, Siligua, Lens*: & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuârunt.

Preter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt; qualia sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic*, quorum nominibus Mesuen potissimum vti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopola, qui libram

Qs sedatim

sedecim unciam, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis consuevunt accipere. Ea autem illos uti libra facile ex quarta colligitur, quibus uncias quatuor assignant; quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant, sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) Quarta, vel Quartarium, pondus exsistit trium unciam; Triens verò quatuor; veluti Sextans duarum unciam.

Porro Uncia octo drachmas constituit; denarios septem: Drachma scrupulos tres: Scriptulum verò, qui Gracis $\pi\epsilon\acute{\alpha}\mu\alpha$ dicitur (quasi primum ponderis elementum) nonnulli Scrupulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim; quae idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolaus tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Gracorum Medici usurpant. Drachma enim novem Lupinos pendit: Siliqua verò, quae Gracis $\pi\epsilon\acute{\alpha}\nu\alpha$ est, dimidium Lupini: Siliqua itaque sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua, intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitius; neque strigosum & emaciatum, qualia Hordei aut Tritici grana usurpamus, quae hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana Lentis. Unum verò

verò Siliqua granum sex Lentis seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, in univ-
sum triginta sex Lentis semina prodibunt, quæ
scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores
vsi sunt, veniemus: inter quæ primùm Mani-
pulus nobis occurrit. Sic autem vocant herba-
rum fasciculum, quem manus prehendere &
complecti potest. Pugillo autem perperam
pro pondere utuntur recentiores, cùm sit dimi-
nutium potius à pugno, qui compressis sit di-
gitis. Aureus, illis pondus unius drachma cum
dimidia significat. Danich pondus octo grano-
rum: Kirath verò quatuor.

P. C. SCHOL.

Danich.] Contra Georgii Agricole, alio-
rumque doctiorum virorum sententias, Cordus
Danich pondus granorum sex, & Kirath trium
faciebat.

Q^s NOTÆ

NOTÆ PONDERV M
QVÆ HODIE IN
VSV SVNT.

Grani	} Nota est {	Ö. Eingrein oder Ger- stenkornlein schwer.
Scrupuli		℥. Ein scrupel, ein dritteileins quintils.
Drachmæ		℥. Ein quintle, oder galden schwer.
Vnciæ		℥. Ein vnt, ist zwey lot.
Quadrantis		Quad. Ein quart, vi. lot.
Libræ		℔. Ein pfund.
Semis		ß. Halb.
Manipuli		M.
Pugilli		P.

FINIS eorum qua Valerius Cordus Nu-
rembergenſi Senatui exhibuit.

V ALE.

371
VALERII CORDI
DE
EXTRACTIONE,

VT VOCANT,
PURGANTIVM MEDICAMENTORVM,
ET
OLEORVM DISTILLATIONE;

in genere primum; deinde priuatim de Oleo è Chalcantho duplici, vno austero (vel acido) altero dulci:

*Libellus tripartitus, à CONRADO GESNERO
primum publicatus, & VAL. CORDI
Annotationibus in Dioscoridem ab eodem
annexus.*

PARS PRIMA.

De Extractione. Cap. 1.

EXTRAHITVR ex medicamentis Solu-
lucius ipsa qualitas purgans æquè ac
Olea, sed diuersa ratione. Olea pro-
pter aëriam substantiam asscendunt in di-
stillatione: Solutiua verò facultas, quo-
niam terrestri corpori inseparabiliter in-
hæret, non asscendit, sed in fundo relin-
quitur: excepto vno atque altero, flore
videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-
rum aqua distillata aluum subducunt; &

Q7

hoc

hoc quia flores hanc vim obtinent : nam
 hi melius à Sole excoquantur , & subtili-
 ores vires , quæ facile resolvuntur in
 vaporem , acquirunt. Sed quæ propriè so-
 * lutiua vocantur , vt sunt radices , aut radi-
 cum liquores , aut succi , aut cortices , aut
 semina, omnibus inest tenaciter inhærens
 & viscosa qualitas. Ideoque eorum solu-
 tiua vis non potest ascendere in distilla-
 tione , sed manet in substantia decoctio-
 nis , ex ea euaporante quicquid est aqueū.
 Excogitata autem hæc est extractio pro
 delicatis & nauseabundis , vt qui magnam
 solutiui dosim non ferunt.

Ellebori nigri extractio. Cap. II.

RECIPE rad. Ellebori nigri recent. li-
 bras iiij. lauentur, dum sunt succo prædi-
 ctæ : deinde incide minutim , ac superin-
 funde sequentis decoctionis colaturam.

- * Succu Buglossi , Borag. ana ꝑ ij. Succu de-
 purentur , & colentur diligentissimè , vt
 auri claritatem acquirant , & reponantur
 ad tempus conueniens.
- * Deinde ꝙ. rad. Fœniculi , Cichoreæ ,
 Asparagi , Petroselini , ana vne. iiij. Fruct.
 Iuiubarum , Sebesten ana ꝑ ij. Seminum
 * Melonum , Cucumeris , Cucurbitæ , Ci-
 trulli , ana ꝑ ꝑ. decoquantur secundum ar-
 tem in aqua ꝑ xij. Colaturæ infunde præ-
 dictas

EXTRACTIONIBVS. 375

dictas l' iij. succorum : deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsque dum radices emineant : deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad Mellis crassitudinem, clementi igne, adhibita assidua cura, ne aduratur. Postea repone, & vtere; faciendo periculum in dosi, à scrup. semisse, vsque ad scrup. vnum.

P. C. SCHOL.

Sebestena ana ℥ ij] Cum Gesneri editio ana ℥ ij. legat, ego ex industria (si pondere metiendi sunt hi fructus) ex drachmis uncias feci, & legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia una ad minus sumi debet. Cumque semina frigida ponderibus carerent, ego cuiusque ℥ β. adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi, ut suo more loca hæc restituat, permittitur.

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

R H A B A R B. electi l' j. minutim incidatur, & grosso modo teratur : postea affunde succi depurati Boraginis, Buglossi, ana l' ij. maceretur per horas xxiiij. deinde coque ad lentissimum ignem, vsquequo extrà emineat Rhabarbarum. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & expri-

376 VALERII CORD. DE ARTIF.
exprime, vt substantia in colatorio ma-
neat: colaturam coque ad mellis spissitu-
dinem, adiectis Zacchari vncijs ij. Qui-
dam in balneo Mariæ ad spissitudinem
coquunt, ne aduratur; quod melius est;
quemadmodum etiam in duplici vase Pur-
gando deglutiendum cum gutta olei Cin-
namomi, aut Anisi mixtum, & azymo in-
uolutum; faciendo in dosi periculum à
scrup. j. vsque ad scrup. ij. Quidam, quia
Rhabarbara per se non valde purgant,
acuiunt totam extractionem cum medico
Diacridii optimi: quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Cata-
potiorum. Cap. I IIII.*

CUM virtutem solutiuam ex massis pi-
lularum extracturus es, necesse est, vt prius
diligenter dispensata sit massa, sumpta
Aloë purissima, & aliis medicamentis ele-
ctis. Deinde recipe quamcumque volueris
massam, & concidas in minutas partes; ac
macera per octiduum in aqua pluuiali,
succorum Boraginis, Fœniculi ana q. s.
Coque deinde in vitreo duplici vase per
integrum diem: deinde exprime per la-
neum pannum mundissimum, qui nullos
pilos emittat; & iterum in balneo vel in
duplici vase ad iustam spissitudinem dili-
genter coquito, & forma pilulas minutas.
da

da scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius multo est, ut omnia in duplici vase coquantur.

Aloë quomodo optimè lanetur.

Cap. v.

ALOEN optimam, fuluam, pellucidam, facile in manu liquefcientem, confringe in partes minutas, & pone in patinam vitream, mundam: & infunde de super sufficientem quantitatem aquæ pluvialis: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari. postea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque. Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

De Distillatione Oleorum. Cap. i.

QVONIAM Aromata quædam, & omnium umbelliferarum herbarum semi-

femina ferè constant magna ex parte, calida, tenui & aëria substantia: ideo necesse est, ut aliquid de oleaginosa substantia habeant. Nam talem habet mixturam prope modum omne oleum. At cum oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur, duplex sit, quædam monenda sunt. Naturæ periti, duplex inuenerunt oleum in simplicibus medicamentis: vnum terrestre, crassum & viscosum, & totaliter suo corpori, in quo est, commixtum: quale est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum Lauri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaue-
 ris, & omnia similia, quæ in fructuum aut seminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cum substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec vlllo modo per distillationem elici possunt. quare vi exprimenda sunt è substantia. Alterum tenue, aëriumque est, & separabiliter suo corpori inhaeret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facile in distillatione, nec difficulter à suo, cui inest, corpore decedit. Tale autem est quod continetur in aromatibus, Carpobalsamo, Cardamomo, Piperi nigro, Cubebis, Cinnamonomo, Garyophyllis, Macere, Nuce moschata, Ligno Aloës. Item quod continetur in seminibus umbelliferarum herbarum: quales sunt Ligusticum,

Ange-

Angelica, Angelica minor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinaca, Caros, Cuminum, Ammi, quod appellant Amomum: item Apium, Petroselinum, Gingidium, Pimpinella, Anisum, Foeniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per distillationem in arena, ita vt tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto intectam optimè: vna autem vice ad ℥ij. iniiciantur, & sint trita secundum capacitatem cucurbitæ: infundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissimæ, ac misceto diligenter. Pone deinde cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed intersit arena. Cucurbitæ impone alembicum vitreum, cuius rostrum designat in stanneam vel ferream fistulam, stanno intrus & foris illitam: ea fistula transeat in obliquum per vas quod habet in se aquam frigidam, vt inter distillandum egrediens cum oleo liquor refrigeretur. claudite iuncturas accuratè, madefacta papyro vel linreo; & suppone exceptorium. Postea accende ignem lentum, & vide ne nimium surgat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam (vt Anisum) propter raritatem substantiæ suæ, simulque viscosum quod habent, largiter ebulliunt; ideo non statim alembicum imponere debemus: sed
postea

380 VALERII CORDI DE ARTIF.
postea quàm bullas excitari videris, & va-
porem sursum ferri. Quod cum fiet, de-
pone alembicum, & immisso bacillo agi-
ta; ita resoluetur in vaporem spuma, quæ
postea mediocri igne moderari, compesci
& excitari potest. Quo facto, impone rur-
sus alembicum, & circum lutato satis, ac
distillato sine cessatione, donec coniece-
ris nullum amplius intus contineri oleum:
quod visu & gustu statim percipies: nam
cum gustu distillantes guttæ non amplius
resipient iniectionis aromatis saporem, desi-
stendum est, ne aroma fundo cucurbitæ
inhæreat & exuratur. Deinde segrega con-
tinetur in distillata aqua oleum optimum,
quo potes artificio. Porro notandum est,
quædam ex his oleis aquæ innatare, quæ-
dam fundum petere. Innatant Piperis
nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi:
Fundum petunt, Cinnamomi, Macis, &
Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua
Cinnamomi & Anisi cum distillantur, la-
cteum habent colorem: & lacteum hoc
paulatim in oleum conuertitur. Reseruan-
da autem Cinnamomi est aqua, præsertim
quæ primò exierit.

Natura & vires Oleorum.

Cap. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam
mira-

EXTRACTIONIBVS. 381

mirabilem habent : nam in hieme vtrumque concrefcit inftar butyri , ita vt afpectu imitentur fperma Ceti ; præfertim Anifi. nam hoc æftate media concrefcit afpectu niueum : reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præfertim Cardamomi & Piperis. Ea enim omnium tenuiffimam fubftantiam habent, adeò vt neglecta omnino euaneſcant. Vires autem habent earum rerum, è quibus extracta funt ; ſed multò effcaciores. Nam effcacia quæ vni libræ ineſt, in paucas drachmas contrahitur. Garryophylli enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciam vnam ſemis , aut duas : Cinnamomi in drachmas duas ſemis , aut duas : Piperis, in drachmas duas & ſemis, aut tres. Miſcentur autem in confectione guttæ x, vel xv, aut xx. libræ Succari pro delicatis : ſed infundendum eſt vltimò cum morſellis , quos facis , vel orbiculis, optimè miſcendo.

PARS TERTIA.

De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. i.

OLEUM Vitrioli, quod à quibuſdam Oleum Vitæ appellatur, aut Melancholia artificialis, nihil aliud eſt, quam

quàm aluminosa qualitas, & substantia ex Vitriolo per artem extracta, modicoque Sulfuri mixta. Nam ipsum Vitriolum, è quo fit, triplici constat mixtura, videlicet multo Alumine, modica Æruginè, & paulo Sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per Æris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & Sulphuri, (quod Marchasitæ inest) mixta, paulatim concrescit, aut industria ad spissitudinem coquitur: in distillando autem aluminosus & sulphureus vapor tantum affcendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta; quo fit, vt hoc oleum Aluminis, & non Æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet Alumine multo, & modico Sulphure: Dulce verò simpliciter Sulphure constat: Nihil enim aliud est, quàm liquidum Sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam Alumen, sed Sulphur amulatur. Faciendum est autem vtrumque maxima cura & diligentia; adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, vt aiunt Chymistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

Electio

Electio Vitrioli. Cap. II.

CUM plurimæ sint Vitrioli species, operæ pretium est indicare, quæ nam species eius huic operi potissimum conducat. Et quamuis omne Vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius caruleo aut viridi: quoniam plurimum fugitiui Sulphuris obtinet, quo adiuuatur, ut facilius oleum asscendat. Notandum etiam, melius esse facticio natium Vitriolum, & maximè Vngaricum: aut si huius copia non sit, Goslariense. Eligendum præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile, non est recipiendum; quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuriâ candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

Coctio Vitrioli. Cap. III.

AT quia Vitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui oleum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; compendiaria est inuenta via, qua breui temporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artifici fasti-

384 VALERII CORDI DE ARTIF.
fastidium pariat. Recipe igitur prædicti
Vitrioli P xij. conice eas in ollam ma-
gnam, nouam & optimè crematam: ollam
imponere fornaci profundæ, supra arduentes
prunas. Cum liquefieri & bullire cœperit,
spatula agitetur, vt integrum liquefacto
misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bul-
lire demum finito, vsquequo nullam pror-
sus bullam ampliùs excitet, & donec to-
tum densetur. Deinde exemptam è forna-
ce, cum Vitriolo ollam refrigerari per-
mittito, loco neque humido neque ven-
toso, sed sicco & tepido. Postquam refri-
geratum fuerit, ex olla eximito; & consi-
dera an superficies eius vndique rubescat.
nam si rubescit, bonum est signum, & fa-
ciliùs calcinatur, vt iam dicemus.


Calcinatio Vitrioli. Cap. IIII.

EXEMPTVM ollâ Vitriolum, in mi-
nutas partes confringe, & in mortario
subtilissimè tere: deinde tertiam aut quar-
tam eius partem in nouam ac bene co-
ctam ollam conice, ac rursus in profun-
dam fornacem, sicut antè, dimitte, & ali-
quandiu vrito, donec rufus fiat color.
Mox ollam ab igni depone; & moue
eam, vt videas notam, an satis calcina-
tum sit Vitriolum Nam si in olla fluctuat
argenti viui aut liquefacti plumbi modo,
& exi-

EXTRACTIONIBVS. 385

& exsurgentes bullas ei acutatur, satis vltum
 esse intellige: tunc effunde in magnam &
 recētem ollam, prius calefactam, & effluet
 quasi sit liquidum, aut ad modum argenti
 viui. Quod autem reliquum est Vitrioli,
 similiter figillatim, vt calcinetur, vras.
 Cū vltum fuerit, commisce rursus opti-
 mē in mortario; modeste agitans, ne pul-
 verem excites, nares & fauces offensurum.
 Cū hac omnia executus fueris, Vitrio-
 lum in balancem ponito, & animaduerte
 pondus ipsius. Nam si vj. lib. id est, me-
 dietas superfuerit, bene omnia facta sunt.
 Sed hec sufficiant.

De fornace facienda. Cap. v.



MATERIA quę di-
 stillanda est, quomodo
 preparanda sit, iam in-
 dicauius. Nunc au-
 tem dicere de fornace,
 res & ordo postulat.
 nam si hac inepta fue-
 rit, frustra omnia fient.
 Exstruenda igitur est
 fornax ex lateribus in
 planum positis, quo
 crassioribus parietibus
 ignis facilius & diutius
 contineatur: fiet etiam
 quadrata & æqualiter
 R crassa;

crassa; intusque habeat propemodum duarum spithamarum latitudinem, non tamen omnino, sed dempta tertia parte spithamæ. Exstruatur autem hoc modo: Prima & infima cavitās habeat altitudinem semipedis: cui per transversum imponantur ferramenta satis crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitās, quæ est constituta supra ferream cratē [id est, *uber den rost*] habeat duum pedum altitudinem, & ex anteriori parte foramen, per quod carbones iniiciantur. hoc incipiat lateris transversi crassitudine super cratē. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transversum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortę collum exeratur.

Distillatio Vitrioli. Cap. VI.

POSTQUAM fornacem exstruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Helliaco factam, prius undique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transversam & ferream
trabem

trabem in fornace optimè luto obducito, eiꝛue in medio superposito perlutatum testæ fragmentum : super id collocabis retortam, ne à candente ferro immediatè dissecetur, ita tamen, vt in medio fornacis retorta constituta sit, eiusꝛue rostrum extrorsum modicè prouum promineat, & meatus per quem collum suum è fornace exserit, diligentissimè luto farciatur atque obstruatur. Postea accipe quinque regulas, & fac ex iis tectum supra fornacem ; sub quo lateat retorta ad eum modum quem depinxi. Tectum luto vndique obducatur, quatuor pro fumo foraminibus relictis, in singulis angulis singulo, ea amplitudine, vt crassissimus pollex liberè intromitti & exeri queat. Fac etiam quatuor conos ex luto, quibus foramina obstruantur : quo facto, applica retortæ orificio receptaculum grande ex vitro Venetiano aut Hesiaco : quo enim maius id ipsum fuerit, eo liberius spiritus recipiet : si verò paruum fuerit, periculum est ne spirituum copia distentum rumpatur. Infunde etiam in retortam aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò spiritus ad se rapit, & prohibet ne confringatur receptaculum. Ita applicatum optimo luto diligentissimè obstruatur : magna adhibita cura, ne quicquam in receptaculum incidat ; tingitur enim inde in rufum colorem oleum. Cum

R 2 omnia

omnia hæc feceris, dimitte per integram noctem lutum exficcaris; ac si quæ fatiscunt rimæ, luto illinantur. Manè deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus; aperto vno superius foramine, per quod fumus exeat: augeaturque successiue ignis vsque ad vesperam; quo tempore aperiendum est secundum foramen: & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediuntur, veluti si quis candidum efflaret fumum. Nocte sequente vigili cura cauendum ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen. Ita deinde auctum ignem in vigore teneas: Ac altera die tertium aperi foramen; augēdo sigillatim ignem, vsquequo etiam retortæ collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem; & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cū ita in summo vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes: qui cū cessare voluerint, aperi omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonesingere, vsquequo etiam receptaculum excandescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum incuria aut casu decideret. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neque imber, neque ventus ingrediatur. Conseruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in

tus in Vitriolo relinquantur : quod visu facile percipi potest. Cum autem nulli amplius egredientur, sine ut per se extinguatur ignis : ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito. Postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis. Tum contractam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit : hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum, exustum in retorta Vitriolum.

Segregatio infusa aquæ.

Cap. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur una cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, ut Vitrioli liquor sincerus reponatur : segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili; tutius tamen in balneo : quia propter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam vitream Venetianam aut Hessiacam infunde; (superponendo Alembicum è simili vitro factum;) quæ bene luto circumlinatur : sub balneo deinde accenso igne, paulatim sine aqua exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egredietur : quare vide ut prædictæ xvij

R 3

vnciæ

390 VAL. CORDI DE ARTIF.
vnciæ sint bonæ mensuræ. Cùm hoc fece-
ris, refrigerari balneum finito, & aquam
quæ distillauit abiicito. Quòd verò in
balneo cucurbitæ in fundo reliquum fue-
rit, purum est Vitrioli oleum: habet ta-
men plerumque rufum colorem; ideò se-
cundùm sequentem modum rectifican-
dum est, vt clarum fiat.

Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.

ACCIPERE retortam Venetianam, aut
saltem Hessiacam, antea luto optimo ve-
stitam: in eam funde quod in cucurbita
continetur oleum: retortam pone in mi-
norem fornacem, in capellam quæ pura
& lota arena repleatur. Et quemadmodum
antea in balneo, ita nunc in arena distilla;
paulatim ignem acuendo, vt sigillatim
ex interuallo delabantur guttæ. Retortæ
orificio applica receptaculum ex eodem
vitro factum; ac commissuram optimè
luto claude, ne quicquam exspiret: cùm
deinde totum è retorta distillauerit, refri-
gerari finito: ac postea aufer, & infunde
sensim in purum vitrum Venetianum,
quod habeat angustum orificium; ac repo-
ne, ceu præsens in multis morbis reme-
dium. Hoc est austerum Vitrioli oleum,
cuius vires & naturam nunc indicabimus,
quas excellentes & efficaces habet.

Vires

Vires eius. Cap. IX.

M E R V M ac non dilutum, neque debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nempe corrodit, præter vitrum & pingua, veluti ceram, picem, seuum: & liquidorum etiam oleorum colorem immutat; præsertim olei Macis; cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repente sibi ipsi misceatur, aded incalcescit sua sponte, vt manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam pura melancholia: quare etiam Melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum ventriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat; frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit; crassos & viscosos humores incidit, colicę ac dysenterię opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum in febribus extinguit: singultum prohibet confestim, & nauseam ac cibi abominationē auertit. Sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

R 4

Aduer.

Aduersus Calculum.

℞. Olei Macis
 Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.
 Aquarum Anisi
 Fœniculi ana vnc. ij.
 Syr. Liquiritiæ vnc. j.
 Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè ; & gusta : si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est ; sinon est acetosaporio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

Ad Ventriculum debilem.

℞. Syr. de Mentha vnc. j.
 Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.
 Olei Cinnamomi guttas ij.
 Olei Vitrioli guttas iiij.
 Da securè.

Ad calorem & sitim in febris.

℞. Syr. ex Succo aut infusione Violarum
 vnc. j.
 Aquarum Cinnamomi vnc. j.
 Hordei vnc. iiij.
 Olei Vitrioli guttas iiij. aut iiij.

Misce,

Misce, & contrahet puniceum colorem,
& saporem vini austeri Cinnamomo aro-
matifati.

Ex austero quomodo dulce fiat.

Cap. x.

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli
oleum duplici constare mixtura, videli-
cet multo Alumine, & paucio Sulfure.
Quare cum ex austero oleo dulce extrahi-
tur, nihil aliud fit quàm quòd Sulfur ab
Alumine segregetur. Est itaque dulce Vi-
trioli oleum nihil aliud, quàm oleum Sul-
furis aut ipsum Sulfur in liquidam sub-
stantiam redactum. Et hoc propriè oleum
dici potest: est enim pingue vinctuosum-
que, quemadmodum ipsum Sulfur, quod
in oleo, & non in aqua liquefcit. Sequi-
tur autem modus segregationis,

Modus segregationis.

Cap. xi.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter
sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri
tātumdem: misce in Veneto vitro, & pone
in cucurbitam paruam, angusto orificio;
& optimè luto orificium claude: dimitte
ita per integrum mensem aut duos. Dein-
de effunde in cucurbitam cui sit immedia-

R 5

tè vi

te vi ignis agglutinatum & annexum
 alembicum, [hoc est, *ein kolb mit einen an-
 gesetzmeltzen helm,*] cuius figuram subii-
 ciemus: pone deinde in paruam fornacem,
 ac dimidiam partem eius cinere obrue:
 postea applica recipientem, & luto iun-
 cturam claude diligenter, & extrahe vnc.
 vj. vini ardentis, quas infudisti. Vt verò
 tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ;
 sic solum vinum absque oleo ascendet.
 Cùm extraxeris autem per balneum infu-
 sas sex vnc. vini ardentis, pone id quod
 residuum est, in fornacem, vt arena me-
 diam cucurbitæ partem attingat, ac nouo
 & vacuo recipiente (eoque non magno)
 applicato, luto iuncturam diligenter clau-
 de. Accende deinde lentum ignem; & sen-
 sim extrahe omnem humiditatem quæ re-
 licta est in cucurbita, donec nihil humidi
 amplius in fundo appareat: adhibita sem-
 per maxima cura & diligentia, vt ignem
 ita modereris, ne ebulliat vsque ad alem-
 bici canalem. Nam si hunc ebullitio atti-
 gerit, sedari non potest; nec prohiberi,
 quin in receptaculum egrediatur, ac to-
 lum oleum corrumpat; solet enim facilli-
 mē ebullire. Cùm autem sensim extraxeris,
 aufer statim recipientem cum suo humo-
 re: tum videbis duo contineri in eo, vi-
 delicet aqueum humorem, & oleosum, ac
 pinguem. Segregabis autem vnum ab al-
 tero

tero statim, ita vt nihil aqueum in oleo relinquitur: nam aqua illa perdit oleum. Solet autē oleum ipsum plerumque aquæ



innatare; maximè si infusum priùs vinum omnino per balneū extractum fuerit: sed statim poteris tactu discernere oleum ab aqua. Oleum enim pingue est, aqua minimè. Segregatū oleū deinde vsui re-ferua.

Einen Kolb mit einem angeschmeltzen helco, der musz man erlich auff der Glaszhuetten bestellen zu machen, aus zerbrochnem Venedischem glasz, oder aus Hessischem glasz.

Vires eius quod segregatum est.

Cap. XII.

VIREs habet quascumque & Sulfur: sed omnia efficacius præstat; quia propter liquiditatem facilius penetrat, & ad actiones properat; quod Sulfur non potest, quia impeditur a soliditate & spissitudine sua, quo minùs penetret. Illud verò

R 6 amplius

396 VALERII CORDI DE ARTIF.
amplius potest Sulfure hoc oleum, quod
valeat potenter ad omnes in corpore pu-
trefactiones, & præcipuè ad pestem. Ad
* educendum è pulmone in pleuritide, &
peripneumonia, & difficili tussi, pus, &
crassos viscososque humores: tutò enim
absque omni periculo intra corpus su-
mitur. Calculum neque in renibus, neque
vesica coalescere finit: exulceratam vesi-
cam sanat. Dosis eius est vna aut altera
guttula, aut tres, in vino modico tempe-
rata. Miscetur etiam rotulis & morsellis
è saccharo factis. Diligenter autem reser-
uandum est. Nam modicum fit ex lib. j.
austeri olei Vitrioli, & faciliè propter te-
nuitatem partium euanescit.

FINIS.

EPI-

EPITAPHIUM
VALERII CORDI,

qui
sepultus est Romæ, in æde D. Mariæ
de Anima, regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hef-
so, Euricii filio, moribus, ingenio,
comitate præstantiss. Doctorem omnium
admirationem merito: Qui naturæ ob-
scuritatem & herbarum vires adoles-
cens senibus explicavit: Cum expleri
cognoscendi cupiditate non posset, per-
lustrata Germania, Italiam adiit, Ve-
netiis in honore habitus, & Romam
vix ingressus, subito morbo inter ami-
corum lachrymas, non recuperabili stu-
diorum iactura, opt. etate extinguitur,
anno salut. M. D. XLIIII. VII.
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus; mens ipsa recepta est
Cælo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-

APPENDIX
EX SCRIPTIS
D. IACOBI SILVII,
MEDICI PARISIENSIS,
pro instructione Pharmacopolarum;

DE
SINGVLORVM MEDICAMENTORVM
SIMPLICIVM
exacto Delectu, Collectionis tempore legitimo, Repositione commoda, & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

RADICES euellendæ sunt, cum medicamento sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed alio alia vegeta magis sunt: quamquam sunt qui putent omnes radices legendas Autumno, ubi folia deciderunt: alii Veris initio, priusquam in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integrae sunt, si fieri potest, vellendæ, & unaquæque in solo & calo naturæ ipsius maximè familiaris, bene nutrita, bene habita, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigose, tenues, rugosæ: mox aqua lauanda, & radiculis por-

portionem quamdam alimentirepetentibus, & stolonibus etiamdum trahentibus, purganda: post nisi utendi recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel necessitas) siccande, quadam umbra & vento, ut Apii, Fœniculi, Iridis, & que alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariiores, quarum vires sol seu ignis promptè dissipet: quedam contraria dictis sole & vento, vel igni siccantur, si calum est nubilum, aut hiems: & sepè versanda, ne mucida aut putrida fiant: ut Bryonia, Gentiana, Mandragora, Rheum Pontici. Si virò siccatis citò est opus, patella ignita impositas sepè versando siccabis. Quedam item integra siccantur, ut Gentiana; alia in talsolas dissecte, ut Iridis; alie lignosa matrice (sic enim cor Plantarū Gaza ex Theophrasto vocat) adempta, ut Fœniculi, Petroselini, Apii. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc plantæ quadam adhuc humidiores requirunt, modò non flent austri. Eadem quamdiu vegeta adhuc sunt, seruanda; parua scilicet ac tenues & rara, ut Asari, Asparagi, anno tantum, quamuis Elleborus uterque etiam triennio seruari possit, ut magna & crassa essentia prædite, Bryonia, Rheum Ponticum, Aristolochia, Gentiana. Hac autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio comoda, & duratio, non in radicibus solis observanda sunt,

sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeo quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chamepityn, Chamedryn, Thlaspi, Cetaurium, Polion, Hypericum, aliaque florentia capiebat Galenus, Theriacen vel aliud medicamentum compositurus, non sole aestivo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando aduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madefiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec aliis vicina, neque sub tegulis, sed horum media, quae ostia meridiem spectantia habeat; prope quae tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium; & accusandi tum mercatores tum herbarii, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tēpus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Peonia enim radix ad epilepsiam legēda decrescēte Luna quibusdam videtur, & Alysson sub astu Canicula vult legi Galenus, ut Aeschriou caneros fluuiatiles capi cōtra rabiem, unde est herba nomen, Ἀλυσος, tanquam vis quadam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem

abiem canibus afferente. Plantas item calidas calidis regionibus, & ex harum editis & siccis, ut Creta montibus, praeferat Galenus.

DE HERBIS.

QUAE prius in Radicibus dicta sunt, de collectione, repositione, duratione illarum, ad Herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut Portulaca, Lactuca, Buglossa, Atriplice, Beta, Brassica, Acantho, Nasturtio, Helixine, Mercuriali, Viola nigra, Intubo, Fumaria, Hyoscyamo, Mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est: ut Ruta, Mentha, Absinthium, Abrotonum, recentes minùs calent, ob mistam humiditatem excrementosam; siccata verò calidiores sentiuntur; & Fumaria recens minùs aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cùm floribus Herba, aut seminibus: sic Benedictus Carduus, Acanthium putatus, Centaurium paruum, Calaminthe, Chamadrys, Chamapitys, Daucus, Fumaria, Maiorana, Polium, Pulegium, Origanum, Serpyllum, Thymus: aut saltem cùm vigent folia magnitudine, odore, colore, praesertim quae cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quae scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto putre-

putrere. Vbi prebè sunt siccata, reponuntur uti
radices: sed minùs diu seruari possunt; ob id
quotannis mutanda.

DE FLORIBVS.

Flores, ut plantarum partes reliqua, legan-
tur cum maximè vigent, ut Capparis in
gemma, Rosa expandi cœpta: reliqui ferè
aperiti, sed haud ita pridè, & ex quibus vis non-
dum exhalauit. Siccantur sole magis, minùs, pro
varia ipsorum natura. Quidam siccandos vo-
lūt, donec ex ponderibus decem unicum supersit.
Reponuntur, ut alia: Quotannis mutantur,
quamuis Schoenanthos etiam decennium efficax
seruari possit: Chamamelum item diu vegetum
est, ob fortem partium suarum missionem.

Flores & omnia quæ iucundum odorem ef-
flunt, arculis tiliaceis nullo situ obductis repo-
nuntur.

DE SEMINIBVS.

Legenda sunt Semina cum sunt matura, &
fructus quibus includuntur, maturi. Ma-
turi autem sunt, cum simile possint pro-
creare, ut Aristoteles libro de Affectibus mi-
storum docet. Semina verò quotannis mutare
prestiterit, etiamsi pleraque diutius seruari
possint.

Ut rectè perennent, charta aut foliis aptè in-
uoluantur.

DE FRV.

DE FRUCTIBVS.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

Corticis ut recondantur, eximere conuenit; cum herba suis foliis exsuntur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus. Sed cum luto aut puluere sunt obfusa, aqua elui debent.

DE SVCCIS.

Xυλός, id est, Succus ex plantis totis vel plantarum partibus concisis & tussis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur: hicq; vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut Vinum, Acetum: aut misto sale, ut Omphacium, Oleum: aut superfuso phiala oleo, ut Succus Rosarum, Granatorum, Limonum, Cydoniorum, Sambuci, Ebuli, & similium: aut sole, vetustateve, aut igni per se siccatur, ut Succus Glycyrrhizæ, Opos Cyrenaicus, Scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimis syrups audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi

nisi igne diutius cocti, aut sole aestiuo usque ad
mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem tem-
poris spacio sicciores euadunt, pluribusq; anni
seruati, eò siccitatis veniunt, ut Balauisticis si-
militer leuigari possint: quales sunt succus Hy-
pocistidis, Vua acerba, Glycyrrhiza, Cen-
saurii, & alii propè omnes. Qui verò ex his len-
torem quendam natura habent, dilatantur ma-
gis quàm leuigentur, nisi siccioribus multis mi-
sta horum parua portio. Portulaca, Semperuiui,
Cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum
succus, pra lentore nimio per se non potest expri-
mi: quare cum Omphacio probè trita herba ex-
primitur: alii tritas igni lento calefaciunt, alii
tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo
vasi impositas in catinum subiectum destillare
permittunt. Χυλός etiam, id est, succus, saepe cum
humore aliquo extractus ex partibus planta-
rum, ut semine Psyllii, Cydoniorum, Lini, Fæ-
nugraci, lentorem aut velut cremorem & mu-
corem significat: unde dictum est emplastrum
διὰ χυλῶν, id est, de glutinosis quibusdam suc-
cis; diuersum tamen ab eo quod est de mucilagi-
nibus; ut in compositis leges.

Liquidis medicaminibus densior materia ar-
gentea, vitrea aut cornea conuenit. Fictilis
etiam, si modò rara non sit, accommodatur, &
lignea, praesertim è buxo: sed anea vasa ocula-
riis medicamentis liquidisq; &c.

DE LA-

DE LACHRYMIS.

A'nguor, id est, lachryma, seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi quea res concreseat, siue in resinam liquecat leagina eius substantia. Arborum partibus, resertim truncis à germinatu incisus & scarificatis, etiam resinas eligimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut Pinu, Picea, Larice, Terebintho, Teda, Cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit Pix liquida: cui quod subernatat, Pissanthum tenui consistentia & facultate est adstringente; ob id canitiem sine ulla noxa tardat, ut Pisseleum, id est, Pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si Pix iterum coctione sicceatur, Palimpissa dicitur, sicca adeò ut puluerisari possit, qualis est Græca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. Πίσσα Βερβία, lib. 8. comp. pharm. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccatur: tenuium est partium, magis minus.

DE ANIMALIBVS,
ET EORVM PARTIBVS.

Sanguinis Hirci quadrimi, bene habiti, aliquamdiu nutriti vino albo, Fœniculo, Seseli,
Lauro

Lauro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vas vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccatus, etiam cum Myrrha, foliis Lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auicenna & ceteris practicois.

Adipem & Medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis Lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant, quae iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam, Adipum modo.

ADULTERIA SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM.

A Cacia succo & carne Prunorum agrestium representatur, dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crasse partes & impure, lotioni separate, aqua marina & Croco Mesue adulterantur: sed Croci odor dolum aperit. Alii Acacia, alii Gummi immiscendo adulterant: tunc quod minus est ad minima friabilis; & odor & sapor est alius.

Ambra,

Ambra, puluere Ligni Aloës, Styracis, Lada-
si, *Ambra largioris*; Moscho in aqua Rosarum
soluto. Sed hac manuum attritu multo, cen-
sura, mollescit; vera non mollescit. Platea-
rius.

Amomum, planta Amomide simili, sed inodo-
ra, ex Armenia delata. Seminis dissimilitudo
vitium detegit.

Asphaltum, id est, Bitumen Pice mislum,
Dioscoridi; licet adulterari non posse, ut neque
Carpobalsamum, neque Xylobalsamum, scri-
bat Gal. lib. 1. Antid.

Ærugo multis modis adulteratur Diosco-
ridi: sed hodie sincerior videtur. Si adultera-
tam suspiceris, notas ex eo repele.

Æris flos, limata aris scobe.

Bdellium adulteratur Gummi. sed ita vi-
tiazum, minus est amarum, & suffitu odora-
tum: Dioscorid.

Balsamum, id est, Opobalsamum, vitia-
tur Terebinthina pauco Opobalsamo mista, vel
sine hoc Croco Orientali, & succo foliorum Ci-
tri, vel oleo Nardino. De quo in Opobalsamo
plura leges.

Bitumen adulteratur Pice, ut in Asphaltum
dixi.

Castorium variè adulteratur. Vitium au-
tem facile deprehendes, attentus notis quas in
vero & laudatiore Castorio diximus in parti-
bus animalis medicamentosis.

Costus, radice pradura Helenii Comagenii:
sed

sed odor Helenii minus vehemens, neque caput tentans; & sapor minus acer, quam Costi.

Crocus misto Crocomagmate iusto, flore Cnici, vel oleo & pulvere Bersilii, ut vocant: qui fricando dolum detegit, vel saepe sublitu: & Lithargyro, vel plumbagine, ad pondus augendum. Virumque minus odore vegetum est: praeterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque Crocicolor & odor celeriter enascuntur, veridici permanent. Galenus primo Antidot.

Cassia odorata, corticibus Capparis & radicis Tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi: sed hoc est minus odorum, & durius; illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Garyophylli vestutate exanimati, vino pulverem optimorum Garyophyllorum habente irrigantur, siccantur: foris solum Garyophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine Hyperici simili, quod Petra Palastine oppido affertur, auctor est Dioscorides. Adulterari tamen non posse, affirmat Galenus 1. Antidot.

Euphorbium lacte badino, Sarcocolla & Glutini mistione conspurcatur. Experientia veri est difficilis: nam Euphorbium leui gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata Euphorbium respiciant. Idem iniectum igni odorem edit fastidientiam, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur Spodium vocet vulgus,

gna, non video) ossibus canis vstis, vel albo marmore vsto: id verò gravitate proditur: illud forma ossis, & linearum desiderio.

Galbanum mutatur Resina, Farina Faba- rum excorticatarum, Hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris Cypero Europeo insipido, vel falso; vel Bistorta, ut vocant, radice austera: si verò dicta radices aceto pulverem vera Galanga & Piperis habente biduo macerentur, foris solum Galangam referunt Platearius.

Ladanum, stercore Caprino, & pulvere nigro. Id autem tractando non mollescit, sed in pulverem abit, modo Ladani vetustate exsuccit. Viribus præterea & odore Ladani caret, quod sic vitiatum est.

Lasus omne antequam siccescat, adulteratur Sagapeno, aut Faba lomento: sed malef- cium deprehenditur colore, odore, sapore, dilu- tione, Diosc.

Lycium quibusdam Amurca, Succo Absin- thii, Felle Tauri: sed id à viribus sinceri mul- tum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit discernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum no- te à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili; quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alii semen Fœniculi aut Seseleos admi- scentes, Ligusticum dolo viciant.

S Lentiſci-

Lentiscina resina, id est, Mastliche, Turis & Resina Pineae nucis mistura.

Moschus pelliculis incisus, pulvere carnis Columbina siccata, sanguine Madino, & pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu, sit grauius, est legitimum; si prius pondus seruat, suppositicium.

Manna Arabum, Saccharo & Folliculis Senna.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua Myrrha maduerit, Dioscorid.

Nardus adulteratur Stimmi, seu Siibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderis causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, qua Hirculus ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minoribus foliis; radice nec amara nec odorata, uti vera Nardus est.

Opi omnes adulterantur addito Sagapeno, antequam inarescant, colore: odore, sapore dolus deprehenditur; & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata. Adulterantur etiam Furfure & Farina; precipue $\pi\alpha\upsilon\delta\iota\alpha\varsigma$, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior; $\rho\iota\zeta\iota\alpha\varsigma$ verò, id est, qui ex radice, perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quod effluit crassum & lentum, $\text{O}^{\prime}\pi\epsilon\varsigma$, id est, Liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine Lactuca agrestis.

Opopanax, Hammoniaco aut Cera: tunc in aqua,

aqua, si digitis teratur, non soluitur, nec lactescit
vbi sincerum. Diosc.

Os ex corde cerui cartilaginofum, simili ex
maiorum animalium [praesertim bouis] corde.

Opobalsamum tam variè adulterant & astu-
rè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fal-
lant. Hac verò adulteria inuulganda non cen-
seo, ne maligni etiam vitient à nobis edocli. Vi-
tiatur misto unguento terebinthino, lentisci-
no, cyprino, balanino, susino, metopio, melle,
vel Cypria cera liquida: sed maleficio facile
deprehenditur. Nam verus liquor in vestem la-
neam fusus, maculam non facit, & post lotio-
nem notam non relinquit, cum vitiatum inha-
reat. Adhuc merus, lac, si instillatur, congu-
lat, & in aqua aut lacte celerrimè liquatur, &
colore lactescit. Alias quasdam notas apud eun-
dem & Simeonem, si libet, legeris potius, quàm
apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro-
funda hominum ignorantia, & magno mor-
salium incommodo.

Piper longum fraudulenter preparatum, est
herba quadam flava, quæ à Xene affertur, aspe-
ctu quidem, non autem gustu, Macropiperi si-
milis: hec autem aqua irrigata soluitur; na-
tium Macropiper insolubile permanet, Gal.
lib. 1. Antidotorum. Piper longum verum ex
Barbaria affertur: adulteratum verò duplex
est; alterum, quod in Alexandria maximè con-
ficitur; alterum herba cuiusdam germen.
Quod falsicium est, si per diem totum in humo-

re maceretur, illicò liquatur ac soluitur, lib. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex massa subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit Piper, & in formas effictas coniecta, pòst siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamento Betula & Coryli.

Pastilli Theriaci, ex radice Pentaphylli, id est, Tormentilla, Venetiis malè componuntur, non ex Viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musc.

Phu, radice Rusci admista viuiatur: sed maleficium facile deprehenditur; quia hac dura est, frangi contumax, & sine vlla odoris gratia.

Pompholyx, taurino Glutine, ouillo vel Marino pulmone, aut Grossis, vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis; ob id non adulterantur.

Rha-Ponticum, radice Centaurii magni. Rhabarbarum examinatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minùs in crocum tingit, intùs nigricat, varietatem in fracturis amisit; densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus.

P'non cum viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia; tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt; deinde Rheum siccatum, tamquam

quam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam adstrictionem retinens. Quantum aliis notis Rheon à Rhabarbato differat, alibi diximus.

Sagapenum, succo Laseric & Galbano, Diosc. id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissolvitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adulterii, Diosc. à quovis pulvere misto: integra eligatur.

Syrax modis multis Dioscoridi adulteratur: sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis; Rubrum Bersilio inodoro; Flavum & Album ligno Cedrino odoratior, linguam calefaciente.

Scammonium lacte Tithymali & Sarcocolla, vel Eruiifarino, tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum, intus faculentum aut spuma succi Canna eius autum: tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbith, Gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar-Indi Prunis adulterati non splendent, humidiores sunt; sapore & nucleo Prunerum multum à semine Tamar-Indorum diverso.

Tui, Pini Resinâ, & Gummi. suffitum autem Gummi flammam non edit, Resina autem

in fumum vanescit; Turis statim ardet. Odore etiam maleficium proditur.

Turis cortex, Pini aut Nucis. Pinse cortice: horum tamen index ignis: nam reliqui cortices suffiti, quamquam incenduntur, sine odore fumant; Turis verò cortex ardet, & odorem fumum edit.

Turis mænna, adulteratur cribrata Pini Resina, aut polline aut cortice Turis confuso: sed hac igne deprehenduntur.

Hac abundè fuerint, ei præsertim qui veras simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio secundi docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac unicum; id si cognoveris, alia ei congeneria, aut etiam arte affinia, nullo negotio secreueris.

SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIPTO, QV D ACCIPIENDVM.

IAM tradamus Simplicis alicuius nomine scripto absolutè, & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam
pro

pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora
 deligimus: Quam in rem te iuuabit nostra Sim-
 plicium per locos communes descriptio. Qua
 enim radicibus solis sunt efficaces planta, illa-
 rum nomine radices veniunt: quae foliis flori-
 bus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore,
 succo, gummi, sunt utiles ac medicamen-
 tose magis, dum planta nomen effertur,
 partem eius usurpari solitam elige. Quum ve-
 ro pluribus sui partibus ad res etiam varias
 valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illa-
 rum facultate & affectus natura, & medica-
 menti constituendi forma: ut Ammi, Anisum,
 Apium, Carum, Cnicus, Cuminum, Gith, Liby-
 flicum, Nasturtium, Psyllium, Sefeli, Staphis-
 agria, semine sunt praestantiora; idque solum illa-
 rum nomine intelligendam: in aliis multis si-
 militer.

Anisum, Cretense, lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, [seu *Vitex*] id est, flos eius aut se-
 men, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, *Aloë Indica*, lib. 9.
Simplicium in *Diphryge*.

Alumen, scilicet scissile, quia praestantissimum,
 lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hydromelite, vel cereui-
 sia.

Aristolochia, pro repropoſita explicanda est:
 rotunda enim cum multum tenuare crassum hu-
 morem, tergere ulcera, digerere ex viro; longa

autem, cum miltiora hac volumus. Clematidis autem, quia fragrantior, in vnguentis expetitur.

Amomum, *Scythicum* lib. 8. comp. pharm. part.

Ammi, *Illyricum*, lib. 2. eiusdem; *Ægyptium* alii laudant.

Balsamum, *Opobalsamum* potiùs intelligendum, quàm *Carpobalsamum* aut *Xylobalsamum*, lib. 2. comp. pharm. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm nigra.

Buglossum utrumq;, foliis & flore efficacius; radice tamen non inutile.

Cassia vel *Cassia* in libris Græcorum. *Cassia* *Syrinx* optima, & *Cinnamomo* viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem *Lingua* dicitur: altera verò, *Fistula* his dicta, ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radice.

Centaurium, *Minus*, in purgantibus medicamentis; in ceteris *Maius*, dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quàm domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valde acer solùm nominetur; dulcem tamen nescio quem Arabes inuenerunt.

Cypressus, id est, nuces eius, in adstringentibus medicamentis: lignum aut folia, in diureticis.

Cinna-

Cinnamomum, optimum; de quo in simpli-
eibus abunde.

Corallium, rubrum.

Cuminum, *Æthiopicum*, lib. 4. sanit.
tuend.

Daucus, agrestis; nam satius *Pastinaca*
est, alimentum verius, quàm medicamen-
tum.

Elleborus, niger *Mesua*, quia salubrior:
albus *Galeno Aph. 1. lib. 5.* Obserua igitur an
compositio sit *Arabica* aut *Græca*. *Elleborus*
uterque & *Helenium* ex locis editis præstant.

Eruca, silvestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, *Atticum*, melancholiam ex
ventriculo purgat: id in *Græcis* compositionibus
usurpandum; in *Arabicis* *Arabicum*.

Foeniculus, semen; sed in collyriis succus fo-
liorum aut radicum.

Galla, solida efficacior, quàm perforata.

Gummi, *Arabicum*; id enim omnium perfe-
ctissimum, vel *Plinio* auctore.

Gluten, *Mastiche*, ceteris *Glutinis* efficacia,
ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelli-
tur: aliis *Ichthyocolla*: aliis *Taurocolla* magis
placet *Glutinis* nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut
Calaminthe montana efficacior domestica.
Hyssopus Colicium *Diosc.* *Creticum* verò *Ar-*
chigenes, apud *Galen.* lib. 8. comp. pharmac.
part.

Hyoscyamus, albus, seu album. eius semen:

S. S. quod

quod tamen interdum exprimitur, frequentius
tacetur.

Iris, radix *Ireos* *Illyrice* veteribus, nunc
pharmacopolarum *ignavia* *Florentina* usurpa-
tur, cum illa per *Venetos* facile haberi queat.

Lupinus, amarus: nam dulcis esculentus est;
vtille, amaritudine per macerationem in aqua
deposita.

Lactuca, semen; praterquam in victus ratio-
ne, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, *Oxylapathum* efficacius rotun-
do.

Lithargyros, *Auri*; tamen *Lithargyros*
Chrystis aliquoties in lib. comp. pharm. Gal.
legitur.

Mastiche, *Chia*, lib. 7. meth. & alibi passim.
Ægyptiam tamen ac recentem, ob id pinguis-
simam laudat lib. 2. ad *Glaucon*.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum: alterum, æromeli seu mel æ-
rium & roscidum.

Margarita, solide meliores perforatæ; nisi
etiam sint flava, obscura, solidis pares.

Medulla, si non additur cuius animalis, &
valens futurum est medicamentum, ceruina
miscenda, valentior quam vitulina, lib. 6.
comp. phar. par.

Nuclei, pini, oliua; dactyli autem *Auicenna*.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Opium, *Thebaicum*, *Galenus* lib. 7. simpl. &
post eum omnes.

Petro-

QVID ACCIPIENDVM. 479

Petrofelinum, Macedonicum, & in hoc
Astreoticum, & huius semen maximè in usu
est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna, si alius deicienda est, Damascena
& Hispana seu Iberica, hodie Augustana &
Cathalaunica Italis dicta, sunt multò prestat-
tiora, vel si qua his similiter sunt pinguis,
dulcia. Si ad cohibendum & astringendum fit
medicamentum, Damascena immatura, vel
potius que Iorana nobis dicuntur, S. Iuliani &
Tyronica.

Papauer album, semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam ma-
gis purgit, quàm nigrum, à quo per adustio-
nem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed al-
bum id maturum intellige. Nam album ex
Macropipere in racemum granatim dehiscente,
recens factum, minùs acre, & Macropiperi fa-
cultate proximum, quale apud Serapionem est
accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus:
sicca, in siccatibus unguentis epuloticis & gla-
tinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Paonia, mas, seu eius radix vel semen: Ma-
nardus etatis nostrae medicus longè doctissimus
in Epistolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur:
mirale, & à saxo pretulerim cum Narbonen-
sibus quibusdam, quod frequentissimum, &
pro quercino omnes venditant, nisi si quando
adstrictione opus est: qua ratione hederam quo-

420 SIMPL. ABSOL. SCRIPT.
que quercinam nonnullis expeti audio.

Quatuor } Malua
 } Alihaa
 } Viola nigra
 } Acanthus, id est, Branca ursina.
 } Maiora: Melonũ, Cu-
 } cumeris, Cucurbita,
 } Citrulli.
 } Minora: Lactuca, Portu-
 } laca, Inthubi, Cichorii.
Quatuor } Frigida
semina }
 } Maiora: Cumini, Car-
 } ui, Anisi, Foeniculi.
 } Calida }
 } Minora: Apii, Dauci,
 } Ameos, Amomi.

Quinque radices uretica: Apii, Petroselini,
Asparagi, Graminis, Rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit Len-
tiscina, id est, Mastiche: inter alias verò præ-
fertur Terebinthina, quia melior quàm Colo-
phonia, & Fricta dicta; aut illius loco ponitur
Laricea dicta, Terebinthine propè similis, Gal. 1.
Comp. phar. gen. Recentioribus verò Pinea in-
telligitur.

Ruta, folia Ruta agrestis: Græcis verò fo-
lia Ruta domestica. Illam verò & illius semen,
Moly, vel Hesanum, vel Hesasa, vel cum Sy-
ris, apud quos nascitur, Hermola ferè vo-
cant.

Rosa, rubra; recens in purgantibus; sicca in
astringentibus.

Raphanus, silvestris.

Rosma-

Rosmarinus, folia ; interdum flos , quem nescio cur hodie vulgus $\text{A}^{\text{v}}\text{d}\text{G}$, id est, Florem absolutè appellat.

Rhus, cortex fructus Sumach dicti.

Stœchas, Stœchados Arabica flos.

Styrax, Calamite : nam liquidus vulgò dictus est Myrrha Stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica Nardi, Indica.

Sulfur, $\text{S}^{\text{u}}\text{p}^{\text{e}}\text{r}$, id est, ignem non expertum, seu viuum, est nobilissimum : ad quadam extinctum, ceu nobis familiaribus, preferitur.

$\text{S}^{\text{p}}\text{in}\text{G}$, id est, Iuncus : pro Schoenu anthos.

Tres flores cordiales : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Violarum} \\ \text{Buglossi} \\ \text{Boraginis.} \end{array} \right.$

Thymum, Atticum, aut ex editis locis G sitis, lib. 4 sanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia G quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat, G eadem recens, si haberi potest : nam sicca in efficax.

Zizipha, id est, Iuiube, recentia G bene matura ; aut saltem integra, non putria aut vetustate exsucca : quod illis post sextum mensem ferè accidit.

Siquæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus, Ponticus, Andromacho iuniori in Theriaca.

422 SIMP. ABS. SCR. QUID ACCIP.

Myfi, Cyprium.

Nitrum, Berenicium.

Sinon, Syriacus.

Cuminum, Hispanum, alibi: Æthiopicum,
melius Ægyptio.

Anisum & Thymum, & alia plurima, Cre-
tica, lib. 4. senis. tuend. in diatrion piper. &
diacalaminth.

Meon, Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia, Pontica, & hac melior Cre-
tica, lib. 10. comp. phar. part.

Phu, Ponticum.

Castorium, Ponticum.

Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ce-
teri solo semine.

In Dicearchia, qua nunc vocatur Putcoli,
Ærugo, Cerussa, Æs, Squama Æris, & alia
nonnulla. Roma argenti spuma fit optima. Ex
Sicilia item, magna Libya, & Creta quotannis
multa præstantissima Romam afferebantur,
Hucusque Siluius.

DIA.

DIARIVM
PHARMACORVM
PARANDORVM,
ET SIMPLICIVM
LEGENDORVM,

A

MATTHIA LOBELIO collectum.

IN vniversum annum optimè instructurus officinam Myropola, per dies & menses operariis, famulis & officina catulis iniungit quæ facienda sunt; quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidem aliqua si concinnari possent, tamen non debent, quia omnia simplicia suo tempore, & in summo virium vigore (ut scitè Diosc. & Gal. docuere) colligenda, recondenda, preparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quouis anni cardine, solo & celo, vel minori sumptu preparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab iis qui opera locârunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officinâ; ut vitiosa, cariola, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur;

tur;

tur ; vt & quæ desiderantur, inueniantur,
& absumpta restituantur.

FEBRUARIO.

QVÆCVMQVE imperata sunt mense
Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti
mense. Et circa finem in regionibus cali-
dis, in quibus omnia præcocia sunt, col-
lige Violas ad syrapi præparationem, Con-
seruationem siue Conditum, ad Oleum,
& ad pulueres cordiales siccatas seruan-
das; quas & tardiùs colligere potes, vt sic-
ciores sint, & calor maior adfit ad siccan-
das eas.

Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI
TEMPVS.

Circa finem Februarii initio Martii, &
primo Vere collige radices in varios vsus,
priusquam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides, omnes in-
cipiente foliorum defluuio esse legendas,
& cælo sereno: cui in quibusdam Galenus,
Auicenna & Mesues consentiunt; in aliis
diuersa sentiunt.

MARTIO.

RADICES quouis anni tempore col-
ligi

ligi possunt, quæ hominum cultu & sa-
cione crebra in omnem anni partem vege-
tæ incidunt: quales ferè sunt hortenses
alimentosa. vt,

Apii vulgaris
Buglossi vtriusque
Betæ
Lactucæ
Intubi
Oxalidis
Raphani
Napi
Pastinacæ
Sisari
Cepæ
Porri
Allii.

Et præter has erraticæ,

{	Dauci
	Gingidii
	Caucalidis
{	Asari
	Dracunculi
	Cyclaminis
	Periclymeni
{	Cotyledonis.

Nam hæ quin-
que, vt bulbosæ
quædam alię, etiã

æstate, siccatis foliis, plenæ sunt, & fre-
quenter Autumno regerminant, alimenti
pingui & crassi copia.

Siluius. Quæ verò solius nature sponte
crescunt, aut semel à nobis tempestiuè
seruntur aut plantantur, ferè sunt opti-
mæ, solo aut Vere, aut (vt dixi) Autumno,
paucissimæ Æstate aut Hieme. Quin &
hæ quas multis anni partibus communes
diximus, sunt præstantiores, cum tempe-
stiuè satè adoleuerunt & vigent: aliis verò
temporibus ignauiores; quando vi qua-
dam & holitoris operâ & irrigatione co-
guntur adolescere sub cælo sibi parum
propi-

propitio; quale aestivum est ac autumnale
& hiemale. Sic Vere ipso, quando pri-
mum germinare incipiunt, nobis legun-
tur in annum:

Enula	Hyoſcyamus
Althæa	Angelica vtraque
Iris	Anonis
Acorus	Aſarum
Symphytum	Aſclepias
Rufcus	Biſtorta
Aſparagus	Betonica
Petroſelinum	Bugloſſum
Apium paluſtre	Carlina
Fœniculum	Caryophyllata
Bryonia	Centaurium maius
Agrimonia	Chelidonium vtrū-
Meum	que
Phu	Coryledon
Cyperus	Cynogloſſum
Rubia, quæ potiùs	Dictamnus albus
Autumno	Elleborus niger
Saxifraga	Eſula maior
Eryngium	Farfara
Tormentilla	Filipendula
Pentaphyllon	Filix
Pæonia vtraque	Filix florida
Polypodium	Gentiana
Gramen	Iarus
Lilium	Aron
Alni nigrae radicis	Imperatoria
cortex	Lepidium

Man-

Mandragoras	Pityusa
Narcissus	Cortex rad. Populi
Nymphæa	Sigillum Mariæ
Radi x caua	Orchides
Capnos Plin.	Raphanus syluestris
Rubus	& rusticanus
Scrophularia	Muscus arborum
Petasites	Cort. rad. Sambuci
Petrosel Macedon.	Radices Ebuli.
Peucedanum	Cortex rad. Fraxini
Pimpinella	Correx rad. Lauri.
Pistulochia	Cortices arborum.

HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad
 Syrupum
 Conferuam } in regione temperata.
 Oleum
 & cordiales confectiones.
 Keyri.

Aquæ distillantur ex Violis & herbis hie-
 me vegetis, vt Aqua

Vmbilici Veneris

Mandragoræ

Semperuiui

Capillorum Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.

In regionibus calidis Syrupi ex herbis re-
 centibus parari possunt, vt:

Capillorū Veneris simplex & compositus
 Grana

Grana hederæ arboreæ
Oculi Populi.

A P R I L I.

Quæcumque omnia Martio mēse, initio
Aprilis parari & colligi possunt.

Keyri Primula Veris

Narcissi flores ad oleum

Cochlearia Orchides Salvia vita.

M A I O.

Quæ prætermiſſa sunt mense Aprili,
fiant initio Maii.

Distillentur herbæ quæ ad statum per-
uenerunt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, &
semen edunt illo mense, conseruantur ad
Theriacam vel aliam compositionem. Re-
ponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur

Abſinthii coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium

Daphnoides

Cichorium

Fumaria

Genistæ flores

Lactuca syl.

Seri-

Serides	Phyllitis
Lens palustris	Borago
Leucoia	Buglossum
Lichen	Bursę pastoris succus
Mezereon	Limonium Germanicum, seu Pyrola
Napi semen	Ophioglossum
Plantago	Pulmonaria vtraque
Lupulus	Rosę
Tamariscus	Rosmarini flores
Thlaspi semen	Flores Sambuci.
Vinca Peruinca	
Bugulę	
Asplenium	

IVNIO, & initio IVLII.

Abrotonum	Cassia
Agrimonia	Centaurium minus
Alchimilla	Chamędrys
Altercum, siue	Chamępitys
Hyoscyamus	Rosę in regionibus temperatis
Althęę flores & folia	Syrupi Ros. confectio
Anethum	oleum, vnguentum, succus
Anthemis vtraque	Betonica
Artemisia	Brassica marina
Asari folia	Botrys
Ballotę	Branca vrsina
Calamintha mōrtana	Cari semen
Calendulę stillaticia	Coriandrum
Carduus benedictus	

Epi-

Epithymum &	Papauer Rhœas
Epithymbra	Parietaria
Equisetum	Parthenii siue Co-
Euphrasia	rulę flores
Galega	Periclymeni flores,
Genistę semen	& fructus, & folia.
Gratiola	Petroselini Mace-
Hypericum	donici semen
Hyssopum	Phlomos
Iacobæa	Pilosella
Labrum Veneris	Polium
Laurus	Polygoni aqua &
Lyfimachia lutea	succus
Maiorana	Portulacę succus &
Marrubium	stillaticia
Marum	Ros solis
Matricaria	Ruta vtraque
Melissophyllum	Sabina
Mentha	Salvia
Menthastrum	Sanicula
Mercurialis suc.	Satureia
Millegrana	Serpyllum
Nepita	Scordium
Numularia	Verbena
Opium	Veronica.
Origanum	

I V L I O.

In regionibus temperatis, quę præter-
missa sunt Iunio, facienda.

Quæ-

Quæcumque Solis feruorem requirunt, paranda, vt Theriaca, quæ in calidioribus regionibus parari solet Iunio mense, vbi omnia sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschata, quia mollescent Ladanum & Styrax, si soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit aut prætermiserit, licebit aquam Rosaceam addere calidè ; & vi caloris liquefiant, (sicuti balneo,) quod melius est, quia illa longa insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturefcent, insolatio & fermentatio Theriaces potest iuuari, & accelerari in balneo vel hypocaufto.

Colligenda in regionibus calidis:

Absointhium	Sem. Sefeli
Abrotonum	Massiliensis
Ageraton	Sem. Lithospermatis
Coriandrum	Lupinus
Dauci Cretici semen	Sem. Maluæ
Sem. Petroselini	Flores Meliloti
Hydropiper	Sem. Anethi
Pulegium	Morus
utrumque	Orobus
Lauendulæ flores	Capita & Sem. Papaueris vtriusque
Ligustici semen	Psyl-

432 DIARIUM PHARM. PARAND.

Psyllium

Sophiæ semen

Ribes

Tanacetum.

AUGUSTO.

Quæcumque neglecta aut omissa sunt
præcedente mense, fiant Augusto.

Colligenda:

Althææ semen

Fraxini semen

Sem. Cataputiæ

Milium

Cnici semen

Flos Nymphææ

Cornus

Petum. Mel Peti

Cynosbatos fructus

Omphacium

Dauci vulgaris se-
men

Prunus syl.

Sem. Sambuci &

Cucumis Elaterii

Ebuli

Rhamni Cathartici
sem.

Momordica

Scordium

Polium

Seseli Æthiopici se-
men

Ricinus

Sem. Hyoscyami.

Spica Lauendulæ

Tribulus aquaticus

SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antispodium è Myrto & Cydonio

Cortices Castanearum

Cotonea mala Halicacabum Mespilus

Rhamni cathartici semen

Radices nonnullæ omissæ Vere nouo. vt,

Iridum Pæoniæ Acori.

NOVEM-

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac Decembri, eadem erit ratio, si modò in eis cõtigerit eiusmodi cæli temperies, vt radices adhuc validæ nullâ vel frigoris vel niuis tempestate concutiantur. nam sepe iisdem mēsis contigit, vt sine ullâ cæli iniuriâ Pharmacopœis quod reliquum est radicum in hortis remanentium, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

Sequuntur & nonnulla purgantia medicamenta M. Lobelii.

ALIQUOT
MEDICAMENTA
COMPOSITA
HABERE IN PROMPTU
OPERÆ PRETIUM.

DOLUM esse, si quis Compositis utatur. Villanouanus dixit, ubi in promptu habentur Simplicia: Variis tamen de causis nonnulla Composita pharmaca non minùs utilia quàm necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumque precipites implicati morbi, eorundemq; sauiissima symptomata ad eò urgent,

gent; ut noua medicamenta, Magistralia vocata, repente per otium concinnare non liceat. Secunda, & alia, quia multa comprobata, & vsu & ratione recepta compositiones fermentatione egent; unde noua & optata exoritur facultas; quandoquidem simplicia quouis loco, celo, & solo, ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore maximè vigent, in annum usum ex his composita nonnulla medicamenta preparari, permisceri & asseruari opera pretium est, ut Theriaces compositio, Mithridatica, Philonis antidotus, & huiusmodi. His rationibus ductus, quia medicamento purgante indies utendum, aliquot tuta eaq; pauca pharmaca composita, blando nulloq; labore euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis elegimus; quibus diu felicissimè vsi sumus, & ex duabus tribusve compositionibus unam fecimus, ne mole & copia compositionum obruamur; quæ diu in officinis asseruari solita, sape putrent, non sine Pharmacopœorum & agrotantium dispendio.

CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ÆTATI VTILE;
ori, ventriculo & visceribus gratum; febribus & affectibus biliosis aptum. Respondet Electuario Rosato, & Electuario è Prunis solutiuo, & Electuario è Psyllio.

R. Succi Rosarum rub. ℥ xv.
Sacchari albi ℥ xxx. [xxxvj. al.]

Mel-

Mellis candidi despumati \mathfrak{z} vj.

Prunorum \mathfrak{z} xx. quæ exhibent pulpæ
solidiusculæ \mathfrak{z} xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum \mathfrak{z} xij.
quarum pulpa solidiuscula est vncia-
rum vj. Pruna & Passulæ coquantur se-
paratim ad mollitiem ex decocto se-
quenti, & per setaceum cernantur:

R. Cichorei totius
Boraginis Acetosæ
Polytrichi, vel Adianthi } ana m. iij.
Endiuia

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ \mathfrak{z} j. β .

Florum Violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi \mathfrak{z} iij.

Fiat omniū decoctio in s. q. aquæ ad l' iij.

In cuius colatura coque in vase occluso

Pruna & Passulas. In residuo infunde, co-
que leniter

Seminis Psyllii

Quatuor seminum frig. maiorū } ana \mathfrak{z} β .

Sem. Lactucæ

Oxalidis

& Portulacæ contusorum

Dissolue G. Tragacanthi \mathfrak{z} j. β .

Saccharum, Mel, & Succus Rosarum co-
quantur ad Electuarii solidiusculi con-
sistētiam: deinde pulpæ & emulctiones
seminum addantur, iterumque coquan-

T 2 tur

tur lento admodum igni: tum demum
insperge puluerum

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorum rub. ℥ j. β.

Santal. alborum ℥ vj.

Caryophyllorum

Surculorū vel foliorū Lentiscai } ana ℥ j. β.

vel Caryophyllorum ℥ ij. 3 j. [*in pen-
nuria foliorum Lentiscai*]

Macis 3 iiij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij.
huius Electuarii, Scammonii optimi ℥ j.
cocti in ℥ j. β. Succo Rosarum lento igne
vel cineribus calidis, quemadmodum co-
quitur à Mesue in suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v.
Dosis à 3 iiij. ad 3 iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, vtere minori
dosi. medicamenta enim validiora minori
dosi assumpta, debilia sunt.

Hec & quamplurima huiusmodi purgā-
tia, in Chylismata redigere operę pretium.

EXTRACTVM MELANAGOGVM,
SANGVINEM DEFECANS, ET
*Serosa excrementa euacuans, omnibus cutis &
cuticula vitiiis, lepra & elephantiasi conue-
niens, siue à bile, siue à pituita salsa: Splenet-
icum & Hepaticum medicamentum efficax.*

℞. Succorum Rosarū rub. defecatorum ℥ ij.
Suc.

Suc. Fumariæ
 Lupulorum
 Boraginis
 Pomorum dulcium } ana l j.
 Mercurialis
 Endiuie vel Cichorei }

Vini albi

Quibus decoque sequentia in balneo
 operculo occluso.

℞. Polypodii recentis, & adhuc viridis ē
 Quercu vel Fraxino ℥ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ℥ ix.

Summitatum & florum Thymi,
 Cassithæ } ana ℥ vj.
 & Absinthii }

Radicū Lapathii acuti virentiū

Helenii Ebuli, vel
 Corticis radicum Sambuci } ana ℥ j. β.
 Corticis rad. Fraxini
 & Populi nigri }

Capillorū Veneris vel Polytrichi } ana m.
 Asplenii Chamædryos } j. β.
 Chamæpityos }

Florum Chamæmeli Romani

& Cotulæ foetidæ siue Parthenii ana m. j.

Seminis Cnici ℥ iij.

Seminis Anisi
 Fœniculi } ana ℥ vj.
 Carui }

Contusis infusis, decoctis, expressis &
 transcolatis infunde

T 3

Ag-

Agarici candidissimi & leuissimi

Hermodactylorum, &

Pulpæ Colocynthidis ana \mathfrak{z} j.

Omnium Myrobalanorum ana \mathfrak{z} ij.

Zingiberis Cinnamomi

Schoenanthi Macis

Galangæ Garyophyllorum } ana \mathfrak{z} j.

Iterum expressis & defæcatis percoquantur lento admodum igni, cum mellis candidi P. tribus, ad mellis vel Electarii liquidi crassitudinem. Addendo singulis P. Scammonii præparati vel cocti in succo Rosarum, vt antè diximus, \mathfrak{z} β . pul. Gum. mi Arabici \mathfrak{z} j. Dosis à \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} iiij. & vj.

Extremis morbis adiiciuntur vniuersæ compositioni

Hellebori albi

& nigri ana \mathfrak{z} β .

Fiat Chylariū. Dosis à drachma j. ad duas.

CATHARTICVM

HYDRAGOGVM.

R. Radicum Graminis \mathfrak{z} vj.

Rad. Asari \mathfrak{z} j.

Granorum Hederæ arboreæ \mathfrak{z} iiij.

Garyophyllorum Galangæ tenuis

& Cinnamomi ana \mathfrak{z} ij.

Coquantur ex arte, vt dixi modò, in f. q. aquæ mulsæ, & P. j. vini albi, ad P. j.

Colaturæ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ

Brassicæ marinæ ana ℥. β.

Succorū Chamelæe & densatorū, vt docui-
& Thymelæe } mus capite de Cha-
mælæa, ana ℥ iij.

Vel eorundem vice in regionibus frigi-
dis, quæ carent vel non abundant
Chamælæa & Thymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ℥ j.

Percoquantur igni lento cum Sacchari
℥. j. Ab igne vbi abstuleris, adde pulueris
Radici Mechioacæ ℥ j. β.

Tartari albi & Spec. Aromatici Rosati
ana ℥. β.

Macis ℥ ij.

Olei stillatitii Cinnamomi, Caryoph. &
Anisi ana ℥. β.

Datur ex aqua Graminis & mulsa à ℥
iij. ad ℥ iij. cum pari quantitate Mela-
nogogi, & Asari decocto.

DIACNICVM CVM CITRO,

SOLVTIVVM, PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis,
vt si quod aliud, vtilissimum. Respondet
Diacarthamo & Electuario à Citro solutino
Monspelienfium.

Hæc Compositio à Cnico siue Carthamo
nomen accepit, tamquam precipuo agente: me-
ritò igitur ℥ iij. Medullæ seminis Cnic.
cum Ronselutio legendum, pro ℥ iij. (vt de-

prauatè habent omnia exemplaria) censemus.
Ad hæc Cnici semen omnium viscerum obstru-
ctiões reserat; colluuiem propellit, & pitui-
zam purgat egregiè.

Recipit autem Medullæ feminis Cnici
 ℥ iiij. vel eius loco sume feminis Cnici
 boni & pleni ℥ xij. ʒ vj. ʒ ij.
 (ex ʒ j. autem feminis habebis ʒ vj. me-
 dullæ)

Contundantur, & fiat emulctio ex aqua
 mulsa, vel iure gallinacei, vt docet Diosc.
 Conser. Corticis Citri melle conditi [ad
 deterfionem pituitæ] ℥ j. β.

Conser. Violarum &

Florum Boraginis ana ʒ x.
 Carnis Dactylorum vino albo macerato-
 rum ʒ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frigidi
 ℥ j. β.

Turbith ʒ j. ʒ vj.

Diagridii vel Scammonii ʒ j.

Zingiberis albi ʒ ij.

Hermodaetylorum ʒ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Fœniculi Cochlearia tria

Mellis optimi despumati ʒ xij.

Sacchari albi ʒ xx.

Dissoluatur in ʒ j. β. Succu Cydoniorum
 & s. q. aquæ mulsæ.

Terenda terantur & permisceantur.

ANTI-

ANTIDOTI DIAPHOENICI

Mesua, emendata descriptio.

℞. Dactylorum Cheyron, id est, è Chayro oppido, non Cirrhen siue fuluorum, ut malè ex Græco vertit Ruellius, nonnullas officinas secutus, ℥ xij. & β.

Macerentur vino albo [Rondelet.] loco tepido ad mollitiem, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearum (non Penidiorum) aqua hordei mundatarum & infusarum ℥ v.

Turbith optimi ℥ iiij. 3 iiij.

Amygdalarū dulcium purgatarū ℥ iiij. 3 vj.

Scammonii ℥ j.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum

Anisi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius loco Cari semen aromaticum.

} ana 3 ij. β.

Probè trita omnia excipiantur libris tribus Mellis despumati ex infusione vini Dactylorum & aqua Hordei, in qua post lotionem Pinei & Amygdala macerata sunt.

Tota compositio est ferè lib. v. & ℥ xj.
Dosis ab ℥ β. ad 3 vj.

T s

Mæc

Hæc compositio ad euacuandos crasso-
humores facta est.

ELECTARIUM INDVM.

Dissuadet preparationem Electarii Indi-
di noster Rondelletius; quia non multum
differt à Diaphœnico. Adstringentia &
attenuantia Electuario Indo addiderunt,
quæ deteriore potius compositionem fe-
cerunt, & deprauârunt, vt exploranti fa-
cilè patebit.

LENITIVA È CASSIA
medicamenta.

E Cassiæ Ægyptiæ siliquis à diuersis au-
toribus multa & varia medicamenta leni-
tina descripta, minimè paranda aut dis-
pensanda censentur, quia vel acescunt vel
exiccantur, & eorum laxandi vis deper-
ditur.

FLOS CASSIÆ,
seu Cassia extracta.

E Cassiæ recentis & prægnantis fistula-
ribus siliquis pulpa elicitor, quam Florem
Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed
cùm Cassiæ Siliquæ siue fistularis recens
pulpa meliùs asseruetur in sua theca, quàm
excreta; quid extractione ante vsum opus
est? Triplex Cassia extracta in officinis
pro-

proftare folet: Caffia extracta fine Sena &
cum Sena; Caffia extracta cum Manna;
Caffia cum Saccharo & cum Melle, pro
clyfteribus & pauperibus. Si præfcribatur
à medicis, paretur hoc fequenti modo,

CASSIA extracta communis
Nicolai.

℞. Florum Violarum

Violariæ fiue foliorum Violarum,

Maluæ,

Mercurialis, Betæ

Parietariæ ana M. j.

Absinthii Pontici fiue vulgaris M. f.

Herbæ iſtæ virides coquantur artificioſè
in f. q. aquæ; è cuius colato abluè fili-
quas Caffiæ; & diluè in eius portiu-
cula pulpæ Caffiæ ℞ j. Mellis ex reliqua
colati parte deſpumati ℞ β. percoquan-
tur lento igne ad electarii formam.

DIACASSIA cum MANNA non mul-
tum differt à Diacatholico, niſi Senâ,
Rhabarbaro & Polypodio.

DIACATHOLICON Nicolai,
vel potiùs è Dia-catholico
Liquamentum.

Huius vniuerſalis medicamenti varia
eſt deſcriptio. Exemplaria vulgata habent

pro pulpæ Cassiæ Thamar-Indorum ana
 ℥ duabus Sacchari ℥ ij. id est ℥ xxiiij. An-
 dernachus autem pro ℥ ij. Sacchari perpe-
 ram addit Cassiæ & Thamar-Indorum &
 Senæ mundatæ ana ℥ viij. Rondelletius
 verò ℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Ca-
 tholicon lene siue mite in suauissimam &
 lenissimam, cum Cassiæ operatione maxi-
 mē conuenientem compositionem, rede-
 gimus: quam è Diacatholico Liquamen-
 tum siue Extractum diximus; neglecto
 Diacatholico maiore Fernelii, quod reci-
 pit Turbith & Diagredium, ab his beni-
 gnis medicamentis & intentione Nico-
 lai multum aliena. Paretur ergo in hunc
 modum:

℞. Radicum Filiculæ siue * Polypodii re-
 centium, fol. Senæ mundatorum ana
 ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis Fœniculi ℥ j.

Foliorum Violarum M iiij.

Florum Violarum M j. β.

Quatuor seminum frigidorum maiorum
 ana ℥ j.

Contusa omnia, demptâ Senâ, & semi-
 nibus frigidis, floribusque Violarum, 24.
 horas vel biduo aque pluuiæ ℥ v. vel q. f.
 madefacta, decoquuntur leuiter ex arte in
 balneo Mariæ; mox paulo antequam ab
 igne

igne deponantur, Senam adiiciunt, cum feminibus frigidis & floribus Violarum; maceranturque calidè aliquot horas in balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo excolantur, & leniter exprimuntur, ne Polypodii & Senæ vis adstrictoria eliciatur. Colatum iterum decoquitur, dum mellis crassitudo fiat, adiectis Sacchari boni subrubri, perdulcis, vel albi pinguis ℞iij. Postea ab igne remotis adde Floris Cassiæ, vapore decocti præscripti extractæ, & Thamar-Indorum ana ℥vj. Sacchari candi & Penidiarum ana ℥j. β. Succi vel Infusi Ros. ℥iiij. Æstate addi poterit decocto libra vna succi Mercurialis defæcati & purificati, & pro diuitibus in singulas ℥scrupulus vel ℥β. Rhabarbari selectissimi
 * Polypodii magma [*secundum Rondeletii*] aut crassamentum, quia copiosos flatus gignit, ventrem lædit, eumque magis obstruit quàm reserat, leuiter Polypodium decoquendum iussimus, vt efficacius suas vires, easque suauiores, exferat. Decoctionem enim mediocrem sustinet, quemadmodum Sena & Turbith, vt monuimus in nostris Stirpium Observationibus Latinis. Pondus eius etiam adauxi, quia vili emitur, pauperum commodo; longèque maiori pondere in decoctis, vt Sena, & alia permulta, quàm in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittunt Saccharum Penidia-
rum; leui incommodo, quia Penidia pa-
rantur ex Saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenitiuum conuenit cum Diaca-
tholico & Diacassia; quare eo carere possu-
mus. Hac de Electariis lenioribus suffi-
ciant, pluribus humoribus, exustis potis-
simùm, expurgandis idoneis.

DIA-SEBESTEN.

Dia-Sebesten Montagnanæ bilem re-
nuem euacuat. In Italia & regionibus cali-
dis magis vsitatum quàm in hisce frigi-
dis tractibus, vbi rarò dispensatur, quem-
admodum Elect. è Psyllio Mesuæ, quo
etiam carere possumus. Recipit copiosè
Scammonium cum trochis. è Spodio vel
Antispodio, ex Oxyacantha, trochis. Dia-
rhodon, quò Scammonii vires remissiores
sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur.
Pro hisce inusitatis Electariis medicus
doctus facilè Cholagogum Rosatum de-
cocto conuenienti siue è Myxariis siue è
Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupa-
torio, Rhabbarbo & huiusmodi, pro ra-
tione & natura morborum, diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Ni-
colai, fortissimum est cholagogum, & mi-
nùs castigatum aut emendatum.

Antido-

Antidotus sine CONFECTIO HAMECH,
apud Mesuem.

Ex veterum Antidotis retinent hanc confectionem neoterici, ob insignes vires ad omnes morbos ex pituita salsa, flava bile, adustisque humoribus ortos, & prauos eorum ichores; scabiem, impetiginem, elephantiasim, luem Veneream, & quævis cutis & cuticulæ vitia. Improbandi tamen sunt qui hac compositione vtuntur in pituita crassa euacuanda, ob Myrobalanos, quæ magis impingunt materiã lentam, ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia hæc compositio (vt scitè monet Rondel- letius,) sine arte composita videtur, & contra theoremata à Galeno, Mesueo & aliis tradita: (nam infunduntur diutiùs & coquantur maximè inæqualia, vt Poly- podium, Myrobalani, Agaricus, Colo- cynthis, Rhabarbarum &c.) lubuit eius parandi rationem explicare. Quid enim opus quinque diebus in macerando Poly- podio ex sero lactis: cum nostra ætas ipsum Guaiacum, lignum durissimum, eiusque cortices, & huiuscemodi 24. horis aqua tantum feliciter maceret. Serum autem diutiùs asseruatum facilè acescit, fitum ducit, & putret. Octo vel 10. horarum Rhabarbari infusum (præterquam in alui fluori-

fluoribus, ventriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubricitatibus & læuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem, & ipsum Rhabarbarum in tota substantia) commendatur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmacis, ediscantque rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ʒ iiij.
Cepularum Indarum

Rhabarbari

Epithymi ana ʒ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodii querni ana ʒ xvij.

Absinthii Thymi

Senæ ana ʒ j.

Violarum ʒ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ʒ vj.

Succi Fumarię Mercurialis ana ʒ x.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarū ʒ vj.

Polypodium leuiter contusum, c m. Passulis, Absinthio, Prunis, Fœniculo & Aniso

24. horas madefactum ex feri lactis asini vel caprini q. s. in vase oris angusti obturato, feruefac aliquot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthidis

his contusa & forficibus incisa, cum Ag-
 rico, nodulo laxo excepta: Thymum, Epi-
 thymum, Myrobalani, Sena, Violæ, Rosæ
 & Rhabarbarum macerentur 12. horas, &
 vnica feruefactione parumper decoquan-
 tur, addito Succo defæcato Fumariæ, quia
 paucam aut ferè nullam sustinent deco-
 ctionem. Cola leniter exprimendo. In co-
 lati portiuncula dissolue Mannæ ℥ ij. &
 coletur. Coque igne tantillo colati reli-
 quam portionem, addita sesquilibra Sac-
 chari boni, vsque dum mellis crassitudi-
 nem habeat. mox vbi refrixit, tepenti ad-
 huc syrupo misce Cassiam, Thamar Indos,
 Mannam & Scammonii præparati ℥ j. β.
 paulatim inspergendo puluerem hunc:

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabarbari

Seminis Fumariæ ana ℥ iij.

Seminis Anisi Spicæ Nardi ana ℥ ij.

TRYPHERARVM differentie.

Trypherarum variæ sunt descriptiones.
 Quæ Galeno adscribitur apud Mesuem,
 recipit multa quibus Galenus nunquam
 vsus est, vt sunt Moschum, Ambar, Caryo-
 phylli,

phylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum Opio parabatur, & sine Opio: sed cum Opium auferatur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras: cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quam Opium.

Est & alia Tryphera minor, ad differentiam maioris, ex arte Phenonis. Item Tryphera Moschata Mesuæ &

Saracenica duplex { Mesuæ, &
Nicolai.

TRYPHERA Persica.

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta, & à medicis Rhodomagenis & Rondelletio comprobatur in refrigerando ventre, eodemque relaxato confirmando & roborando, omnesque humores ferè euacuando cum astrictione, & refrigeratione, sine vlla ventris lésione, retinuimus; delicatis & imbecillis tutiorem futuram quam Antidotus Hamech; ob Diagredium & Colocynthida: quamuis validiora medicamenta mitescant cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic enim paratur.

R. Succorum Solani

Endiuia satiuæ

Apii defæcatorum ana l ij. aut q. s.

Succi Lupulorum P j.

Pra.

runorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium & Rosarum recentium ana ℥ iij. vel ℥ vj. Succī, penuria Rosarum recentium siccarum.

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarū confricatarū in oleo

amygdalino dolci

} ana ℥ iij.

Agarici ℥ i.

Cassithe ℥ β.

* Epithymi ℥ v. * pro ℥ 4. Epithymi, ut
Spicæ Nardi Indi. in veteri exemplari legi-
tur, Cordus, Anti-
cæ ℥ iij.

Feruefac paulisper, dotarium Florentinum

& alii nonnulli ℥ 40. legunt. Succorum au-
tem prescriptarum ℥ j. Que quantitas longè

superat omnia huius medicamenti simplicia: ad-
de quod calidior foret eius operatio, & succi

ingredientia vix caperent quæ infundi debent:

eoque quidam decoquunt, & infundunt in bal-
neo occluso. Syrupus ex Epithymo Mesue, cui

nomen ab Epithymo tanquam precipuo agente,

℥ xx tantum Epithymi primo loco habet.

cola, & in colati dimidio dissolue

Pulpæ Thamar-Indorum ℥ iij.

Pulpæ Cassiæ ℥ iij.

Mannæ ℥ j. β.

Io-Sacchari siue Sacchari Violati ℥ xij.

Alteri colati parti adde Sacchari optimi.

℥ xxxvj.

Aceti

452 M E D I C A M E N T A

Aceti boni ℥ j.

Coquantur igne lenissimo, & supradictis
commisceantur.

Deinde adde sequentia in puluerē redacta

Rhabbari selecti ℥ ij.

Myrobal. Citrinarum ℥ j. β.

Indarum

Chebularum ana ℥ j.

Bellericarum

& Emblicarum ana ℥ β.

Seminis Fumariæ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches Cubebarum

Spodii vel Antipodii è Myrto vel Cydonio

Santali citrini ana ℥ ij.

Seminum Cucurbitæ

Citrulli

Melonum

Cucumeris mundatorū

} ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ β.

Spicæ Nardi ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo Viola-
to: & fiat omnibus mixtis Electarium ar-
tificiosè.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ,

*ex inuentione D. Mesue, inter om-
nes Aggregatiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capi-
te, ventriculo, hepate & visceribus eua-
cuant,

uant, Catholicæ vocantur, aut Diacatholico comparantur: & quoniam ad multa vtilis, multiq̃ue vsus quotidiani; earũ descriptionem damus ex veteri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinarum

Raued seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati
Diosc. seu Herbæ S. Mariæ

Succi Absinthii ana ʒ ij.

Diacredii siue Scammonii præparati succo Rosarum

Turbith boni Aloës ana ʒ vj.

Myrobal. Chebularum Indarum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodii ana ʒ ij.

Mastiches

Rosarum

Salis Gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ j.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

Fiant pilulæ. Ne fortiores sint, formentur cum Elect. è Succo Ros. ait Rondeletius.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorum, Cordum, Wecherum & alios sequens, tum in Superiori Germania cum & Inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus

ribus impendiò effrenatum hostem, substituunt. Ageratum enim esse Mesuæ Eupatorium, superabundè docuimus in nostris Stirpium Aduersariis.

HIERA AROMATICA

sive Pilula ex Aloë, aromatica.

℞. Aloës Succotrinæ, aliquoties maceratae succo Rosarum rub. & exsiccatae in clibano ℥ iij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ℥ iij.

Cinnamomi

Rad. Asari

Spicæ Nardi

Mastiches

Garyophyllorum

Macis

Galangæ

Schœnanthi

Xyloaloës

Croci

ana ℥ j. ʒ β.

ana ʒ ij.

Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

PLURA iam non excutiemus, freti D. Rondeletii Pharmaceuticam Officinam mendis innumeris vindicatam, tandem in publicum prodituram.

Querenti autem Medicamentorum varia & comprobata genera, eiusdem Rondeletii Remediorum formule obiciantur.

QUIA verò in hisce Aquilonicis plagis

gis tot Seplasiarii , Salgamarii potiùs
quàm pharmacopœi; Barbitonfores , Li-
thotomi , Circumforanei , Agyrtæ , Ludi-
magistri , medicamentarii indocti , & sa-
crificuli vafri , rapaces & lucri avidissimi,
nulla medicinæ parte illis probè peruesti-
gata , per hominum mortes experimenta
agitantes , tam repentè hodie Medici aut
potiùs medicaſtri fiunt : qui tandem in lo-
cum experientiſſimorum Medicorum ir-
repererunt; magno ignaræ gentis , rudis
& rutiicæ turbæ applauſu : apud quos for-
det, laceratur & malè audit ars Medica di-
uina, nobiliſſima & antiquiſſima, ſummo
agrotantium diſpendio , & tædio probor-
um medicorum; conſultò dataque opera
eatenus & parciùs attingimus , imò præ-
termiſimus (tanquam nefas plagiumque
profanare & perdere artem) medicatos
ſuccos ſiue nobiliſſima Liquamenta , Ex-
tracta Cathartica vocata, quæ longè mi-
nori noxa & mole, maiori cum efficacia
in corporibus egregiè operantur: tamdiu
uſquedum leges ceſſabunt in hos indoctos
& inexpertos carnifices , qui ſe medicos
profiterentur , ubi aliquot remediorum
formulas memoria didicerint , animad-
uertere.

SVCCEDANEA,

QVID PRO QVO vocant.

AN *Ἀνὰ δὲ πρῶτον*, hoc est, Simplicia, quae aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio, quae nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhuc *Ἀνὰ καρδίου* fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima: ut loco Agarici, Euphorbium; pro Serpyllo, Potamogetona; vice Galle, sordes gymnasiarum; in locum Polypodii, radicem Chamelae aut Chameleontis; pro Polytricho, Absinthium; & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quae recipienda magis sunt, tum indidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus utcumque proferemus: ut

PRO Aqua pluuiæ, supponi potest Aqua fontana pura, & ab omni mistione sinceræ. Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

Acatia, succus & caro Prunorum agrestium, vel Hypocistis, Auit. 2. Canon.

Asaro, Acori par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro Asaro & cum Asaro, lib. 2. comp. phar. part.

Absinthio, cum Galen. Abrotonum; & econtrà pro Abrotono, Absinthium.

Acas-

*Acanthii semine, Lychnis, & conira an Cardo-
pys.*

*Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua Sa-
caba [al. Sucaba] Serapioni dicitur) Acan-
tha leuce nostras, eidem dicta Bedegar.*

Alicacabo, semen Solani.

Aspaleho, Pix liquida, Brutia.

*Æthiopica olea lachryma, lachrymarum Aca-
cie partes dua; seu pro gummi Elemnii, gum-
mi Arabicum.*

*Acoro, ad flatum & hepar, ac lienem iuvan-
dum, Cumini par pondus, & tertia pars Ari-
stolochia. Anticenna.*

Anchusa, Hyacinthus.

Arsenico, Sandaracha.

Amylo, sicca Farina.

Amygdalis amaris, Absinthium.

*Aristolochia quavis, una ex tribus Aristolochiis,
quancumque habueris. Galen. lib. 3. comp.
phar. part.*

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe ceruino, anserinus.

Alumine, Sal fossitius.

PRO Balaustio, Malicorium.

Buccinis, Ostrea usta.

Balsami liquore, Myrrha stacte.

PRO Cinnamomo, Casia, aut Amomi da-
plum, ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. comp.
phar. in dentifricio. Pro Cinnamomo, du-
plum optima Casia, vel cum Quinto me-
dico duplum vel multum Carpesii, vel certe

- non paucior *Cassia*. Gal. lib. 2. 3. & 8. comp.
 phar. part. & lib. antid. Quidam carentes
Cinnamomo, in vicem eius ponunt equala
 pondus ex semine *Cardamomi*. Damocrates in
 Cyphi, lib. 2. *Antidotorum* Gal.
Cassia, *Cinnamomum*. Galen. lib. 2. comp.
 phar. part.
Cassia cortice, *Nardus Indica*, vel *Malobathri*
 folium, vel contrà, lib. 6. comp. phar. part.
Chamameli floritus, duplum foliorum & ra-
 dicum.
Costo hodie rarissimo, *Pyrethri* dimidium, vel
 bacca *Cedri*, vel radix *Helenii* vel *Ireos*.
Cimolia terra, ex *Cimolo* una *Cycladum*, re-
 trimentum ferri & mola simul attritorum.
Cardamomo maiore, minus; & contrà.
Calaminthe omnis, *Menthastrum* & *Pulegium*
 similia sunt facultatibus: ob id inuicem sunt
 antiballemena.
Croco, *Crocomagma*.
Cypero, *Iuniperus maior*.
Cumino, semen *Rutæ* vel *Agni* [casti]
Clinopodio, *Heliotropium*.
Colocynthide, semen *Ricini*.
Capparis radice cortice, cortex radice *Tama-*
ricis vel *Ericæ*.
Cicuta semine, *Coriandrum*.
 PRO *Diſtamno*, *Eleiſſphacu*, vel *Nepita*.
Dorónico, dimidium seu dua tertia *Garyophyl-*
lorum. Auic.
Damaſonio, *Eryngium*.

PRO Elaterio, succus foliorum Cucumeris
agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci; & contrà. Nam quas
vires hodie in ligno Guaiaci experimur, Ebe-
no tribuit Gal. lib. 6. simpl.

Eupatorio Mesue, Absinthii & Asari ana di-
midium pondus eius, ut ambo simul mista
equent pondus Eupatorii Mesue, ab Eupa-
torio Gracorum diuersi.

PRO Folio, folium Garyophylli, Nardus In-
dica, si inuenitur, Casia, id est, vulgare
Cinnamomum, Macis. Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem propè pol-
lent; & pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimo columba.

Felle suillo, vel perdici, vel piscium.

PRO Gentiana, Asari, & radicis Capparis
ana dimidium.

Gongylide, Heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, equale radicis eius. Androm,
in arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio Cocco, semen Lathyridis; & contrà.

Galbano, Sagapenum.

PRO Hammoniaco, Propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum, folia
Anchusa, & dimidium Bdellii.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrica, Helenium odoratum.

PRO Lapide Lasso, [al. Asio,] lapis gagates.

Lapide Magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, Pyrites lapis vel Argyrites.
Libystico, semen Staphylini, id est Pastinaca,
praesertim agreilis.

Lepore marino, Cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix Veratri nigri.

Lycio, succus radicis Centaurii magni, lib. 7.

simp. alius succus baccarum Periclymeni. au-
tor libelli Dynameon, Galeno male adscripti.

PRO Melle, Melaerium, vel Saccharum.

Malobathro, Casia, vel Nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, Calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnium, & contra. Diosc. in
Smyrnio.

PRO Nasturtii semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par Spica.

Nardo Syriaca, Iuncus odoratus.

PRO Opopanace, Hammoniacum, vel Gal-
banum, vel Sagapenum, vel Bdellium, lib.
2. ad Glauconem in curando scirrho.

Ocimo garyophyllato, Melissa in affectibus cor-
dis.

Oleo Laurino, Pix liquida, licet illo inferior:
vel oleum Cedrinum, vel Cicizum, vel ve-
tus, vel oleum ex lucerna cum cera. Galen.
lib. 1. comp. ph. part. vel coctum (sic enim
tenuius fit, & veteri ac Cicino simile) vel
sordes lucernarum luti crassitie. ibidem.

Oleo Rosato, Violatum, Nymphaea: Amygda-
linum autem loco Rosacei boni, id est, ex
multis Rosis cum oleo omphacino insulso
facti, lib. 3. comp. phar. part. initio.

Oleo

Oleo Ricinino seu Cicino, Raphaninum.

Opobalsamo, Opocarpasum Gal. vel Myrrha
stacte, vel liquor Myrti.

Oryza, Hordei farina.

Oesypo, medulla ceruina.

Omphacio, succus Rheis, vel vinum auste-
rum.

PRO Piperis longo, album: pro albo, nigrum
optimum, id est, grauissimum, & contrà, &
sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radice
eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis
tribus, Palmule seu Dactyli tres, aut sex, Gal.
lib. 7. comp. phar. part. in alexand. 45. An-
dromachi.

Psyllo, Lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius re-
gionis Petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

PRO Resina fricta, Pix, aut Pix Brutia, Gal.
lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, Scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem
cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos Rosarum, vel contrà, Galen. lib. 6.
comp. phar. part.

Rhoë coriario, Rhus obsoniorum; & contrà,
Gal. lib. 6. comp. phar. part.

PRO Staphide agria, Pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem. auri-
riam inuentus, melior quàm Ebur vsum,

quod nescio cur hodie Barbari Spodium vo-
cent.

Styrace, Castorium.

Sale Indo, Saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi Cedri, Hammoniacum, Re-
sina picea sicca.

Spuma Nitri, Nitrum molle, vel Aphroni-
trum. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vino, flauum vel vstum & purgatum.

Saryrio, semen Eruce, vel Scincus, vel contrà.

Sinapi, Cardamomum vel Cardamum.

Scammonio, Ricinus.

Stibio contuso, squama aris, Rannum vstum.

Sepia osse, Pumex.

Serapiade, Peania rudix.

Scilla, Bulbus.

Struthio, in sternutamentis, Elleborus albus.

PRO Terebinthina, laricea dicta Resina, si
propemodum similis, Gal. 1. lib. comp. ph. gen.

Thapsie succo, Chamaleontis nigri succus, vel
Nasturtium; vel Nasturtii aut Eruce se-
minis pondus equale; licet illa sint multo
inferiora Thapsia. Galen. lib. 1. comp. phar.
part.

Tamarici succo, succus Sambuci. Gal. lib. 9.
comp. phar. part.

PRO Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, Chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quodam colore fuluum. sub-
stantia tenue, ut perluceat, & sit odorata
vehementer, ut Arnisum [vel Arinsum]
ex Chio,

ex Chio, Lesbium, ex Mitylene, Creffo, Methymna, & Tmolites; Galen. lib. 1. comp. phar. gen.

PRO Zedoaria, Aristolochia.

Zingibere, Pyrethrum.

Αὐτὰρ ἀποδοῦναι, vel horum aliqua vel alia, potest quævis regio noua, desideratis facultate affinia facere, doctorum medicorum consilio: nam si Arabibus & Græcis pro Sinapi Cardamomum, fortè ipsis frequentius, licet substituere, quidni pro Cardamomo frequentissimum nobis Sinapi vsurpabimus? præsertim cum ut pro Ginnamomo Casiam, sic contrà pro Casia Cinnamomum assumi probauerimus: idemq; in aliis faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, Melissophyllum (inquit) Marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius; ob id Melissophyllo vitur nemo. Nam absurdum fuerit, præsentē ubique terrarum magno Marrubii prouentu, uti Melissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit Marrubium, Melissophyllo vit poterit, obseruata eius præ illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur. hac Gal. Quæ ratione pro Cinnamomo duplum Casia optimè miscemus medicamentis, ut quantitate qualitatibus imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt parata, ponantur: ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici Cedrio dicto

Y 4

viuo-

464 DE SVCCED. QVID PRO QVO.
utuntur: eius penuria Pisselao, id est, Pice &
Oleo mistis liquida forma: interdum etiam Ce-
drio & Pisselao simul magis & minus mistis,
prout vires eius intendere student. Hoc autem
linunt sinciput, nares, frontem, aures, & qui-
busdam plantam & sedem. Gal. lib. 2. comp.
phar. part.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui
magna cura iam simplicia generis omnis in-
promptu habeamus: imò maximè egemus, cum
multa simplicia veteribus laudatissima (ut
Theriaces compositio docebit) hodie nobis pa-
rùm sint cognita. Que ubi certa erant, his uten-
dum potius, quàm Antiballomenis. Ut enim
pluris est equo domini oculus, quàm equisonis
industria; pluris agro domini vestigium, quàm
villici stercorisatio; pluris familia paterfam-
lias, quàm procurator; pluris prator, consul,
rex, pastor, quàm proprator, proconsul, pro-
rex, mercenarius: sic plus tribuendum puto his
que maiores magno delectu & ratione optima
in compositiones cooptauerunt, quàm qua illo-
rum loco coacti adoptamus. Hæc hactenus ex
Iacobo Siluio.

PE-

PETRVS COVDEBERGIVS
PHARMACOPŒO.

LIBELLVM hunc , Pharmacopœe candide , denuò percurriffem , atque exactius ruminaffem , loca agrotata reliqua leniendo , ac nubila Scholiis illustrando , extremam illi manum adhibens ; nisi otium , opusculi angustia , typographi quoque commoda occasio , atque immature quodammodo frugis extorsio , perorare me , atque vela ventis committere coëgiffent. Omnia itaque hæc , cum obiter saltem , ex tempore , & tamquam ex transcurso tibi tradantur (etenim ne tantillum quidem à Pharmacopœo vestra farina homine , cuius tamen propriè muneris est , hætenus nostro seculo prodiiffe cognoscitis) æquo sunt consulenda animo , dum meliora dare Deus permiserit.

F I N I S.

V,

DE

SVCCEDANEORVM COLLECTANIA

MATTHIÆ LÖBELII,

*aucta & recognita, ex classicis auctoribus,**IMITATIONE RONDELETTII,**è cuius Fragmentis & Praelectioni-**nibus hæc ferè decerpta sunt.*

CVM attentiore lectione animaduertissem vulgatum SVCCEDANEORVM libellum, quem nonnulli Galeno, alii Paulo acceptum ferunt, scatere mendis, & plerisque locis mutilum esse; utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuò Latinè versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro Græco, qualis fuit & Actuarius; visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atque Paulus litteris mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius equipolleat, studiosis in posterum patèret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint, quæ Galeni tempore ignota fuere, uti Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè
Cha-

Chamamelini legerant alicubi, nominis
 decepti affinitate, Melinum subdiderunt;
 quàm inſcitè, nullus eſt qui id ignoret;
 illud enim laxat, & moderatè calfacit;
 hoc verò refrigerat, aſtringitque. Ea-
 dem ineptia, quòd fortè Cepæam Portu-
 lacæ ſimilem legiſſent, illius vires huius
 facultatibus reſponſuras putârunt. Itidem
 Leporem fluuiatilem Cancrī loco uſurpa-
 ri; vel ut alius quiſpiam correxit, mari-
 num, indoctè: ut qui ignorafſe videatur,
 Cancrum alimentum & antipharmacum
 eſſe; Leporem verò [marinum] vel odore
 ſolo vomitorium, & venenum. Nec hoc
 falſum ſolummodò, at & diſcriminis ple-
 num, cùm loco Opobalfami Opocarpa-
 tion ſubſtituunt, quod venenum frigi-
 dum eſt Dioſcoridi, vinoque, uti Cicuta,
 expugnandum, teſte Galeno, libro De an-
 tidotis. Verùm ſi hîc Carpaſon legamus,
 vera fuerit lectio: eſt enim tenuium par-
 rium. Cinnamomo item Behen rubrum
 reſpondere nequit. Neque placet ordo
 ſeriesque collationum: nam olea oleis,
 non reſinis aut aquis ſunt conferenda; ut,
 quoad eius fieri poteſt, ſint ſimillima.
 Deinde, ſi non licet ex ſpecie proximâ,
 ſaltem è genere, cùm abundemus probis
 remediis. Nec parui facio regionum ubi
 naſcuntur proprietates: veluti Cretica-
 rum plantarum, quas Italicis efficacioreſ

puto; nisi squalida admodum aut retorrida fuerit ætas, quæ deficiente alimentoplasma tabefacit: rum enim Polium Italicum, aut Stœchas non cedunt Cretico, aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus caremus, aut adulterata; vt loco Cinnamomi, Amomum. Insaniæ itidem, vbi abundamus Lactucâ, Opocarpatum optare. Licuerit tamen, si qua sint rariùs obuia, aut minùs trita, eorum loco vsurpare viribus similia; vti Terebinthinæ veræ loco, Lentisci Resinam, quia frequentior est.

Cùm autem Succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum; nec vbiuis medicamenta opportuna occurrunt: (ruri enim *ditto e' sois* siue facillè parabilibus vtendum; & cùm medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt: vt Galenum fecisse legimus; cui Euphorbium cùm ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propolin pro Euphorbio felici successu vsurpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius, quàm vmquàm fuit; cùm multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouen-

tus

tus sufficiebat, hodie careamus; tum suppositicia, Hebræorum & mercatorum vafro ingenio adulterata, transuehantur; quæ si reiicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vfitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilles inuentæ cōpositiones, efficacissimaque remedia in vsum recepta: quorum simplicia, barbarie vocum, nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in Succedaneorum delectu & vfu, pessima illa medicorum consuetudo merito reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in cōpositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temerè; & cū omnia similia vsurpârunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quod si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent, nunquam Succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda; certior medicamenti operatio, faciliior & citissima præparatio;

pluribus remediis & Succedaneis, summæ
artis Medicæ ornamento, abundabit medi-
cus; cui iterare, immutare, supponere phar-
maca licebit, & plus quàm vulgus Medi-
corū & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto
Boraginem præscribat; ea si defuerit, Bu-
glossum agreste substituere, vel contrà:
si Scariola defit, succum substituere vel
syrupum licebit: si Cichorium, Dens
leonis, vel Endiuia; si Chamæpitys, Cha-
mædrys substituatur, si defit; vel contrà.
Sed quid faciet, si omnia congerantur in
vno eodemque medicamento? certè nihil
aliud erit, quàm poëticum illud Chaos,
Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant:
Vbi in promptu habentur simplicia, do-
lum esse siquis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant:
& illos tamquam scopulos vitent: caueant
item malos, auaros, improbos, impuden-
tes pharmacarios & circulatores, qui num-
mi & lucri rapaces, farraginem medicamē-
torū etiam semiputridorū inter se pugnā-
tium collaudant. Quidam hoc faciunt, vt
copiam ostentent, vel ignorantia, vel su-
perbiā; & aliqui docti, ne videantur in re-
mediorum cognitione minùs exercitati.

Blaces quidam medicaſtri, impostores
nobiles, populares agyræ, histrionesque
Hippocratici, Aureiue Aureoli Theo-
phraſti

phraſti aſelli (cuius tamen documenta vix ſummis deguſtârunt labris, quosque magiſtri pudet: quemque neque agnoſcere neque tutari audent, ne apud doctos, & vulgus, ob circulatorum, qui falſo diſcipulos Theophrasti ſe gloriantur, illuſiones & techas malè audiant) ementitam, irrationalem, garrulam, pertinacem, perfrictæ frontis impudentiam, mordicus nouam philoſophiam effutiunt, obblaterant, & pro ſuâ oſtentant; Panaceâ fœdâ vnicâ, ſiue decocto parato ex omni confuſâ herbarum, etiamque deleteriarum, nullius delectûs, inter ſe ex diametro pugnantium, malignâ & infauſtâ ſideratione collectarum, farragine, additâ Senâ, Cinamomo, Saccharo, & huiusmodi, ad ſaporis gratiam, pro vniuerſali omnium humorum, anili medicatricum & obſetricum cohorti notiſſimo, freti & contenti, ad omnes morbos, quos Ariſtotelicis & Hippocraticis ſectatoribus incurabiles iactitât, à ſe viginti quatuor horarum ſpatio percurari poſſe, ilicò vtiq̃ue & vbiuis pollicentur; impoſturâ, ſupinâ audaciâ, & gnathonicâ adulatione, nullis interdictis aquis noxiis, & quibus morbi fouentur, eduliis.

Huiusmodi homines potiùs ſcuticâ digni ſunt, quàm papyri & temporis iacturâ in deſcribendis illorum ineptiis,
men-

mendaciis & imposturis. In illos sanè Reges, Leges, & Medicorum celeberrima Collegia deberent animaduvertere, eosque ex Republicâ propellere; doctos autem viros fouere & erigere: qui (proh dolor) hodie multis locis pereunt, & haudquam ab improbis & indoctis logodadalis scamnidicis discernuntur.

Portò cum sint quædam compositiones vtilis priscis medicis excogitatæ, experientiâ & ratione receptæ & comprobatæ, nonnulla Succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ eâ ratione minimè excludenda & reiicienda: cum non tanta infelicitate Succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SVCCEDANEA, quantum fieri potest, eiusdem sint generis & speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
Radix pro radice.
Flos pro flore.
Semen pro semine.
Succus pro succo.
Lachryma pro lachryma.
Resina pro resina.
Muccago pro mucagine.
Metal-

IMITATIONE RONDELETTI. 473

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terrâ.

Pix pro pice.

Axungia pro axungiâ.

Medulla pro medullâ.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiatâ.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabellâ.

Confectio pro confectiōe.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo, siue simplex,
siue compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO-

THEOREMA VNIVERSALE
VEL COMMUNE.

<p>Medicamentum quod substitui debet, siue in- ternis, siue ex- ternis conueni- re debet: nempe</p>	{	<p>Viribus occultis, ma- festis, & consisten- tiâ. Sit etiam simile in Sapore, Odore, Ætate, Natalitiis & regione, Natura & tempera- mento.</p>
---	---	---

Nonnulla in externis remediis suppo-
nuntur, quibus in internis uti non licet:
ut succus Carpathi substitui potest pro La-
stuce succo in externis; cum tamen ve-
nenum sit, non introsumitur.

Non totum simplex, sed aliquæ partes
substituuntur.

Ut Mucago seminis Psyllii, pro mucca-
gine seminis Cydoniorum: non totum
semen, quia pars interior temperamento
differt à mucagine, & venenata putatur.
Neque etiam Cydonium malum conuenit
pro semine suo, quia viribus & consisten-
tiâ differt.

Formula quædam in quibusdam reme-
diis sibi mutuo succedunt: ut,

Conseruatio, pro syrupo eiusdem sim-
plicis,

plicis, fuctus, floris vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiatâ substitui potest: Sed in syrapi consistentiâ non potest; quia remediî formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbarum decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro Vnguentis vti licet: & contrâ, modò pars affecta assentiatur: vt Emplastro filii Zacharię, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo, pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vtendum; quia emplastra imposita dilationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro Vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat; quæ neque dura, neque graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICAMENTA

PRO ALIIS SVBSTITVERE LICET,
modò vires correfpondeant.

Pilulæ pro Confectionibus, & Confectiones pro pilulis. vt,

Hiera fimplex pro Pilulis de Hiera & Benedicta; & contrà.

Et pro pilulis Pituitofis, Electuarium Diacarthami, de Citrofolutium.

Pro Biliofis, Electuarium de fucco Rosarum, & contrà; obferuata cuiusque quantitate. Hieræ & fimilium Electuaria doses augendæ, ob mellis molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro Eclegmate, fi lambendo affumi debeat: vt

Syr. Iuiubarû, pro Lohoch fano & experto. Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro Trochifco, & contrà: vt

Diarrhodon pro Trochifcis diarrhodon.

Trochifci de Squilla, pro Eclegmate de Squilla; auctâ vel imminutâ quantitate, pro ratione, indicatione morbi, & fco po medici.

In fimplicibus partes aliquando religiofè non obferuantur. vt

Turbith pro Agarico trochifcato, & contrà. Hîc fimplex pro composito ponitur, vel compositum pro fimplici.

Pro

Pro Agarico Colocynthis, in minori
quantitate. Carthami duplum & triplum,
pro Agarico; & contrà.

Difficile tamen inuentu simplex medi-
camentum substituendum, quod verè vn-
dequaque omniq̃ue ex parte conueniat, vt
testatur Auicennas in suo Canone; vbi vix
reperies duo simplicia medicamenta, quæ
aliorum facultate similium panuriâ, sub-
stitui tutò possint. Quod cum difficillimū
foret, ille aliquando duo, interdum tria,
pari pondere & mensura, nonnunquam
duplicato & triplicato, addita quinta aut
octaua parte alterius medicamenti, suppo-
nit. Quia paucissima sunt medicamenta,
quæ omnino simile temperamentum obti-
neant, aut eandem consistentiam, crassi-
tiem, tenuitatem partium, & propieta-
tes occultas.

Variis in compositionibus est medica-
mentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem,
siccitatem; in principio primi, in medio
& primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassi-
tiem, lentorem, saporem, odorem, colo-
rem: quare id quod temperamēto respon-
det, sæpe dissidet crassitie vel tenuitate par-
tium; vel alia facultate. vt pro Asaro Aco-
rum substituendum censent. At in omni
operatione non conuenit: non enim om-
nia

nia potest Acorus quę Asarum. Vrinę qui-
dem & menses ciet : (quare in vreticis
tantum supponendum :) vomitum verò
excitare, aquasque educere, vt Asarum, mi-
nimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: Sed si ob colorem Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus baphica.

Asa dulcis pro Fœtida non conceditur, propter odorem, vt Auicennas substituit in affectibus vteri; quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata vterus, fugit fœtida.

Propter saporem quædam usurpantur; sed non conueniunt vndeque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus; minimè autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem usurpatur Fœnumgræcum, quod muccaginem reddit, sed calidam: idè in spuito sanguis reicienda, quemadmodum in externis remediis, vt ophthalmiæ, in qua Ovi albumen præfertur qui-

quidem in principio & incremento; in
tatu verò & declinatione muccago Fœnu-
ugraci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni for-
mula remedii substituuntur: vt

Myrrha pro Bdellio, in pilulis & vn-
guentis:

Sed in pilulis è Bdellio, nullo modo
conceditur, quia sanguinis fluorem & hæ-
morrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In svsstivris igitur hæc ob-
servare oportet, vt supposititium in lo-
cum adulterati, genuini pænuriâ, eadem
efficiat quod ipsam genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, hume-
ctabat vel siccabat, adstringebat, vel laxa-
bat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in com-
positionibus Græcorum, Seriphium vel
Santonicum.

Pro Absinthio è Pontô vel Tauro mon-
te, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum dele-
ctu præstare, quæ sunt alicuius regionis
[propria;] modò illam ipsam herbam
regionis finitimæ, vel saltem simillimæ,
assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gal-
lo-Prouinciæ, siue Creta, vbi Thymus
nostrâs angustifolius & Epithymus op-
tima & copiosissima.

Secun-

Secundo loco herbae regionum humidarum, modò estas squalida aut ficcio fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse se Galenus docet in preparatione Theriacis.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet: nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus; &

Pro Africana Florentinam.

RADICES.

Rhapontico, Radix Centaurii maioris, vel nostri Rhabarbari magna, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum, & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatum a multis, propter empyreuma.

Pro Zingibere, Costus; & contra: vel Helenium, & Pyrethrum.

Costo, Pyrethrum.

Aristolochia Longa, Rotunda; & contra: vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus officinarum; & contra.

Acoro, (in laxantibus & cientibus vrinas & menses;) Radix Asari.

Asaro,

Asaro, (quando purgare, & vomitum ciere opus est,) Elleborus, semen Genistæ & Raphani; vel hæc tria simul.

Galanga, Cyperus rotundus; & contrà.

Calamo odorato Libani, Schœnanthum, Calamus siue Acorus officinarum: si ad odorem solum, Santalum citrinum officinarum.

Althæa, radix Maluæ hortensis, vel sylu.

Asparago altili, Corrudæ, immixta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco, Radix Asparagi; & contrà. Cortice radice Capparis, Cortex radice Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi & Lauri.

Apii radice, Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana, medietas Asari & radice Capparis.

Turbith, Thapsiæ radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiscatus, vel Colocynthis, minore dosi.

Zingibere, Mechin.

Serpentaria, Iarus, Dracunculus.

Laparho, Oxalidis radix.

X Rha-

Pro { Rhabarbaro ad laxandum, succus
 Rosarum.
 Rhabarbaro ad astringendum, Hy-
 drolapathi radix, vel Galanga
 maioris, si calore opus est; si re-
 frigeratione, radix Bistortæ.
 Nardo, Nardi species.
 Secacul, radix Pastinacæ marinæ.

SVCCEDANEA, QVANTVM

FIERI POTEST, SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,**& specie. ut.*

Omnes Dauci spe-	Calaminthæ,
cies,	Cepæ,
Intubi,	Chelidonii,
Adianthi,	Costi,
Condrillæ,	Nardi,
Hieracii,	Betæ,
Rumicis,	Bliti,
Absinthii,	Iuniperi,
Abrotoni,	Sabinæ,
Sideritidis,	Cedri,
Aconiti,	Rhamni Dios.
Veratri,	Myrti,
Anagallidis,	Piperis,
Anchusæ,	Cyclaminis,
Anemones,	Ranunculi,
Asparagi,	Hederæ, excepta
Brassicæ,	Hederula terrestri,
	Rutæ,

Rutæ,	Heliotropii,
Seseli,	Origani,
Apri,	Aristolochiæ,
Rosmarini,	Valerianæ,
Marrubii,	Bituminis,
Leucoii,	Picis,
Orcheos,	Resinæ,
Maluæ,	Allii,
Polygoni maris &	Porri,
feminæ,	Plantaginis,
Symphyti,	Panacis,
Tribuli,	Pastinacæ,
Rubi,	Lychnidis
Equiseti,	Conyzæ,
Vrticæ,	Nymphææ,
Tithymalorum,	Anthemidis,
Mercurialis,	Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid proditum
inhibeat: vt de Clematide; quarum Al-
teram vrere, ventrem laxare, bilem, pi-
tuitam trahere scribit Dioscorides: Prior
verò [Clematis] alui profluuia & dysen-
terias sedat.

Sic Cucumis agrestis, & satiuus; Pe-
po & Colocynthis. Sed hæc paucis eueni-
re solent.

De PARTIBVS etiam obseruandum.
Nam aliquæ facultatibus differunt: vt ra-
dix Medii menses decocta sistit, per ali-
quot dies sumpta: semen autem in vi-
go sumptum, menstrua pellit.

X 2

Iuni-

Iuniperi fructus introsumuntur ; ramenta verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur ; semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus, sed potius particularibus niti præstaret. Nam eorum plerumque est maxima differentia, quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro Folio Indo , & Malabathro , folia Citri, Canellæ vel Malabathri vulgaris : vel, vt alii, Macin, aut Spicam.

Pro foliis Lauri, Citri folia.

Papaueris albi, Solani folia, Papaueris nigri, minore quantitate, vel Hyoscyami albi.

Lactuca, Scariolam ; & contrà.

Cichorio syluestri, Dentem leonis.

Pro Eupatorio, Asarum, & dimidium Absinthii.

Pro Struthio, Nucem vomicam, & tertiam partem Piperis, Auicennæ.

Pro Dictamni prima specie, secundam, tertiam ; vel Pulegium Ceruinum.

Calamentha montana prima, secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Pro Chamæpity, Chamædryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri, hortensem.

Malua arborecente, Althæam.

Thlaspi, Nasturtium.

Men-

Mentha, Balsamitam.

Pulegio Regali, Ceruinum; & contrà.

Lepidio Pauli Æginetæ, Drabam, vel Iberida, vel Nasturrium.

Phyllitide, Asplenium siue Scolopendrium, Ceteráchve; & contrà.

Foliis Oleæ vel Lentisci	} Folia	{ Nucum Iuglandis, Cupressi, Pini, vel Pinastræ

Foliis Myrti	{	Baccas Myrti, vel Iuglandis nuces immaturas.

Thymo, Satureiam, vel Origanum.

Ruta syl. Rutam domesticam siccata, maiori quantitate; vel contrà.

Spica Lauendula, Lauendulæ species hortenses.

Adiantho, Saluiam vitam, Polytrichum, Adiantum nigrum Plinii: in asthma, Violæ par pondus, cum medietate Glycyrrhizæ.

Telephio, Portulacam.

Portulaca, Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi, Lentisci folia.

Foliis Oleastri, Oleæ folia.

Foliis Sambuci, Ebuli; & contrà.

Betonica, Verbenacam.

Melissa, Marrubium, Corticem Citri; & contrà.

Apio montano, domesticum siccum, in maiori dosi.

486 DE SVCCEDANEIS

Cepæa, Portulacam.

Nardo montana, Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis, Oleæ folia; & contrà.

Foliis Caprifici, Ficus domesticæ folia; & contrà.

Thymbra, Thymum vel Serpillum.

Coriandri foliis, Petroselini hortensis folia, in externis remediis tantum.

Hippomarathro altero, Coriandrum vel Petroselinum domesticum.

Foliis Dauci, Pastinacæ agrestis vel domesticæ folia.

Conyza prima, secundam.

Conyza secunda, tertiam, maiori quantitate, & siccata.

Sanguinalis feminæ foliis, folia maris; & contrà.

Hippuride prima, secundam; & contrà.

Semperuino maiore, paruum Vmbilicum Veneris; & contrà.

Foliis Labruscæ; domesticæ Vitis folia minus cultæ.

Chamelæa, Thymelæam, Chamæpityn primam Dioscoridis, Laureolam.

Alfinæ foliis, Helxines folia; & contrà.

Vite alba, nigram; & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Astore Attico, Antirrhinum; & contrà.

Foliis Sabinæ, folia Cupressi, Iuniperi, & Cassiam.

Dorycnio, Mandragoram; & contrà.

Dra-

Draguntio, Arum.

Foliis Abietis, Populi folia.

Eryfimo, Erucam; & contrà.

Foliis Hippolapathi, Lapathi folia.

Foliis Piccæ, folia Pini.

Lathyridis foliis, Tithymali folia.

Libanotide sterilis, folia Libanotidis coronariæ.

Lepidii foliis, Nasturtii folia.

Nymphæa alba, luteam; & contrà.

Sorbi foliis, Mespili folia; & contrà.

Oxyacantha vera, Pyrastrum.

Foliis Pepli, Tithymali folia.

Pityusæ foliis, Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, femine folia.

Filice femina, marem.

Seride, Condrillam.

Smyrnio, Apium aut Petroselinum.

Solano hortensæ, Halicacabum.

Symphyti Petræi foliis, alterius folia.

Pro Beta alba, nigram.

Pro vnius speciei Tithymali foliis, folia aliorum, in laxando.

Pro Tragorigano, Origanum; & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris, in refrigerando, folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis, folia Papaueris.

Pro Verbasci vnius foliis, aliorum folia.

Pro Spicâ Indicâ, Syriacâ, Valerianam.

Pro Viticis foliis & semine, Rutæ folia & semen.

X 4

Pro

488 DE SVCCEDANEIS

Pro Seridis foliis, Lactuæ folia.

Pro Myrto alba, nigram; & contrà.

Foliis Myrti, folia Pyri siluestris, Sumachi, Lentisci, Sorbi, Cydoniorum; & Corinos.

Pro Semperuiuo, succum Lactuæ, & Solani. Colocynthide, triplum Cucumeris affini.

Pro prima specie Calaminthæ, secundam; pro secunda, tertiam.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia, Buglossum angustifolium.

Pro Soncho læui, Sonchum asperam; & contrà.

Pro Fumaria, Senam.

Pro Hyssopo, Origanum, Sampsuchum.

Pro Hyperico, Androsæmum, Ascyrum, Schœnanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halica Auenæ, ptisanam totam.

Pro Amylo, farinam filiginis siccam.

T A-

TABVLA PRIMA, REFERENS CAPSVLAS
RADICVM ET CORTICVM.

5	Cosrvs.	Cinnamomū sive offic. Cassiatenuis	Cortex inter- nus Nucis Moschatæ	Asarum	
4	Zedoaria	Cassia sive of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux Moscha- ta.	Schoenan- thum	pro Corti- ce Turis
3	Zerum- bet	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Galanga maior	Pro Folio malobathri	Spica Cel- tica	Cortices Lentisci
1	Pro Zin- gibere.	Cypero	Anthophylli		
			Garyophyllis		

Cortic. Quer- cus	Cortic. mali Granati.	Cortic. My- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex Nucis Inglanclis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primùm reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis:) si fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequeretur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minùs frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis, multo minori negotio medicamenta parabuntur; ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio, *αὐτὴ ἡ ἀρρυθμία* indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt; & è contrà, dimi-
nuto pondere. Cùm dicimus quantitatem
augeri,

augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui; nam si medicamenta sint aded imbecilla, satius est eis non uti, quàm duplo pondere substituere ea: moles enim medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Ut omnia medicamenta ordine digeratur, oportet locum in multas classes dividere, & in una classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

				Hermo- dactylus	Aspho- deli
		Pistolo- chia	Cleinati- tis	Arist. 16- ga	Aristolo- chia ro- tunda
Cofus dulcis Arabum	Tussila- go	Heleniū	Iris Flo- rentina	Pro radi- ce Iridis Venetæ	
5	4	3	2	1	

Pro Asaro, Acori pars dimidia, sexta Amomi.

Acoro, pondus par Cimiqi, cum tertia parte Aristolochiæ.

Aristolochiâ rotundâ, Zurumbet pondus æquale.

Aristolochiâ longâ, Zurumbet pondus æquale, & medietas Piperis.

Cyclamine, æquale pondus Aristolochiæ, & sexta pars Seminis Citri, & Menthastris.

X 5

CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypo- dii	Ellebori viriusque	
2	Asphodeli	Suc. Rosa- rum	Tur- bith	Ebuli	Afari
1	Pro rad. Gentianæ	Rhabarbari	Agari- co	Hermoda- ctyli	Cyclaminis Asphodelo- rum

CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boraginis		Maluarum	Thapsi barbati	Spondylii	Radix Vlmi
2	Buglossi	Behen rubri	Bismalua- rum	Bistortæ	Pancrati	Consolidæ minoris
1	Pro rad. Glycyrrhi- zæ	Behen albi	Lilio- rum	Quinque- folii	Squillæ	Pro radice Consolidæ maioris

X 7

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

1	Corticis rad. Lauri	Asari	Staphidis agriæ	Behen rubri
2	Cor. rad. Sam- buci, & Ebuli	Ari	Clematidis alterius, siue Flammulæ	Behen albi
3	Fraxini, vel Populi	Serpentariæ	Rad. Dentil- laræ	Boraginis
4	Rubiæ mino- ris	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
5	Pro rad. Ru- biæ majoris	Cortice Sam- buci		Glycyrrhizæ

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

I 2 3 4

5	Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
4	Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
3	Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri.	Hyoscyami
2	Bombacis	Malux, Bifmalux	Psyllii	Cydoniorum
1	Lini	Fœnugræci	Lauendulæ	Keyri rubri vel citrini

CAPSVLA LIGNORVM.

5	Citrinum Sant.	Xylobalsa- mum	Scobs Buxi
4	Rubrum Sant.	Surculi Len- tifici	Ebenum
3	Pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echinæ ra- dic.
1			Salsaparilla

PURGANTIVM.

1. pro. Scā- monio	2 Diacri- dium	3 Colo- cynthis	4 Ammo- niacum
Senā	Semen Car- thami	Folia Braf- ficæ mari- næ	3 Sal gem- inæ
Foliis Scā- monii	Thymelææ	Chamalææ	2 Sal petræ
Semine he- deræ.	Sem. Afari	Semen Ge- nistæ	1 pro Sale nitro

4	Thymus	Chryfocol- la, vel fortè Chryfolith,	Elleborus albus	Alhan- dal	Coccus Cnidius	
3	Epithy- mus	Lapis Ar- menus	Ell. Niger	Diactri- dium	Semina Ca- raputiæ	Rhaponti- cum
2	pro Cassi- tha	Lapide La- fuki	Colocyn- thide	Scammo- niq	Rad. Ti- chymali	Myrobala- ni s.
1						Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamælæa	Esula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. ci- netrio		Brassicâ marinâ	Polypodio

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/2

SEMINVM.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.	Sinapi	Semen con- tra vermes	Sem. Pali- uri
4	Carui	Pastinacæ domestica.	Rutæ do- mestica	Erucae	Caulium	Hyperici
3	Foeniculi dulcis	Petroselinini	Ammeos	Thlaspi	Rapæ agre- stis.	Miliis Solis
2	Anisi	Apii	Seseli Ae- thiopici & Peloponēsis	Nasturtii	Rapæ do- mestica	Alkekengi
1			Seseli Ma- siliensis			

SEMINVM.

Piper longum	Cardamo- mi maio- ris	—
Piper album	Cardamo- mi mino- ris	Granorum paradis
Pipere ni- gro	—	Cubebarum

Pro { semine Myrti, Berberis, & contrā.
Napi, Rapi.
Carthami, Vrticæ, vel Agaricus
non Trochiscatus.

3	Berberis	Sorbarum
2	Vuarum immatu- rarum	Mespilo- rum
1	Sabinæ albæ	Cotnorum

Pro { Sem. Mādragoræ, Cicutæ.
Semine Asari, Semen Ge-
nista.

SEMINVM ET FRVCTVVM.

5	Genistæ	Acetosæ	Gallarum	Cytini	Vua Corlithia	Ficus
4	Asari	Citri	Sumach	Balaustiorum	Passulæ mundatæ	Sebesten
3	Sem. Hederae	Berberis	Myrrillorum	Cortic. malignanari	Dactyli	Iuiubæ
2					Pruna dulcia	Passulis mundatis
1					Ficubus	

CAPSULA FLORVM

CAPSVLA FLORVM.

3	Oenanthes	Cichorei	Nymphææ luteæ	Sambuci, Abrotani	Corticum Glandis	Saluia
2	Myrti	Buglossi vulgaris	Nymphææ albæ	Meliloti	Balaustio- rum	Stoecha- dis
1	Florib. Ro- sarum	Buglossi la- tif. siue Bor.	Violarum	Chamaemeli fol. Cha. Ro.	Cytini	Anthos Sambuci

3	Leucoii albi	Flor. Cicho- ræ	Spica, vulgo <i>Aspic</i>
2	Leucoii rubri	Flor. Intubi domestici	Lauendulae
1	Leucoii lutei	Flor. Tama- risci	Flor. Saluia
		Flor. Genista	

DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo : succus Prunellorum probatur, & Rhois Dioscoridis.

Dioscorides ipse succum Hypocistidis substituit quidem; verum aliquanto magis adstringit & siccat, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium, vel succus Lactucæ sylvestris, vel, domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthii succo, Abrotoni, Eupatorii, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo Absinthii Pontici, nostratis Romani succus : differt tantum regione, ut Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo, Stacte, id est, Styracis liquida non adulterata, vel Oleum Myrrhæ. In suffusionibus, ad tingerendum, Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tentium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus Vuarum Passularum, vel Vinum coctum, siue Sapa.

Pro Lycio, Amurca.

Pro

Pro Citri succo, Limonum.

Pro Thymelææ, Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis, Iridis.

Pro Omphacii, Rhois; & contrà.

Pro Aloë, Absinthii succus.

Pro Semperuiui, Cotyledonis succus; & contrà; vel Solani, Lactucæ.

Pro Sanguine Draconis, Laccam sustinuit Auicennas in omnibus operibus suis.

Pro Elaterio, succus Cucumeris agrestis, aliquantum coctus.

Pro Sapa, Vinum dulce; & contrà.

Pro Lycio, Gentianæ succus, in vlceribus.

Pro aqua fontana, fluuiatilis.

Pro aquâ pluuiâ, fluuii potius quàm fontana, contrà quàm Galenus præcipit in Diacodio, quia composita est, partim ex pluuiâ, partim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Stacte siue Myrrha liquida, naturâ vel arte parata, Liqueur Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succedaneorum præcipit.
Oleum laurinum.
Liqueur Myrti, non Semen Myrti, & Zedoarię, vt præceptores nostri statuerunt.

Y Pro

506 DE SVCCEDANEIS.

Pro Carpobalsamo, semen Lentisci, vel
Terebinthi, cuius multæ sunt species:
Cubebe in minori dosi; vel Terebinthi
partes duæ, vna Cubebarum.

Pro Cedria { Oleum è rametis Iuniperi,
paratum per descensum,
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma, Gummi Elemni.

Pro Myrrha, Bdellium, vel succus Smyr-
nii, vel Apii.

Pro Galbano, Sagapenum.

Pro Sagapeno, Gummi Cedri, Pini; vel
Opopanacis dimidium.

Pro Ammoniaco, Propolis, siue sordes
Alueariorum.

Pro Opopanace, Ammoniacum, vel Gal-
banum, vel Bdellium; maximè cum
emollire volumus. Galenus vsus est Pro-
poli in externis.

Pro Manna Turis, cortex cui adhæret ali-
quid Turis.

Pro Ture, Mastiche, & Resina Pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum.

Pro Terebinthina, Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata,
aut frixa, vt docet Dioscorides.

Pro Cupressina Resina, Laricina.

Pro Abietina, Resina Pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix oleo dissoluta, vel
Pix

Pix ex Oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto, Pix & Bitumen.

Pro Mumia, Pissasphaltum.

Pro Asphalto, Petroleum, vel Gagates; & contra. Et carbones petraei à terræ visceribus, quibus fabri ferrarii vtuntur.

Pro Lacca, Myrrha.

Pro Adipe Vrsi, Vulpis.

Pro Adipe Anseris, Anatis, vel Gallinarum.

Pro Adipe Capi, Gallinæ.

DE MINERALIBVS.

Pro Antimonio, Plumbum vstum; & contra: Auicenn. & Stannum vstum.

Pro Lithargyro, Plumbum vstum, Molybdæna.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro Flore Aeris, Ærugo.

Pro Spodio, Antispodium ex Myrto, Lentisco, Olea, Oleastro, Malo Cydonio; vel Cornu cerui vstum.

Pro Pompholyge, Spodium Dioscoridis.

Pro Cadmia, Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum, Auripigmentum; & contra.

*De Succedaneis vtriusque Behen,
ex eodem Lobelio.*

Cum radice Behen albi & rubri destituamur, necessarium Succedaneo vtendum.

In cordi dicatis medicaminibus, vt Diamoscho dulci & amaro Mesuæ, & aliis similibus, radices vtriusque Buglossi substituendæ: In medicamentis ad Venerem, Horminum, Satyrium, Scincus, vel radices Pastinacæ satiuæ & siluestris Dioscoridis, siue Dauci siluestris Galeni, & Offinarum; Actuarii exemplo, qui eas Benhen substituit in Diasatyrio. De his plura in Plantarum Observationibus aut Illustrationibus nostris, aut Aduersariorum altera parte.

De Ben, siue Balano Myrepfica in Aduersariis egimus pag. 414.

FINIS

GVILIEL.

GVILIELMI
RONDELETII
MEDICI
DE
THERIACA
Tractatus,

ex ultima MATTHIÆ LOBELII
recognitione.

THERIACA MAGNA

ANDROMACHI.

GVILIELMVS RONDELETIVS *Lectori S.*

CVM antiquissima ac nobilissima Theriacæ Antidotus à quibusdam dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot à Nicolao Preposito annotata, & aliquot minimè animaduersa. Quamobrem plurimum me rogârunt, ut veterem illam ac vulgatam Editionem recognoscerem. quod etsi mihi difficillimum esse probè perpenderem, & planè immensi laboris; nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare: tum quia sanctum esset quod tam instanter peterent, tum etiam Reip. admodum utile ac necessarium; cum omnia nostra studia & labores eò spectare debeant, ut Reip. & cæteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamenta, quæ *ἱερὰ χεῖρας* appellant, fideliter præparentur, atque ex selectissimis simplicibus ad communem omnium utilitatem componantur; quod hoc hætenus, proh dolor, quorundam ignorantia ac incuria factum non

non est: quo fit, ut verissimum sit carmen
Homeri, Odyss. d.

Φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ
ἢ λυγρὰ.

Quam ob causam, Lector optime, te ad
meliora quodammodo reuocare videmur,
dum pro viribus adnitimur veterem illam
Andromachi traditionem ad germanam
Græcorum lectionem emendare. Et ne
existimes tibi à nobis imponi, consilium
fuit quibusdam annotatiunculis reddere
rationē cur à tam vulgata illa descriptio-
ne recedamus, idque addendo aliqua quæ
noua forsàn tibi videri poterunt; ac expun-
gendo quæ numquam ab Andromacho ex-
cogitata fuisse. Sed vnum abs te peto, ut
ne veteri rubigini addictus hæc sine ratio-
ne improbare velis, nī prius apud te probè
examinaueris, quæ prodesse & iuuare so-
leant.

Cum igitur variæ sint Theriacæ descri-
ptiones à diuersis Autoribus traditæ, in
tāta rerum varietate difficilis erat electio:
omnes tamen ad veram illam Galeni le-
ctionem contulimus, cum easdem omnes
truncatas & vitiatas offendissemus: hanc-
que veram ex Antidoton libro secuti su-
mus: quæ etsi perfectior videtur; aliqua
tamen desiderabantur iniuriâ temporis
omissa, quæ nos pro virili restituiimus ex
Galenī, Pauli, Aëtii, Auicennæ, Actua-
riique

512 GVILIEL. RONDELETTI
riique locis, vt postea in Annotatiunculis
declarabimus.

Nostre autem tempestatis docti quidam
impossibile quodammodo existimârunt
hanc Theriacæ confectionem absolui pos-
se; his moti rationibus: tum quòd Vipe-
ras non haberemus, quæ sanè hoc in ne-
gocio primas tenent: prætereà Balsamum,
Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham,
Rhaponticum, Calamum aromaticum,
Phu, Nardi Spicam, Pentaphyllon, Schœ-
nanthum, Dictamnium Cretense, Sigil-
lum Lemnium, Thlaspi; tum quòd om-
nibus incognitum dicunt Scordium. miror
non addidisse Malabathrum, Acaciam,
Acorum, Bitumen Iudaicum, Opopana-
cem, Galbanum, quòd non nisi adulte-
rata aduehantur, vt quibusdam placet. Sed
nos eorum rationibus faciemus satis. Ab-
surdum enim est illa medicamēta inutilia
existimare, quæ à Galeno in vsum trahun-
tur, etsi non omnia adsint. Multa siqui-
dem ipsemet Gal. suo tempore desidera-
bat, in quorum locum ἀντιβακλόμυα pro-
ponebat. Enimuerò si Gal. pro Cinnamo-
mo Cassiæ duplum ponendum iussit, imò
& Phu; & pro oleo Sabino, oleum anti-
quissimum; pro Omphacino, oleum pa-
ratum cum foliis oleæ, quid prohibet Aco-
rum poni pro Amomo, quum Acorus cum
Amomo similem facultatem obtineat? pro
Dicta-

THERIACA MAGNA. 31

Dictamno Pulegium? quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam? pro Rheopontico Rhabarbarum? pro Te-
rebinthina Mastichen? pro Viperis Elo-
pes, Ophies? Sed quid moror? Clario-
ra sunt, quàm vt demonstratione aliqua
egeant.

Consultiùs itaque ab his cauillatoribus factum esset, si tantum operæ locarent in in inueniendis Succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare; & quam prauam opinionem solent impe-
ritæ multitudini tradere, omittant.

Tempestiuum nunc videtur ad Simpli-
cium declarationem veniamus, hoc vnum præmonentes, pondera non respondere ponderibus Andromachi iunioris, vel De-
mocratis: nam Democrates drachmas duas tantum Polii, Sefeli, Thlaspi, & aliorum, vsque ad Cardamomum ponebat, vitupe-
rabatque illos qui constituerent quatuor; quod tamen ferè omnes qui de Theriaca scripserunt, faciunt; quemadmodum Gal.
Paulus, Aëtius & Auicenna, quos secuti sumus. At de diuersitate ponderum vide Gal. de Theriaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medica-
mentum dicta est, quòd valeat aduersus
Meia, id est, bestias venenosas; non au-

Y 5 rem,

tem, vt quidam existimant, quòd Viperas
 (ita sumpto nomine ob excellentiam, sed
 satis improprie) reciperent; nam ante-
 quam additæ essent Viperæ, etiam Theria-
 ca dicebatur: huc accedit quòd multæ sint
 Theriacæ descriptiones, vt iam diximus,
 apud Galen. in Antidotis, quæ Viperas
 non habent. Non igitur à Viperis, sed ob
 effectum ita fuit appellata. Possiet tamen
 defendi, Theriacam etiam dictam fuisse
 à Viperarum carne. Cæterùm hæc Theria-
 ca Galene, non Galeni, nominatur, aut si
 mauis, *χαλκήνη*, id est tranquilla, vel tran-
 quillitatem afferens, Autor enim huius
 non fuit Galenus, sed Rex Ponti¹ Mi-
 thridates; qui, vt erat exercitatissimus in
 simplicibus, omnia ea collegit Antiphar-
 maca, flores scilicet, femina, herbas, ra-
 dices, gummi, & cetera quæ valerent
 aduersus virus ferarum, Viperarum, Ca-
 num rabidorum, Scorpionum, Dipsadum,
 &c. nec non aduersus venenum medica-
 mentorum quorundam, vt Mandragoram,
 Cicutam, &c. & ad morbos alios complu-
 res & antiquos. Ex his omnibus collectis
 selectissima & efficacissima selegit, ex qui-
 bus parauit compositionem suo nomine
 nuncupandam; ea est Mithridatium: An-
 dromachus postea (qui videtur inter omnes
 exactissimam calluisse normam compo-
 nendi medicamenta) eam correxit & emen-
 dauit;

Theriacæ Magna. 315

dauit; addiditque Viperas, *χαληνή* que vocauit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & meritò quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis nomen, quàm quod sedat dolorem? Qui à Cane rabido demorfi sunt, aut Vipera, aut alia fera venenata, multum torquentur, multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat; magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, vt iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedii efficacius quàm hæc Theriaca, siquidem fuerit recens. Febres quartanæ solo vsu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est, curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat, symphoniâ iunctis.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus, quàm antea facere solebant: nam sine delectu Pharmacopolæ Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliorē, melius est cōfici eos ex Scilla, præsertim cū nobis facultas sit. Si Scilla careamus, Pancratio vti possumus eius loco, sed in maiore dosi; vt Cassia pro Cinnamomo: cū verò adest Scilla, sumatur Scilla. Cæte-

rumpastilli hi fieri debent ex carne Scillæ,
 & spissari farina Orobi, quæ valet aduer-
 sus venena, & conseruat Scillam à putre-
 dine suo amaro. Pharmacopœi eos sole-
 bant parare cum pane asso, aut cum Vi-
 cia, cum non nossent Eruum, vt nec adhuc
 omnes nôrunt. Cùm enim nuper Auenio-
 ni effemus, & medicamentum præscrip-
 sissimus Nobili à Monlau, in quo Eruum
 desideraretur, iussi Pharmacopolâ adferre
 Eruum, atque is Viciam attulit & Apha-
 cem; cùm neutra illarum sit Eruum, quod
 amarum est & tenuium partium; Vicia ve-
 rò dulcis & emplastica. Porro Erui duas
 constituunt species: Aliam enim candi-
 diorem faciunt, aliam ruffam. Eruum est
 quod vulgò *des Ers* vocant, in Gallia Narb.
Esse. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea
 sumenda est æstate, præsertim Iunii ini-
 tio, ad parandos hos pastillos; tunc enim
 multum succi habet: si hyeme legatur, non
 valebit: sub Canicula verò venenum est,
 habet enim tantam acrimoniam, vt æstu
 correpta in venenum vertatur. Sumenda
 itaque est vere, aut æstatis initio. Ea lectâ
 inciditur frustulatim more ceparum, non
 quidem cultro aut instrumento ferreo, sed
 arundinaceo, aut osseo.

Maiores nostri soliti erant parare P A-
 STILLOS THERIACALES ex Ser-
 pentibus communibus, cùm Viperas non
 habe-

haberent. Nec omnino certè vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes, sed Viperarum vis est efficacior. *Ophidia* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ curari non possunt. Medici verò *Ophidia*, quæ morfu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquè nocent, appellant; sub quo nomine & Aspides, Elopes, & Ceraustes comprehendunt. Quamobrem non erit absurdum Trochiscos Theriacales dicere, cùm ex feris conficiantur, quæ & facultate sua iuuant, quemadmodum Viperæ, & si ausim dicere, conuenientiores sunt. præter enim id quòd calefaciendi & exsiccandi vim habent, aduersus angues nostros peculiariter iuuant. Nam Theriaca, vt autor est Galenus ad Pisonem, olim citra ferarum commixtionem confectum medicamentum similiter ad eiusmodi mirificè faciebat: Sed postquam Andromachus Viperas commiscuit, ad morsum Viperarum medicamentum fuit efficacius: imò, si credamus Galeno, lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compositio aduersus plurima venena valet, præter Viperarum ictus. Nihil igitur habuit Theriaca additis Viperis, quàm quòd ad Viperarum morsus sit efficacior. Sic nostrum medicamentum efficacius erit ad morsus Serpentum, cùm nullum nobis periculum

318 GUILIEL. RONDELETTI
immineat à Viperis. Adde quòd pingue-
dinem Serpentum quotidie experimur plu-
rimùm valere, & carnes non plus veneni
in se continere quàm olim haberent Vi-
peræ, si debito modo adhibeantur, & qua-
les oportet capiantur. Nam & in capiendis
delectus seruandus est, quemadmodum
& in Viperis: vt quæ prope mare degunt,
Aspis sunt; & quæ in aquis, excrementose;
& quæ vtero gerunt, repudiandæ. Quas
æstate venantur, vel hieme, nos Elopes
vel Angues bene nobiles in vineis degen-
tes, Vere captos eligimus, non diu asser-
uatos (vt solent facere Pharmacopolæ)
& præparatos, vt ars iubet, cum pane asso
Trochiscos conformabimus: sic seruatos
& exsiccatos, vt neque situm redoleant, ne-
que cariem senserint. Quòd videatur Do-
minis Doctoribus dosin augendam esse,
quia imbecilliores sint, non improbo:
quòd si quis Viperas nancisci possit, vt
iam facimus; eas capiat, & angues omit-
tat. Paulus Ægineta etiam de Viperis lo-
quens, *ὄφις* dicit: Ea autem locutio esse
videtur per excellentiam, quo commune
aliquod vocabulum rei singulari attribui-
mus: vnde & *ὄφις* Viperas vocat. Cùm
autem simpliciter legitur *ὄφις*, de Vipera
intelligendum est, quia præstantissima
inter serpentes est. Vnde & in Theriaca
assumenda; non quòd remedio egeamus
aducr-

aduersus illarum morsus, siquidem in nostris Regionibus non reperiuntur, sed ob alias Viperæ facultates: desiccant enim vehementer, calefaciunt, & visum acuunt. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Piætones habemus; quicquid dicant qui id negant: Certissimum enim signum est Viperæ, & nota certissima, si viuum animal pariat, vt inter pisces Galeus; vnde & nomen habet, vt scribit Aristoteles, & experti sumus in nostris ædibus: Adhæc Viperarum descriptio tam exactè illis conuenit, vt nihil magis; & maxime ea quæ tradita est ab Aëtio, viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Vt vnam è multis notam adferamus: statim in caudam desinunt, quam crassissimam habeant inter reliquos serpentes (præter Amphisbænam, quæ aded crassam habet vt bina putetur habere capita:) omnes denique notæ feliciter reperiuntur in ea. At dicat aliquis: Elephantiasin non curat, vt scribit Galenus. Esto. Si mentiri voluit Galen. quid tum? neque enim verisimile est tempore Galeni curari potuisse Lepram iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non ideo præstare, quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida; Nugæ: si enim venenum retinent, cur non & alias facultates? Nemo igitur dubitet, quin veræ Viperæ nostris

tem-

320 GVILIEL. RONDELETTI
temporibus reperiantur.

Porro vt conficiantur Pastilli Theriacales, præparatione omiffa, hoc tantum ex Gal. addam, melius effe paulo antè captas fumere, quàm diu retentas: nam quæ diutiùs retentæ fuerunt, venenofæ sunt magis, vt ex hominibus ieiunis conicere licet.

Andromachus MAGMA HEDYCHROON, ita à coloris iucunditate appellatum, non Trochiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus falsò putauit, desiderat. Multo fatius fuiffet, fi Trochiscos Alindaracorum Auicennæ posuiffet, vel Trochiscos Hedychroi, quos annotauit in Antidotario, qui etfi Tamaricem recipiant, Asphaltum desiderent; magis tamen accedunt ad Hedychroi compositionem quam hîc constituimus ex Gal. lib. ad Pamphiliannum. Hæc enim paratu facilior est, & clarior, & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione scripta est, quæ Maron & Amaracum desiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nisi illa sit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant; quam ob causam cōsultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro: quòd si per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum, pro Maro poni potest Sysymbrium; sunt enim eiusdem facultatis, vt Dioscorides docuit. Quantum verò differat Hedychroon
magma

THERIACA MAGNA. 521

magma à Trochiscis Diacoralli, fidem facit utrorumque collatio: hi enim Papaver, Pedem columbinum, ut alia omit- tam, recipiunt, quæ non sunt in Hedy- chroo. Non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad ἀνθράκη atque Piper Longum & Al- bum: sed quia omnes sic habent, nolui immutare, & 3 xxiiij indidimus, quam- vis aliqui sex tantum: Paulus tamen, Aë- rius & reliqui, xxiiij censent ponendas; & Nigrum, non Longum, ut in quibus- dam Exemplaribus legitur, & in carmi- nibus Andromachi. Neque tamen impro- barem si quis Longum sumat; tum quia in carnibus Longum est, tum quia Anti- dotis, si Dioscoridi credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIUM, vel **MANDRAGORA**, vel, **HYOSCYAMUS** addi solent in Antido- tis, quia incrassando constringunt mea- tus, ne Venenum ferri possit ad cor; & sic iuvant operationem Antidoti. Eodem planè modo Bolus Armena & Terra sigil- lata lentore suo & crassitie prohibent vim Veneni ad cor deferri, non autem pro- prietate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, ut Mos- chus, Ambra, non conveniunt, quia fa- ciunt citò penetrare venenum ad cor: sic Cicuta cum vino absorbta occidit citissi- me;

mè; per se verò tardiùs.

ROSARVM, remotis vnguibus, drachmas xij ponimus : Auicenna xxiiij ponit.

SCORDIVM, quod Fuchsius putat omnibus incognitum, nunquam antea in aliqua Antidoto positum, apponendum censuimus (quanquam tamen opera & diligentia doctiss. viri D. Guiliel. Pelliterii, Mompeliani Episcopi vigilantissimi, primum in Gallia iam à decem annis cognitum sit) & non Allium sylvestre, vt vulgo Pharmacopolæ facere solebant. Stultum enim esset *Σκόρδιον ἄγριον*, id est Allium sylvestre, vt Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri, quibus incognitum fuit; neque grauiter peccârunt in hoc simplici. est enim Allium sylvestre, Theriaca Rusticorum. Vtinam in aliis Succedaneis tam bene iudicassent! Non est tamen conferendum Allium cum Scordio: Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinem, quàm vel Myrrha ipsa, vt videre est apud Gal. lib. de Antidotis, qui eius inuentionem declarat. Quis autem, nisi stultus, dicat Succedaneis esse vtendum, cum propria habeamus? Scordium enim copiosissimè per totam Galliam nascitur. Reiiciendum itaque Allium.

SEMINIS NAPI; & rectè: quamquam

quam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.

IRIS ILLYRICA ea debet apponi
quæ Venetiis affertur.

AGARICVM sumatur candidum, le-
ue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis
in discrimen vocatum est, cum dicant nos
vero Cinnamomo carere; ac id quod pro
Cinnamomo ostenditur, potius esse veram
Cassiam: nos tamen putamus esse Cinna-
momum; etsi non sit illa species tanto-
pere ab Antiquis laudata: quam ob cau-
sam nos istius Cinnamomi ꝓ xxiiij po-
suimus (etiam si nonnulli ꝓ xij tantum
ponant) duplici nomine: tum quia in
quibusdam exemplaribus xxiiij drachmas
Cassiae scriptum legimus, ut etiam in se-
cunda descriptione Auicennæ; tum ut
omnibus fieret satis: nam si Cinnamo-
mum esse negent, non possunt improbare
consilium nostrum, cum Gal. de Compos.
Pharmacorum doceat his verbis: Necessa-
rium nobis est, ubi Cinnamomo caremus,
Cassiam optimam coniiciamus, aut plus-
quam duplo Cinnamomi pondere, aut
omnino non minus. Sed Cinnamomum
verum habemus. Si cineritium illum co-
lorem non habeat, in causa sunt merca-
tores, qui eius superficiem abraderesol-
lent, colorem naturalem auferentes. At
odorem Rutæ non habet. Nec habere de-
bet.

bet. Error enim est in Diosc. nam pro *παραύλισσα* legendum est, *οεζαύλισσα*: quod facile probati potest ex eodem Dioscoridis alio loco, ubi ait Amomum habere Origani odorem. Hinc enim luce clarius colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre; aliumque textum corruptum esse. Et quanquam Dioscor. dicat diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassie; Gal. tamen diuersæ est opinionis; asseritque se vidisse in capsa cuiusdam mercatoris ramum vnum, cuius altera pars Cassia esset, altera Cinnamomum.

GLYCYRRHIZÆ SVCCVM apposuius, quia efficacior est quam radix ipsa; etsi Auicenna in tertia descriptione radicem ponat: & vere poni potest succus; ne timentum est de succi adulteratione. Nam tanta est copia Dulcis Radiculæ, ut parui veneat: Et etiam cum Theriacâ componere volumus, expressè succum extrahere debemus.

OPOBALSAMVM sincerum ad nos non adfertur, sed multis modis adulteratum: quin etiam si adulteratum non esset, recens non est, sed antiquum. nam cum ex regione longinqua petatur, non potest non esse antiquum; est siquidem antiquum, si annum excesserit, fitque inutile. Etsi nonnulli dicant in Nouo Orbe reperiri, incertum est an verum sit: succedaneo itaque vtendum. Quid verò substituemus,

stituemus, cum succedaneo opus sit? alio-
 qui manca esset Compositio & corrupta.
 Non sequemur hac in re consilium Maio-
 rum nostrorum, qui Oleum Laurinum
 pro Opobalsamo poni docuerunt. Opor-
 tet enim succedanea & viribus & tempe-
 ramento respondere, ut doctissimè à Gal.
 monstratum est. Sed oleum Laurinum ca-
 lidius multo est Opobalsamo, cum oleum
 Laurinum inter calidiora adnumeretur,
 quod ex fructu potest cognosci: solet
 enim oleum expressum eiusdem esse tem-
 peramenti cum fructu ex quo exprimitur.
 At folia & fructus Lauri desiccant & cale-
 faciunt vehementer, plus etiam fructus;
 ergo & Oleum: Opobalsamum vero desic-
 cat & calefacit in secundo excessu tantum.
 Igitur non respondent. Adhuc Opobalsa-
 mum tenuium est partium, Oleum verò
 Laurinum crassarum: Opobalsamum ven-
 triculum roborat; Laurinū autem oleum,
 ut ait Diosc. *ἡ δὲ ξαυτὴν τῶν δὲ πρὸς τὴν*, id est, po-
 tum nauseam facit, & lædit ventriculum,
 non alia ratione, quàm quòd ventriculo
 aduersatur: idem autem efficere Opobalsa-
 mū, negandū est. Non enim est oleum, sed
 succus Balsami. Vnde autem id natū sit, ut
 Oleum Laurinum in Antidotis poneretur?
 Puto hinc esse natum, quòd olim Oleum
 parabant cum Myrrha & Staete, ut Diosc.
 docet. Extrà adhiberi non prohiberem, ut
 etiam

etiam oleum Irinum: quamuis in versione
 Vallæ & multis exemplaribus Græcis
 (falsò tamen) Laurinum legatur. Balsa-
 mum arte compositum reiicitur. Errorem
 indicauit ante 114 annos Santes de An-
 dronis de Pisauro Medicus in hac parte
 Alexipharmacôn diligentissimus & pro-
 batissimus. Post eum Nicolaus Præposi-
 tus, qui Medicorum Mompelianorum
 mentionem facit, tanquam autorum huius
 hæreseôs. Alii ex semine Citri & Corallo
 ἀντὶ κακῶν ὀνύχων conficiebant, sed ineptè:
 nam quamuis semen Citri valeat aduersus
 venena, reperiuntur alia multo efficaciora.
 Alii asseriebant fieri debere substitutum
 ex Myrrha destillata: quod expertum fuit;
 & ex destillatione oleum exceptum, sed
 usque adeò fœtidum, ut nemo ferre posset.
 Omnibus itaque reiectis, substituam Sta-
 ctên, ex præscripto antiquorum, Galeni
 scilicet, Pauli, Aëtii, qui asserunt easdem
 Stactes vires & Opobalsami. Est autem
 Stacte nihil aliud, quàm Myrrha liquida,
 &, si Diosc. credimus, est pinguiissimum
 Myrrhæ recentis cum aqua exigua rusæ,
 & prælo expressæ, proportionem respon-
 dens Myrrhæ. Myrrha autem secundi est
 ordinis excalescentium & exsiccantium,
 sicut & Balsamum. Adhæc & vulnera con-
 solidat, quod facere Balsamum creditur à
 neotericis Medicis, quanquam Gal. nul-
 lam

istam eius mentionem faciat. Idcirco au-
 tem hîc positum fuit, quòd aduersus ve-
 nenata animalia valet. quod ex eo colli-
 gere licet, quòd vbi nascitur Balsamum,
 nequeant habitare Serpentes aut alia ve-
 nenata animalia. Qui de omnibus dubita-
 re solent, Myrrham istam reiiciunt, quia
 parùm respondeat descriptioni, tùm ma-
 ximè quòd *ἰνώδης*, id est, odorata non sit,
 vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem
 Myrrham dicimus esse, non Trogloditi-
 cam vel Amineam. Et quòd non sit odora-
 ta, in causa est quòd ab ea expressa sit no-
 bilissima Staete. Nam, vt Diosc. docet,
 ex pinguibus exprimitur pingue & odo-
 ratum. Minùs etiam odorata est, quia ex
 calentibus & aridis locis adfertur. Neque
 tamen dicendum est talem esse *ἄπυρον*, id
 est, infirmam & ignauam, vt in quibus-
 dam exemplaribus legitur: vbi legendum
ἄορμον, id est sine odore; illamque amit-
 tere suam commendationem, non ad sa-
 nitatem sed ad voluptatem. At hi qui di-
 cunt nos non habere veram Myrrham, fal-
 luntur, aut in hoc, quòd, cùm Diosc. di-
 uersas notas diuersis speciebus assignârit,
 omnes eas in vna specie reperiri velint,
 alioqui veram negent esse Myrrham: aut
 quòd dicât *ἰνώδην* non esse, vt vult Diosco-
 rides. Sed id planè negamus. Sumitur au-
 tem vox *ἰνώδης* pro eo quod bonum spirat
 odorem.

528 GUILIEL. RONDELETTI
odorem. In hoc autem error est. Nam
Diosc. & alii plerique scriptores *εὐώδης* su-
munt pro eo quod multum olet, siue bo-
num spiret odorem, siue malum. Signifi-
catio autem vocabulorum non aliunde
petenda est, quàm ab eo authore qui rem
ipsam describit; quemadmodum Diosc.
vt dixi, hoc modo sumit *εὐώδης*, vt videre
licet cap. de Pice arida, vbi ait debere esse
puram, pinguem, *εὐώδην*. Nemo autem in-
terpretabitur intelligi de suaui odore, sed
forti & graui, quia quæ igne eliciuntur
non possunt non fumum redolere & re-
trum odorem spirare. Idem esto iudicium
de Blatta Byzantia, quam dicunt esse *εὐώ-
δην*. Sin hæc ratio non placeat, dicemus
Veteres non adeò delicatos fuisse atque
fumus, & quod nobis malè olet, vt Myrrha,
illis benè & suauius oluisse: quod inde
probari potest, quòd in suis vnguentis ad
delicias paratis, Galbanum admiscebant;
quod haud dubiè foetidi admodum est
odoris.

De CROCO & GINGIBERE nulli
dubitant.

Reclamant Sceptici Medici, quòd pro
RHEOPONTICO Rhabarbarum (se-
quuti Auicennam) ponimus. Non autem
temerè id factum est. nam' cùm Rhapon-
ticum hoc Pharmacopolarum nullo modo
respondeat picturæ Rheopontici, satius
est Rha-

est Rhabarbarum vocatum coniicere: quanquam istud Centaurium maius à viris doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Rhaponticum enim & Centaurium hoc maius easdem ferè habet facultates. Componitur Rhaponticum ex diuersis partibus: ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio: habet etiam adiunctam caliditatem; subacre enim reperitur, si plusculum mandatur, qua facultate potest aluum ducere: quinetiam aëreæ cuiusdam est substantiæ particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis, sanguinem exspuentibus vtile est, & orthopnoæ. Centaurium maius in gustu contrarias qualitates habet; ita in vsu contrarios effectus præstat: gustu itaque acre simul & adstringens apparet, cum leuiuscula dulcedine: quæ omnia in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest iisdem reiicientibus sanguinem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ: orthopnoæ: quamobrem medicamentum imbecillius non erit, si pro Rhapontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhaponticum & Rhabarbarum sola regione differunt & leuitate: vt Rapæ quæ apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili, differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dicēs; alterum magis rarum est, alterum densius.

Z

densius.

530 GUILIELM. RONDELETTI
densius. Respondeo, id facere copiam vel
inopiamimenti: aut dicendum, Mercatores
qui aduehant Rhabarbarum, illud comprimere, cum recens est, ut minus loci
occupet, & densius reddatur; quod sci-
ant densum laudabilius esse. quod facili-
ter fieri potest: si enim compressam radice-
m desicces, minor erit, minusque spa-
tium occupabit, nec diminuetur quanti-
tas. Si verò Rhabarbarum nostrum non sit
veterum Rhaponticum, quid erit? Qui-
dam aiunt esse radicem Centaurii maio-
ris, & Galenus ait radicem Centaurii ma-
ioris easdem facultates habere quas Rha-
ponticum.

Malè negat Manardus, nos verum
PENTAPHYLLON habere: nam passim
nascitur, & omnino descriptioni respon-
det. Est præterea alia nota à Theophrasto
tradita, quæ nobis est certissimo indicio
nos Pentaphyllon habere: scilicet quod
Pentaphylli radix exsiccatione fiat qua-
drata: quod sanè illi proprium est: con-
uenit enim soli Pentaphyllo quadratam
fieri exsiccata radicem; quæ nota falle-
re nos nequit. Sunt ex Practicis qui pu-
tent Tormentillam esse Pentaphyllon:
quod non improbo; cum Diosc. det illi
radicem oblongam, Veratro nigro crassio-
rem, & propiùs accedat ad veram Penta-
phylli descriptionem. Sunt qui Hepta-
phyllon

531
THERIACA MAGNA.

phyllo vocent, à numero foliorum; quod & in vulgari etiam inuenies. Diosc. etiam ait habere quinque folia, aliquando plura. Verum quamcumque assumpseris, hanc ne Diosc. an illam Theophrasti, non errabis: ambæ enim valent aduersus venena. Potest itaque sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllo pro Tormentilla.

NEPETAM [aut Nepitam] Latini, Græcorum Calamintham appellant: quæ de causa Galenus miratur quod Andromachus, cum Græcè scripserit, hoc tantum nomen Latinum addiderit. At hoc *παιέ-γας* dictum sit.

MARRUBIUM lippis & tonsoribus notum est. eam ob causam prudens prætereo.

Danda est operam ut SELINON quod in petris nascitur recuperemus: non quod ob eam causam Petroselinon dictum velim, sed quia maioris est efficacie, & propius accedit ad Macedonicum, ob amorem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam, ut Gal. de Petroselino scripsit, Quod si Estreaticum desideres Petroselinum, nihilo tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, si alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem: Non enim, inquit, si mortiferis venenis, si venenatorum moribus aliud ab

Estreatico Petroselinum minùs congruit, propterea reliquis etiam morbis, vt torminibus, ventriculo debili, hydropisi, & id genus aliis segniùs opitulatur, quos in primis sanare Theriaca promittit. Aliã præterea causam assignat, cùm inquit: Adhęc Estreaticum Petroselinon amarum etiam plus æquo Theriacam facit, præsertim cùm recens adhuc imponitur: nam vt acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, vt alibi docuit, suauitas in medicamentis quæ deglutiuntur, est spectanda, cùm in se habeat multa amara. Auicenna semen Apii montani posuit in tertia descriptione. Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatus, & apud fontem Vaucluse.

STOECHAS satis nota est: agroque Mompeliano frequentissimè prouenit.

COSTVM nonnulli in discrimen vocant. Certissimum autem est, nos duas habere Costi species: primam scilicet (quam Zedoariam vocant vulgò) & tertiam quam nemo negabit eam esse quæ ad nos adfertur, præsertim cùm acerrima sit.

De PIPERE Albo tantùm sciendum est, Galenum ibi Piper Album legere, vbi Auicenna Nigrum; & econtrà. Piper Album & Longum magis medicaminibus & Antipharmacis conueniunt: Nigrum
verò

THERIACA MAGNA. 533

verò eduliis & alimentis condiendis. Piper Longum facillimè adulteratur. Adulteratum aut cognoscitur, si aquâ inspersum dissoluatur. Non reperitur hoc Piper Longum in descriptione ad Pamphilianum.

DICTAMNUM in Creta tantum crescere, & inde CRETENSE dici, existimant Autores, quòd sic depictum sit à Diosc. Cretensis herba est, acris, levis, Pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaque lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert: (et si apud Paulum falsò legatur *Διτάμνος ἄνθος*.) Pharmacopolarum *Ψυδεδιτάμνος* & florem & semen profert: quam ob causam malumus succedaneo uti, quàm incognita illa radice qua pro Dictamno utuntur Pharmacopola. Pulegium itaque pro Dictamno iniecimus, quia nulla est herba quæ propiùs accedat ad Dictamni facultatem ipso Pulegio, docente ipso Diosc. Præstat omnia quæ sativum Pulegium, sed efficacius multo: & Gal. Dictamninum tenuiore essentia constat quàm Pulegium, cetera illi simile. Quòd si per omnia simile, haudquaquam malè pro Dictamno recipietur, cum ipse Avicenna in omnibus descriptionibus pro Dictamno Pulegium posuerit. Præterea à Nicandro (in suis Theriacis,) Dioscoride, Serapione, Paulo Z 3 & Aëtio.

534 GUILIEL. RONDELETTI
& Aëtio ad morsus venenatorum com-
mendatur.

Non mireris, candide Lector, si pro
FLORE IUNCI ODORATI, quem
vno vocabulo Schœnanthon vulgus ap-
pellat, herbam ipsam monstremus. Audis
Gal. Adhuc Iuncum ex Arabia petendum
imponere præcipit, nescio qua de causa,
Schœnanthum, id est, Iunci Florem à
vulgaribus appellatum. Nos siquidem,
cùm Florum copia non adsit, Iunco uti-
mur ex Arabia comportato, cuius summi-
tatem Cameli sæpenumerò abroserunt: iu-
cundissimè namque hunc Iuncum Came-
li pascuntur, secus vias ibi plurimum
nascentem. Ex his disce, multa fuisse sim-
plicia tempore Galeni, qualia nunc sunt.
Non itaque peccant, qui Iuncum ipsum
huic compositioni imponunt, ut ex Gal.
loco iam citato patet, & Diosc. qui ait
radicem & herbam eiusdem esse facultatis
cum flore & efficacie. Imò si flores adfer-
rentur, abiiciendi essent & postponendi
Iunco ipsi. nam cùm sint admodum te-
nuium partiū, eorum vis facilè euanesceat;
& priusquam ad nos peruenissent, planè
inodori redderentur.

DE TVRE nihil in præsentiarum di-
cemus.

Quamquam TEREBINTHVS hoc
agro Mompeliano frequens sit, non ta-
men

men Terebinthinam habemus : & quem-
admodum Lentiscus , hinc alioqui fre-
quens , Lentiscinam non stillat , ob Solis
imbecillitatem ; sic nec Terebinthus Te-
rebinthinam. Sed , Galeni doctrinam se-
cuti, pro Terebinthina Abietinam conie-
cimus. nam 4^o sanitatis tuendæ sic scrip-
sit: Quod si copia Abietinæ non adsit, eius
loco Terebinthina. Cum pro Abietina
Terebinthinam ponendam doceat ; sic
econtra pro Terebinthina Abietinam re-
cipiemus. Quod evidentiùs monstrat
alio in loco, his verbis : Quinetiam in
penuria Terebinthinæ tum *ἐκ τῶν κρημίων*
ὕδα, tum frictam commodè admisceas ;
non minùs etiam iis & Abietinam immit-
tas. Quod si fortè quis hanc Resinam Ab-
ietinam esse neget, Mastichen ponemus,
quæ inter Resinas principatum obtinet,
teste Gal. vel (vt Diosc.) Terebinthinæ
respondet viribus. Fidem forsitan auge-
bit, quod in Paulo legatur, *Τερμυθίνης*
Μαρίνης, quasi vellet dicere Resinæ Masti-
chinæ, vel Mastichen & Terebinthinam
imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTULAREM vocat
Cassiam Ligneam, aut Cinnamomum
crassum ; ne qui existiment eum intellige-
re Cassiam illam Fistularem Arabum, quæ
vim habet laxandi ventrem. Est enim Cin-
namomum crassum efficax, vt odor & sa-

536 GVILIEL. RONDELETII
por monstrant. Nec absurdum est, dimi-
dium Cinnamomi pro Cassia constituere;
cùm pro Cinnamomo duplum Cassiæ po-
nendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet damnare, quòd
spica non sit, sed potius radix. Nam Gal.
his verbis docet esse radicem: Iubet dein-
de Andromachus Nardum Indicam impo-
nere, quam ex eo quia Spicæ figuram imi-
teretur, Nardi spicam nominant, quamvis
radix sit. Rursus Damocrates *Nárdos píza*
I' dñs scripsit, non spicam. Indica autem
dicitur, non quòd in India nascatur, sed
quòd in aliquo monte nascatur Indiam
spectante; quemadmodum Syriaca, quæ
in monte Syriam spectante. Eodem modo
& Britannica dicitur (ea est Bistorta vul-
garis) non quòd in Britannia solùm nas-
catur, sed quòd in regione Britanniam
spectante. Ceterùm Nardus Indica cæteris
efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum: quòd
omnibus incognitum putat Manardus,
eo fortasse quòd nunquam viderit. Vt au-
tem verum fatear, non omnibus cognitum
fuit Thlaspi, sed iis dumtaxat qui de re
herbaria bene meriti sunt. Eius descriptio-
nem require in Diosc. Frequens est in se-
mitis Tolosani agri, & aliis plerisque lo-
cis. Temperamento calido est, vt Nastur-
tium.

tium. Auicenna pro Thlaspi, Sefeli habet : at in Arabico Thlaspi legitur. Vulgus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quædam sit, album appellant.

SEME N APII restituimus ex descriptione ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna idem scriptum reperimus, tum etiam in Theriaca Antiochi Philometeros, in medicamento anodyno Κάκιστος dicto : rursus in Zenonis, Aëtii, Galli, Theriacis : quod etsi ut Petroselinum aduersus venena parum aut nihil profit, ad alios morbos non parum iuuat.

Pro MALABATHRO, ut benè à maioribus nostris visum est, ponendam censuimus Spicam. Habet enim Folium eandem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in Succeda-neis. Quod si æqualem vel similem habet facultatem, frustra additur Macis ; cum neque addendum quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum, qua ratione nescio ; quemadmodum & Moschum post Piper Longum.

HYPOCISTHIS etiam sub Lado [aut Ledo] reperitur : quod Cisti species est, longiora habens folia, & glutinosa.

NARDVS nostra CELTICA ea verè est quam Antiqui Celticam vocauerunt.

Z s non

non igitur reiicienda : neque audiendus Marcellus, qui negat Spicam nostram esse Celticam. Rarò autem visitur, quia in summis montibus nascitur, quos perpetua nix ferè obsidet. Radix sumenda.

PRO TERRA LEMNIA sumimus Bolum præparatum, ut Gal. docuit. Neque eam ob causam vituperanda est hæc terra, quòd à Lemno non aduehatur. Est enim hæc terra medicamentosa, lutumque cum aqua ex ea fit, quod habet desiccandi facultatem, & astrictionem non contemnendam, qua catarrhos sistit. Prodest tempore pestis. Ut in summa dicam, malle hæc uti, quàm Terra sigillata egregiè adulterata. Rubrica Lemnia à Galeno vocatur.

Difficilius fuit iudicare, quid pro CHALCITIDE accipiendum esset, cum Atramentum Sutorium (quod *Χάλκανθον*,) *Σῶρον*, *Μίον*, *Χαλκίτης* parum ab inuicem differre videantur. Et quanquam non grauis esset error, si *Χάλκανθον*, vel *Μίον*, vel *Σῶρον*, pro Chalcitide posuissemus (sunt enim facultatis eiusdem) tamen Chalcitin veram maluimus accipere : quam (ut præcipit) assari curauimus, & quod magis spumosum erat accepimus. *Χαλκίτης* Vitriolum Romanum non est, quanquam easdem habeat facultates, sed Chalcanthi videtur species : quæ vendenda est donec nihil viridis appareat; estque *χαλκανθός*, id est, similis

ari.

ari. Vrunt Pharmacopœi Chalcitin donec rubra fiat: sed ineptè illi; non enim vsque adeò est adurenda. Ait enim Galen. vrendam donec fiat cineritia, & amittat viride, vt ostendat quantitatem adustionis. Nos itaque legimus, *toſta*; & non, *uſta*, vt est apud Galenum.

Quid sit AMOMUM, vt ingenuè fatear, ignoro: malo enim meam fateri ignorantiam, quàm studiosis hac in re aliquomodo imponere. Non me lateret, multos fuisse in Gallia & in Hispania, qui se inuenisse glorientur; cùm nihil minùs fecerint. Nam semen illud quod pro Amomo monstrant, inodorum, nigrum, lene, gustu neque acre neque erodens est; cùm debeat esse candidum, modicè rufum, semine plenum, vuarum racemis simile, ponderosum, odoratissimum, acre gustu, & erodens. Nos pro Amomo Acorum posuimus. Amomum, vt inquit Gal. Acoro similem facultatem obtinet. Ergo Acorum pro Amomo nefas non erit ponere. Sunt qui Amomum Rosam [seu Pomum] Hierichontis dicant: quod carè admodum venditur, ob id quòd mulieres fabulentur cōducere ad partum. In Alexandria frequens; & ad nos adueheretur, si pramoti essent mercatores.

Mirabitur aliquis; quòd pro ACORO in omnibus locis Galangam crassam, non

vulgarem illam radicem posuerimus. Sed, quod id temerè factum existimes, sciendum est, hanc vulgarem radicem Acorum non posse esse, tum quia rubra est, & ingrato odore: cum vera Acorus albam habeat radicem, gustu acrem, odore non insuauem, ut ait Diosc. Cum autem hæc omnia in Galanga manifestissimè inueniantur, &, ut Musa testatur, florem croceum & folia Iridis angustiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianā neget esse PHU, Valerianam pro Phu posuimus: non enim valet eius ratio. Phu caulis λεῖον καὶ τρυφερόν, id est, lenis & tener existit: Valerianæ caulis angulosus: cum herba & lenis & quadrato caule possit esse Quod de floribus dicit, similes Narcisso non esse, verisimile videtur: flores tamen habere pallidos, sicut & Narcissus: quod sufficit, cum omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam aut paucam vim habere videtur; & puto semen esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgò vocatas ponendas dixerim, quæ forsitan veriùs sint Carpobalsamum, quàm Carpesium; nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de Antidotis Carpesium dicit esse herbam Phu appellato genere similem; validiorem tamen, atque aromaticum quiddam plus olentem. Et eodem lo-

co : Tenuia quædam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgultis similia sunt ; non semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamum adulterari semine Hyperico simili, quod Terebinthi semen esse videtur, ut ex Theophrasto patet.

Pro ACACIA, Prunellorum succum ponere, non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni ; quia, ut ait Diosc. folia Acaciæ effectus præbent, ut in Succedaneis reperitur succus Lentisici.

BITUMEN IYDAICVM, Græcis Ἀσφάλτης, communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigrum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosin augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphaltum, quod vulgo Mumiam appellant. Pissasphaltum autem mediam facultatem habet inter Picem & Asphaltum : eam ob causam Auicenna & quidam alii pro Bitumine Mumiam ponunt, Asphaltum deprehendes ex odore Trifolii foetidi, quod à Bituminis odore Ἀσφάλτης dictum est. Quod ad nos adfertur, Pissasphaltum est. Cum Diosc. ait probari si purpuræ modo splendeat, non ita intelligendum est quasi velit habere purpuræ colorem, sed quod in sua nigredine splendeat ut Purpura in

542 GVILIEL. RONDELETII
suo colore; aut quod simile sit purpuræ
exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigre-
dinem tendit. Plurimis locis prouenit, vt
in Aruernia, &c.

CENTAVRII TENVIS [aut MINORIS]
folia & flores ponimus, non radices, quas
tanquam inutiles reiecit Galen. & Diosc.
etsi Lumen illud Pharmacopolarum aliter
sentiat.

Ne quis nos reprehendat, quòd ARI-
STOLOCHIAM tenuem, non Clema-
titin aut Rotundam, vt in lib. ad Pamphi-
lianum scriptum est, adiecerimus: non
enim id temerè factum est: Nam in car-
minibus scriptum inuenimus, ἐλεπλίω
ρίζαν Ἀειπλόχην: & ad Pisonem tenuem
dicit. huc accedit quod de Clematiti ait
Galen. Quæ Clematitis appellatur, fra-
grantior est, ita vt ad vnguenta vtantur
vnguentarii; sed ad sanationes infirmior.
Hic autem non ad voluptatem sed ad sa-
nitatem ponitur: tenuis igitur ponenda est:
castigandusque est locus ille, ne parum
cauti fallantur. Interpres Centunculum
vertit: Centunculum autem Latini appel-
lant Gnaphalion. Si autem addatur Gna-
phalion, id erit præter Andromachi, Gale-
ni, aliorumque mentem. Nec interpretibus
semper fides est adhibenda, etiam si Græ-
cè & Latinè periti sint. Malim enim illos
minùs disertos esse, & rerum bene peri-
tos:

tos: hi siquidem solœcismum in nominibus dumtaxat committunt; illi autem in rebus & sæpè in vita. Hic itaque neque rotundâ Aristolochiam, neque Clematitin aut [Pistolochiam, aut] Polyrrhizon, quæ vnguentis parandis aptiores sunt, impone-
mus: sed Longam dumtaxat Aristolochiam, siue Tenuem, quæ ad medicamenta conuenit. Proueniunt autem omnes Aristolochiæ species, quæ quatuor sunt, frequentissimè agro Mompeliano. Quam pro Longa pingit Fuchsius, Clematitis est.

Qui cornicum oculos configunt, hunc CALAMVM ODORATVM reiciunt; non quia inefficax sit, sed quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autem potest, vt Calamus dicatur, eius autem radix tantum sit in vsu, vt de Spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non placet, aliam accipe. Duæ sunt species Calami odorati: Alter, qui à Galeno describitur: Alter in Mæotide nascens, radice subalbida, sine calamis, intus plena & amara, specie Acori: quem Calamum falsò quidam Acorum esse putauerunt; in quorum numero fuit Mæoardus, qui pro Acoro Calamum aromaticum semper ponit. At vtrumque genus Acorum odore superat. Non igitur reicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

XYLOBALSAMVM hoc commune

ve-

verum sit nec ne, incerti planè sumus: nam quicunque de Balsamo scripsere, inter se dissentiunt. Quòd inefficax sit, facile quilibet iudicare potest ex odore, sapore & crassitie partium. Sin autem pro eo ligno incognito & adulterato, Zedoariâ vulgo dictâ quis vti voluerit, sine noxâ poterit. Zedoaria enim calida & sicca est in secundo ordine, vt Xylobalsamum; valet aduersus venena, & pestem. Commode itaque illa vti possumus, quandoquidem temperamento & viribus respondeat Xylobalsamo. Non autem in omnibus sumenda pro Xylobalsamo: sed hîc, quia iam semel in hac compositione posita sunt succedanea eius, maluimus hac radice vti.

De A M A R A C O si Nicolaus Præpositus dubitet, non mirum est; cùm res admodum obscura sit, & ad iudicandum difficilis. Nam Diosc. Plin. Columella, Lucret. Virgil. Diocles medicus, vno ore Amaracum Sampsuchum appellant: Galenus tamen & Paulus diuersas herbas tradunt. nam in 3^o ordine calef. & exsic. Sampsuchum collocât; Amaracû verò in 2^o ficcare & tertio calefacere volunt. Amaracus Galeno & Paulo Matricaria vulgaris est, & Parthenion Diosc. atque vtramque ponemus: quanquam non multum referret si neutra poneretur; nam, vt Gal. testatur,

multi.

multi suo tempore & Marum & Amara-
tum reſiciebant.

Hæc ſunt, Candide Lector, quæ cum
reſtinatione quadam annotauimus. Et hoc
eſto Exemplar eius quæ ex Conſilio Docto-
rum Mompelii diſpenſatur.

Theriaca Andromachi, quæ *αλχημική*, id
eſt, Tranquilla cognominatur.

Rx. Paſtillorum Scillinorum ʒ xlviij.

Paſtillorum Theriacorum

Magmatis Hedychrois

Piperis nigri

Opii ſingul. ʒ xxiiij.

Rosarum ſiccarum

Scordii Cretenſis

Seminis Napæ

Iridis Illyrice

Agarici Pontici

Cinnamomi

Glycyrrhizæ ſucci

Opobalsami ſingul. ʒ xij.

Myrrha, Croci

Gingiberis

*Rhapontici, [non Rhabarbari, ut habet
Cordus]*

Radiciſ Quinquefolii

Nepita, ſine Calamintha montana

Marrubii

Petroſelini Macedonici

Stag.

346 GVILIEL. RONDELETII

Stœchados

Costi

Piperis albi

Piperis nigri [al. longi]

Dictamnus Cretensis

Iunci odorati

Turis

Terebinthina

Cassia [fistula]

Nardi Indica sing. 3 vj.

Poli Cretensis

Seselios

Styracis

Seminis Apii [in aliis deest]

Thlaspi

Ammeos

Chamadryos

Chamapityos

Succi Hypocisthidis

Malabathri

Nardi Gallica

Radic. Gentiana

Anisi

Mei Athamantici

Seminis Fœniculi

Terra Lemnia

Chalcitidis tosta

Amomi

Acori

Phu Pontici

Carpobalsami

Hype-

*Hyperici**Acacia**Gummi**Cardamomi sing. 3 iiij.**Seminis Dauci**Galbani**Sagapeni**Opopanici**Bituminis**Castorei**Centaurii tenuis**Aristolochia tenuis sing. 3 ij.*

*Mellis Attici despumati 3 CL [male 3 pro 3
posita] hoc est lib. xij. unc. vj. alibi Ron-
let. lib. x tantum habet.*

Vini Falerni q. s.

ADMONITVM autem hinc velim Lecto-
rem, vt huius Compositionis norma exacte
contempletur, quæ illi plurimum prodesse
poterit in aliis Medicamentis diiudican-
dis. Omnes enim hinc ferè traduntur
Canones qui in huiusmodi compositioni-
bus tradi solent. E quorum numero pau-
cos colligemus, vt memoria suppeditabit.

Primum itaque in omni Compositione
id obseruandum, vt præcipua & veluti to-
tius medicamenti fundamenta primo lo-
co ponantur, quod hinc etiam obseruatum
est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus.
Iuuat enim plurimum non in Composi-
tionibus solum, sed in reliquis omnibus,
si aptus

§48 GVIL. ROND. THERIACA MAG.
fi aptus ordo seruetur Paraturus igitur me-
dicamentum, in summis digitis habere
debet quæcunque illud ingredi debeant;
& ex his considerare quæ decoctionem fer-
re possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ
decoctionem ferunt, ea primo loco impo-
nat quæ diutius decoctionem ferunt, vt
radices densas & inodoras: Odorata enim
& raræ decoctionem non ferrent: Deinde
ea iniiciat quæ minùs coctionem ferunt,
vt herbas: Postremò quæ nullam omnino.
Præterea quæ simpl. maiori quantitate as-
sumuntur, ea primo loco imponenda: quæ
minori, secundo loco: atque ita deinceps
gradatim; vt in hac Compositione est ob-
seruatum. Eius enim prima dosis est drach-
marum 48. Altera 24. tertia 12. quarta 6.
quinta 4. vltima (melle dempto) drach-
marum 2. Sed & alius Canon obseruandus
est, & hîc obseruatus, nempe: Ea quæ
ad alterationem ponuntur. maiori debere
esse quantitate: quæ verò ad castigatio-
nem, minori. His annexæ sunt Regulæ
generales, ad maiorem institutionem.

THEO-

THEOREMATA
SIVE PRÆCEPTA DVO

*Ordinis aut Dispositionis Simplicium
medicamentorum,*

*desumpta ex libro de Ponderibus
Dom. Rondeletii.*

THEOREMATA duo sunt in hac re
spectanda : quorum vnum, & magis
necessarium, vt imperitiæ iuniorum
Pharmacopolarum subueniatur, à bene
parandi ratione desumetur : Alterum à
quantitate vel dignitate medicamentorum
tam simplicium, quàm compositarum,
quæ, ratione compositionis faciendæ Sim-
plicium conditionem præseferunt.

Ad primum veniamus: illudque ita con-
stituamus. Quæcunque accuratiore &
longiore præparatione egent, ea priorem
locum debent obtinere : hoc est, si quid
difficilius trituretur, infundatur, coqua-
tur, aut misceatur, prius triturationi, in-
fusioni, coctioni, mixtioni est mandan-
dum : quod vt indicetur, inter trituran-
da, infundenda, coquenda, miscenda,
prius scribatur. Si autem infundendorum,
vel coquendorum, vel miscendorum
vnum

unum aliquod, breuiori infusione, vel coctione, vel mixtione egeat, & præterea trituratione, hoc postponatur, duplici de causa: una, quæ iam dicta est, altera, ut dum alia infunduntur, vel coquuntur, vel miscentur, hoc triturari possit; sicque nulla fiat temporis iactura: cuius metu sæpenuerò Pharmacopola, rætocum scelerare, omnia perturbant; ut eorum quæ minus coquenda sunt, sæpe vis prorsus perdat, nimia coctione; contrà, ea quæ longissima coctione egent, cum eorum vis à mediocritate erui non possit, quanta necessaria est non extrahatur. Quod idem in aliis præparandi formis euenit. Quam rationem hodie à quamplurimis, dicam, Empiricis negligi apparet, qui infundunt simul & decoquunt Guaiaci rasuram, Santalos, Cinnamomum, Sennam, & alia multa: quorum vel ea quæ sunt odorata & laxantia, vim suam amittunt, vel alia non satis decoquuntur, vel vtrumque contingit.

Secundum Theorema est, ut ea quæ maiorem sui quantitatem toti Compositioni tribuunt, & nobiliora sunt, priorem sedem occupent: quod est erutum ex præscriptis antiquorum, qui in componendis medicamentis hoc solum spectarunt; tantum excipientes ea quæ materiæ vice aliquando in fine collocantur. Ut videre est in descri-

DELETED

Infusione, va
ene, & prae
utor duplic
est altera
antur, vel
est, quoc
aus mery
mum, i.e.
mum rite
na pome

CHINA, 1942-1943
CHINA, 1942-1943
CHINA, 1942-1943
CHINA, 1942-1943

[illegible]

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]

aliquo-
re est in
descri-

sola quantitate addixissent, vidisse de-
 mum rationem præparandi; & in hac re
 ordinem esse apprimè necessarium: co-
 ctosque fuisse multa verborum congeriem
 explicare, quod ipse in scribendo ordo
 indicare potuisset: & is mos eos excusa-
 uit in magnis Compositionibus faciendis;
 cum neque forsan solus ordo satis id in-
 dicasset.

Sed cum in illis quæ ad horas præscri-
 buntur, hoc fieri non liceat, neque etiam
 ipsi fecerunt in iis quæ nobis scripta reli-
 querunt, nisi admodum paucis: in eo quod
 mox dicturus sum, totus collocationis
 cardo vertetur; ubi annotauero, antiquos
 minùs bene & comptè fecisse, qui aliquan-
 do dosim medicamentorum, quorum
 idem ordo erat, diuiserunt: vt in Theria-
 ca videre est, Rosarum siccarum 3 xij. Iri-
 dis Illiricæ 3 xij. cum per ana, quod sic
 notatur añ. vno numeratore designare po-
 tuissent.

Nec mihi minùs ridendi, qui idem ho-
 die faciunt, (nisi id præparationis ratione
 fiat) videntur.

Igitur, secundum Theorema priori adiun-
 gentes, hunc ordinem in præscribendo
 constantissimè obseruemus, vt primo or-
 dine collocemus ea, quæ longiori egent
 præparatione. In hoc autem rursus id con-
 sideremus, vt eandem præparationem po-
 stulan-

stulantium ea primū ponantur, quæ maiorem copiam requirunt.

Eandem præparationem & quantitatem requirentium, & mensurandi modum, vt lib. vel vnc. vel M. vel P. ea prima collocentur, quæ commoditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet, vt manum præscriptionibus admouentes, nullo pacto hæreamus mente, ab hocne, vel illo, ordiendum sit: sed cognito scopo, medicamenti que proprietate, & nobilitate, statim ab eo quod opus est, initium faciemus: id quod erit vice materiæ (siue vnum, siue plura id faciant) si in eo vel coctio, vel infusio, vel mixtio sit facienda totius compositionis, primū omniū; si autem infusum, vel decoctum, vel tota mixtio, iam facta, ei sit adiungenda, vltimum, quantæcunque sit copię, & quantitatis, collocemus.

Quod vt exemplo aliquantulum illustremus, id petamus à re quæ est frequentior, videlicet plantarum partibus: vt cum earum radices duriori sint substantiâ, & magis crudâ, longiori que decoctione & trituratione egeant; proinde in primâ sede ponantur, præcipue quæ aperiunt, & incidunt: tum ligna non odorata, & cortices; deinde folia herbarum: tertio loco fructus: quarto semina: vltimo flores, & quæcunque sunt odorata, vel laxantia.

A a

Quod

Quod facit ut radices inde patiantur exceptionem: laxantes enim primo loco non ponuntur.

Denique ratio preparationis tantum potest, ut nihil tam generale adferri possit, quod frequenter non patiatur aliquid peculiaris & singularis doctrinae: ut si quid adalicuius medicamenti meliorem, vel faciliorem actionem faciendam vel castigandam adhibeatur, cuiuscunque sit quantitatis, id quod habet castigandum illico sequatur necesse est, ut eius vis non nisi castigata & melior facta, ne tantillum quidem extrahatur: ut Zingiber & Sal Gemmae mox post Agaricum: Spica & Cinnamonum post Rhabarbarum: Castoreum, Crocus & Myrrha post Opium: & sic de similibus.

Primum animadvertendum est, id quod in prima acie descriptionis Theriaces est positum, esse in maxima quantitate. Id autem factum fuit fortè, quod medicamentum ex Scilla, scopis magis convenit. Facta enim est hæc Compositio primum ad venena, & morbos contumaces & diuturnos: sed Trochisci de Scilla venenis frigidis manifesta qualitate adversantur, item puncturis & moribus venenatorum animalium: nec minùs valet ad humorum contumaciam. Tales enim morbi sunt à crassis, frigidis & viscidis humoribus,

vel

THERIACA MAGNA. 559

vel in remotis & profundis partibus sitis; ad quas causas valet potissimum Scilla, incidendo, attenuando, & ad altas partes penetrando; digerendoque humores crassos.

In secundo ordine, Trochisci Theriacales, & Magma Hedychroi, Cinamomum, Piper nigrum, vel longum: sed longum magis conuenit; & descriptio quæ legitur apud Galenum ad Pisonem, & apud Auicennam, *longum* habet; tum descriptio Carminis scripta. Conuenit enim magis Antidotis Longum, si Dioscoridi credimus.

Hæc omnia, cum Trochiscis de Scilla, & ad venena, & ad morbos contumaces, conueniunt.

Opium autem in hac descriptione, ut præcedentia ad drach. xxiv. ponitur, quia hæc compositio ad dolores sedandos parata est, unde nomen sibi *παλιν*, quod transcribunt Latine *Galene*, comparauit, quia tranquillitatem adfert; & propter vim Opii, & ad veneni præcautionem & curationem facit, ut ex Galeno colligimus.

Valer enim Theriaca, eodem teste, cum recens est, ad venena; cum verò antiqua, ad morbos diuturnos. Quod si recens valeat ad venena, id sit propter vim Opii, quæ maior est in recenti, quàm in antiqua.

A a a

Et mi

Et mihi placet Ioannis Schironii ratio, nostræ quondam Academiæ Cancellarii eruditissimi, qui dicebat Opium additum istis magnis compositionibus, magis esse ad vires calidorum medicamentorum cōservandas. Calida enim, & quæ tenuiū partium sunt, continuò exsoluuntur ab aëre ambiente, qui semper agit in medicamēta.

Quare cum tot sint in hac Compositione calida, & anodyna fortissima esse debeant; nemini mirum esse debet, quòd ad drach. 24. Opium posuerint.

Hanc rationem non nōrunt, qui ex Trypherâ magnâ Opium expungūt, etiam si ad affectus vteri præscribatur. Nam si tantopere narcotica verentur, cur Mandragoræ corticem non expunxerunt? non enim minùs vtero sua frigiditate aduersatur, quàm Opium. Sed hæc missa faciamus; & ad reliqua veniamus.

Iris Illyrica, & Glycyrrhiza, Opobalsamum, Rosæ aridæ, Scordium, semen Napi, vel Rapæ agrestis (quod magis conuenit,) vel quia minùs aduersantur venenis, vel minùs conueniunt, quàm supradicta, vel ad meliorem actionem tantum adhibentur, dosim habent dimidiam secundæ doseos, vt secunda primæ item est dimidia, scilicet 3 xij. Quæ sequuntur, 3 vi. recipiunt, hoc est, dimidium præcedentis dosis.

Quæ

THERIACA MAGNA. 557

Quæ sequuntur hanc, eadem quantitate ponuntur : sed cenſeo omnia iungenda, quæ eiusdem ſunt quantitatis: alioqui ſunt duæ claſſes eiꝰdem ponderis in eodem medicamento; quod ridiculum, ut iam dixi.

Quinti verò ordinis pondus eſt drach. 4. quia quæ ponuntur in hac claſſe, partim ingrata, partim rara, partim efficaciffima ſunt: quare ſi præcedentium copiam eſſent ſecuta, maior eorum quãtitas fuiſſet, quàm par erat. Chalcitis enim ſuo odore, ſapore, adſtrictione periculòſa eſt: alia autem ſunt efficaciam valdè calfaciendo, vel adſtringendo; quare minore quantitate poſita fuère. Quod ſi præcedentem progrediendi modum ſecutus fuiſſet, prioris doſis dimidium ſumendo, minor iuſto quantitas fuiſſet aſſumpta; ob id non 3 iij. ſed 3 iiij. poſuit.

Quæ ſequuntur, vel quia fœtida, vel ſuo ſapore vel conſiſtentiâ ingrata, ad 3 ij. ponuntur, dimidium ſcilicet proximè præcedentium. Sunt autem, ſemen Dau-ci, Bitumen, Opopanacum, Caſtoreum, Centaureum minus, & Ariſtolochia. Hæc efficaciffima ſunt, & ingrata: quare minima quantitate, & vltima fede ponuntur.

Vnde appâret illius Theorematis veritas, quo docebamus, Efficaciffima, & ingrata, & rara, & ſcopo minùs conue-

A 2 3 nientia,

358 EVILIEL. RONDELETTI
nientia, in parua quantitate esse imponenda.

Quòd autem Mellis lib. 14 [al. 10.] ponat, ostendit illud Theorema verum esse quod de materia remediorum diximus nempe materiam, vel quæ materiæ vice gerunt, quantitate reliqua medicamenta superare debere.

Quòd Vinum addiderint sine quantitate, id factum fuit, quia quantitas indicari non potest. Ponenda proinde ea erit, quæ necessaria est ad diluendam medicamento spissitudinem. Mel enim inspissat, conseruat, & dulcorat tantum: & quia aliquando crassius, aliquando liquidius, aliquando etiam plus Vini, aliquando minus imponimus.

Quare nemini mirum esse debet, si semper Vini, Mellis, Syrupi, Sacchari, Olei & Cerae quantitatē non annotemus, sed quod sufficit dicamus.

Hic præterea notare oportet; herbas pondere mensurari, quia sicce usurpantur: item radices, fructus, flores, semina & lacrymas etiam pondere.

Chalcitis semi vsta in hoc remedio ponitur, quanquam inter venenosa annumeretur; valet enim ad Fungos.

Multa etiam alia hic annotare possem, quæ in castigatione huius nobilis Compositionis docuimus. Sed quia hæc præter

ter institutum sunt, silentio prætereo.

Sed de his hætenus. Nunc Theriaces facultates breuiter persequamur.

THERIACA MAGNA ad eadem valet ad quæ Asyncritum. Efficacior tamen est ad omnia. Sed eadem hîc obseruandæ limitationes, quæ illîc, sit ne scilicet Recens, an Antiqua. Recens enim vt frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur: Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuiuslibet affectui medicamenti commisceri debet. Exempli gratia: si ad fluxum sanguinis, cum aqua Bursæ pastoris misceatur: & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest, si valdè antiqua detur: quia in tali affectu egemus attenuatione humorum crassorum apoplexiam comitantium.

Epileptici conuenit recens; etiam si epilepsia sit à nimio sensu: nam recens obtrundit sensum illum exactum. Si verò fiat ab humore crasso (quod scio rarissimè accidere) exhibenda antiqua.

Rauedini vocis, si à crassis humoribus fiat, conuenit antiqua; sin à defluxione tenui, recens.

Asthmati recens, si à retentione calidiorum; sin à crassis humoribus, antiqua.

A a 4 Icteri-

Ictericis & Hydropicis antiqua. Peripneumoniacis & pleuriticis recēs datur in principio, cum tales affectus fiāt per defluxionem; idque cum aqua hordei. Iliosia recens, quia inflammatio est. Dysentericis recens, cum succo aliquo refrigerante. Nephriticis recens, ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima. Neque solū educit & prouocat menstrua; sed & immodicas menstruas fluxiones sistit, ut inquit Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem: Mistam variamque facultatem, inquit, habet. Ideo alia diffundens extenuansque cogit excerni; alia, quæ ob naturæ virtutis imbecillitatem superflua excernuntur, viribus partium confirmatis solet inhibere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venena recens, quia venenum est tenuissimarum partium. Tota itaque cura consistere debet in conservando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. Incrassandi sunt ergo meatus: Hoc autem medicamentum recens non modò incrassat, sed & refrigerat; verumque est Alexipharmacum.

Omni deflectionem sensuum leuat antiqua: recens enim magis sensus stupefaceret. Retardat senectutē, inquit Gal. quia excrementa corporis absomit, & euacuat.

Quar.

Quartanis febribus & contumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experiētiā comprobatum est Mompelii ann 1551.) vbi iam appārent signa concoctionis. Cū enim Pharmacopœus quidam iamdiu laborasset quartana inexpugnabili, eā solutus est media hyeme, solo vsu triduo Theriacā à nobis præscripto.

Expertus sum præterea Dysentericā conuenire. Acceperat enim Scriba quidam satis inconsultè ʒ ij Colocynthidis; vnde in Dysenteriam inciderat. Præbui illi ʒ j. Theriacā nuper paratā: & conualuit eo solo remedio exhibito. Rursum ederant quidam salsamenta putrida: è quibus duo obierunt; tertius, me consulto, vomitione factā Theriacam sumfit, & curatus est.

Vt autem finem dicendi faciam: Recens valet aduersus venena; antiqua verò aduersus morbos diuturnos & inueteratos.

Rejicio eorum sententiam, qui Theriacam pueris recens natis præbent, ne sint obnoxii (vt aiunt mulierculæ) venenis. Data enim pueris iam primū in lucem editis, calorem natium obruere potest. Recens, cū frigida admodū sit: Antiqua vero sua caliditate euanescere faceret eundem calorem.

Varia autem eius est dosis: quæ à mul-

Aa 5 iis

562 GVILIEL. RONDELETII
tis indicationibus sumitur. Si enim a Fe-
sta pars sit remota, ratione optima dabi-
tur maiori quantitate, quàm si sit propin-
qua: vt si ad Podagram, dari debet maio-
ri quantitate, quàm si ad Ventriculum.
Recens item minori quantitate danda est,
quàm antiqua. Recens enim periculo non
vacat; at antiqua, ratione caliditatis, na-
turæ amior est. Calidum enim quodam
modo secundum naturam est.

Hæc sunt Theriacæ commoda, quæ
persequi nobis libuit. Plura require apud
Galenum de Theriaca ad Pilonem; qui
sigillatim eius facultates describit.

THERIACES & MITHRIDATII

*miscendi parandique ratio,
ex Lobelio.*

P R I M A R Y I huius nobilissimi Anti-
dori concinnatores Veneti, terenda
duriora & crassiora, ordine contun-
dunt, in lebetem iustæ magnitudinis in-
dunt, permiscent: quæ deinde in variis
pilis aneis, siue mortariis exactè & ope-
rosè ab operariis tunduntur; humidis sic-
cis immixtis, distributisque, & pilis in-
ter tundendum Opobalsami succedaneo
inunctis, ne pilis & pistillis adhæreant, &
pollinis instar exhalent.

Oliba-

Agaricum, prius deraſum, teritur & cribratur, aut Ceruſa modo ad Emplaſtra fricando per ſeraceum traicitur.

Agaricum, prius deraſum, teritur & cribratur, aut Ceruſæ modo ad Emplaſtra fricando per ſetaceum traicitur.

Sagapenum, Galbanum, & huiusmodi
lachrymæ Vino passo siue Cretico soluun-
tur, & per cribrum fricando cernuntur.

Quidam Bitumen hodie, si liquidum sit, quale est illud Gallicum Auerniense, miscent cum Terebinthina, & præparata siue transcolata Styrace. Si verò durum aut aridum sit, cum Chalcitide in marmoreo lapide læuigant.

THE RIACES *formosa*.

Ab inclyto Medicorum Londinensium

Col-

564 THERIACA LONDINENSIVM.

Collegio vtilissimum hoc Alexipharmacum, Epidemicis contagiosisque febribus grassantibus, ciuem etiamque ege-
num seruandi gratiâ scitè excogitatum
fuit. Eadem ferè recipit, iisdemque viribus
pollet, quibus Fracastorii Diascordium,
& celeberrimum Dodonæi aliorumque
practicantium Belgii ad Pestem Electua-
rium, Carlinæ radice addita, sine tamen
Opio. Ab effectu Theriaca vocata.

℞. Cornu ceruini lima derasi ℥ ij.
Seminum Citri Oxalidis Pæoniæ
Ocymi ana ℥ j.
Scordii, Corallinæ ana ℥ vj.
Radicum Angelicæ Tormentillæ
Pæoniæ
Foliorum Dictami
Baccarum Iuniperi Lauri ana ℥ β.
Florum Calendulæ
Caryophyl. Anthos
Summitatum Hyperici
Nucis Moschatæ Croci ana ℥ iij.
Radicum Gentianæ Zedoariæ
Zingiberis
Macis Myrrhæ
Scabiosæ, Succisæ
Cardui benedicti ana ℥ ij.
Caryophyllorum, Opii ana ℥ j.
Omphacii & Mellis optimi ana q. s.

FOR-

FORMVLÆ

SELECTIONVM PHARMACORVM,

quorum vsus post Valerium Cordum
in Illustrium aliquot Rerumpublica-
rum Officinis receptus est.

*Theriaca Pauperum, ex Diateffaro
composita.*

℞. Gentianæ Baccarum Lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Boli Armeni præp. Dictamni albæ
Tormentillæ Scordii
Carlinæ Zedoariæ ana ℥ j.
Rob Sambuci Iuniperi ana ℥ x.
Mellis q. s. Misce.

*Electuarium contra pestem,
pro pauperibus.*

℞. Ficum pinguium lib. dimidiam
Nucum iuglandium ℥ ij.
Fol. Rutæ ℥ iij.
Zedoariæ ℥ ij.
Boli Armeni ℥ iij.
Rob Iuniperini ℥ ij.
Rad. Gentianæ ℥ j.
Theriacæ electæ ℥ iij.

A 2 7

85-

Syrupi de succo Acetosæ q. s.
Fiat Electuarium.

Diascordinum Fracastorii.

R. Cinnamomi

Cassia lignæ ana ʒ β.

Scordii veri ʒ j.

Dictamni Cretici Tormentillæ

Bistortæ ana ʒ β.

Galbani Gummi Arabici ana ʒ iiij.

Opii ʒ j. β.

Styracis Calamitæ ʒ iiij. β.

Seminis Acetosæ ʒ j. β.

Gentianæ ʒ iiij.

Boli Armeni ʒ j. β.

Terræ Lemniæ ʒ β.

Piperis longi Zingiberis ana ʒ ij.

Mellis albi lib. ij. β.

Conseruæ Rosarum lib. j.

Vini aromatici lib. β.

Fiat Electuarium s. a.

Confert in febribus contagiosis pesti-
lentibus, vbi potissimum Theriaca & alia
magna Antidota locum non habent, vt in
pueris & grauidis. In Cephalalgia etiam
Epidemica, cum aqua Oxalidis aut Tri-
folii acetosi feliciter exhibetur. Fraca-
storius in peste correptis ac extremè de-
speratis hoc modo exhibet: Succi Liniulæ
sue Oxydis ʒ ij. Succi Citri ʒ j. Dia-
scordiæ

Scordii 3 j. Specier. cord. è Gemmis
3 ij. Aceti 3 j. misce. Omnia mixta
dantur simul : & repetatur quoties opus
fuerit.

*Electuarium de Ovo, Maximiliani I.
Imperatoris.*

℞. Ouum Gallinæ recens : & educto per
apicem Albumine, id quod vacuum est
Croco Orientali non puluerisato, imple,
vitellum non auferendo : postea cum alio
putamine iterum occlude, ne quid tran-
spiret, & lento igne, vel post fornacem
tamdiu assa in ollula, donec tota oui testa
nigrescere incipiat; diligenter cauendo
ne Crocus comburatur. Exemta è testa
materia exsicceetur, vt in mortario exqui-
sitiissime contundi, & in puluerein redigi
queat; addendo pulueris Sinapis albi quā-
tum prædicta omnia ponderant. Postea

℞. Pulueris Dictamni albi
Tormētillæ ana 3 ij.
Myrrhæ Cornu cerui
Nucis Vomica ana 3 j.
Rad. Angelicæ
Pimpinellæ
Granorum Iuniperi
Zedoariæ
Camphoræ ana 3 β.

Misce omnia simul in mortario : &

tan-

tandem adice Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando: deinde fiat Electuarium ut est artis.

Quibus Nux vomica suspecta esse solet (quamvis experientia comprobatum sit, illam Nucem potius canibus & felibus, quam hominibus, aduersari) substituunt semen Citri, aut Rad. Petasitidis. Præterea si qui à Camphora vehementer afficiuntur, dimidium tantum Camphoræ sumatur, aut etiam omnino omittatur; præsertim si frequenter vsurpandum sit hoc Electuarium loco præseruationis.

Multis experimentis comprobata est excellentia huius Electuarii, & pro secreto habitum fuit, neque diuulgandum esse censuerunt quidam. Datur ieiuno magnitudine ciceris, & horas xxiiij à peste præseruat. Peste correptus, si febris adfuerit, capiat de eo aureum vnum ex aqua Plantaginis. Creber apud Germanos huius vsus est, non in peste solum, sed & in venenis omnis generis depellendis.

*Electuarium de Limatura Chalybis,
pro oppilatis.*

℞. Limaturæ Chalybis ℥ ij. β.

Teratur benè super marmor duriss.
cum

cum aceto in subtiliss. puluerem exsic-
cetur in loco calido, vel ad solem: id-
que septies reperatur. Huius limaturæ sic
præparatæ ℥ ij.

Cinnamomi opt.

Nucis muscatæ ana ℥ j.

Rhabarbari opt. ℥ ij.

Specier. Aromatici Rosati ℥ j β.

Mellis opt. despumati & Sacchari clari-
ficati ana ℥ iij.

Lento igne fiat Electuarium.

Virginibus cachecticis, quibus menses
non ritè fluunt, & in hepatis obstructio-
ne hoc multum prodest.

Aliter.

℞. Limaturæ Chalybis præparatæ ℥ ij.

Specier. Diarhodon abb. Diacurcumæ
ana ℥ β.

Epithymi Thymi ana ℥ ij.

Mellis despumati q. s.

Est eius vsus frequens in jecoris diu-
turna obstructione, & albo virguncularum
ictero. Datur post purgatum corpus à ℥
ij ad ℥ β. subsequente valido aliquo exer-
citio, aut corporis motu vehementiore.

Electuarium Opticum Occonis.

℞. Specier. Pliris archontici

Semi-

Seminis Fœniculi ana 3 j.

Macis Cubebaram

Cinnamomi

Piperis longi

Caryophyllorum ana 3 β.

Euphrasiæ 3 β.

Succi Saluæ Rutæ

Chelidonii ana 3 β.

Sacchari clarificati 3 j.

Mellis Rosati 3 v.

Coquantur Succi cum Melle ad solidam consistentiam, deinde species tritæ addantur.

Ad visus imbecillitatem, & suffusiones confert.

*Pulvis Epilepticus, minus pretiosus,
sem pro pauperibus.*

℞. Rad. Præniæ collectæ luna decre-
scente 3 ij.

Dictamni albi 3 iiij.

Visci quercini 3 j. β.

Cubebaram

Coriand. præpar. ana 3 β.

Nucis Moschatæ 3 j.

Fiat pulvis.

*Pulvis partum promouens, Helidei
de Paduanis, medici Bononiensis.*

℞. Cinnamomi Croci ana 3 j.

Bora-

Boracis \mathfrak{z} iiij,

Datur ex aqua Artemisiæ, vel simili.

Augetur efficacia, si (pro prudentis
Medici arbitrio) exigente necessitate,
admisceatur testiculorum equinorum ari-
dorum aut iulorum Nucum iuglandium
pulvis.

*Pulvis aduersus Scabiem,
in Italia vſitatissimus.*

R. Sulphuris viui

Nitri veri, vel eius loco Salis Gemmei

Foliorum Maioranæ ana \mathfrak{z} ij.

Lithargyri aurei

Cort. rad. Ellebori nigri ana \mathfrak{z} j.

Pimpinellæ \mathfrak{z} β .

Seorsim trita, cribrata & mista, ser-
uantur: & cum oleo Rosato ac Costino
cuti affricantur.

Pulvis pro ulceribus gutturis.

R. Sulphuris viui \mathfrak{z} iiij.

Myrrhæ rubeæ

Aluminis Saccharini ana \mathfrak{z} ij.

Mastiches Turis ana \mathfrak{z} j.

Pyrethri \mathfrak{z} vj. Fiat pulvis.

R. huius pulueris \mathfrak{z} j.

Vini sublimati lib. j.

Pulvis hic felici successu gutturis anti-
qua

qua ac foeda vlcera repurgat & perfanat
præcipuè in lue venerea.

Puluis Violarum odoratus.

℞. Iridis Florentinæ ℥ vj.
Rosarum rub. ℥ iiij.
Cyperī ℥ β.
Maioranæ Caryophyllorum
Styracis ana ℥ j.
Beniouin Santali Citrini ana ℥ β.
Violarum ℥ iiij. [al. ℥ iiij.]
Moschi ℥ j. Fiat puluis.

Puluis hic tametsi ad odoramenta præ-
standa potissimum expetitur, caput tamen
extrinsecus adhibitus eximiè roborat, nec
non cordis palpitationi medetur.

Syrupus è Rosis siccis.

℞. Infusionis Rosarum aridarum aliquo-
ties lege artis factæ,
Sacchari ana.
Decoquatur in formam Syrupi.
Alii sumunt dimidiam partem Sacchari,
ad infusionem.

Syrupus Althææ, Fernelii.

℞. Rad. Althææ ℥ ij.
Cicerum rubeorum ℥ j.
Rad.

Kad. Graminis Asparagi
 Glycyrrhizæ mund. Vuarum passar. ex-
 purgat. ana \mathfrak{z} β .

Summitatum Althææ Maluæ
 Parietariæ Pimpinellæ
 Plantaginis

Adianti vtriusque ana manip. j.

Quatuor seminum frigidorum maio-
 rum & minorum ana \mathfrak{z} iiij.

Coquantur ex aquæ libb. sex, dum qua-
 tuor supersint, cum Sacchari albi libris
 quatuor, ad consistentiam Syrupi.

Crassam obstruentemque pituitam, pu-
 tulentamque saniem & arenulas blandè
 expurgat, citra manifestum calorem. Uri-
 næ præterea mitigat ardorem.

Syrupus Melissæ, Fernelii.

Rad. Dictamni albi Pentaphylli

Rad. Beronicæ

Doronici Romani ana \mathfrak{z} β .

Foliorum Melissæ Stœbes vel Scabiosæ

Succisæ vel Morsus Diaboli

Florum Buglossi vtriusque

Rorismarini ana manip. j.

Seminis Acetosæ

Citrii mali

Fœniculi Cardui benedicti

Ocimi ana \mathfrak{z} iiij.

Coquantur in aquæ libris iiij. ad dimi-
 dias.

dias. Expresso addantur

Sacchari albi lib. iij. Succi Melissæ

Aquæ Rosarum ana lib. β.

Percoquantur in Syrupum conditum

Cinnamomi & Santali citrini ana ʒ β.

Ante alios cordis palpitacioni & syn-
eopæ succurit: peculiariter verò pestilen-
tium & venenatorum morborum mali-
gnitatem obtundit.

Syrupus Augustini Niphi.

ꝛ. Corticum Myrobalanorum citrinorū

Rad. Rhapontici vulg. siue Centaurii ma-
ioris recent.

Fol. Senæ Epithymi ana ʒ j.

Polypodii quercini

Fol. Fumiterræ

Lupulorum recent. ana lib. j.

Glycyrrhizę contusę

Sem. Anisi ana ʒ iij.

Florum Boraginis Buglossæ

Violarum [ana] ʒ ij.

Fiat omnium decoctio vt moris est. De-
cocto excolato, quod erit, ad lib. ij. ad-
misceatur.

Succi Lupulorum

Succi Fumi terræ depurat. ana lib. j.

Sacchari clarificati q. s.

Fiat Syrupus s. a. & condiatur cum pau-
culo Moschi & Ambrae.

Datur

Datur ab vnciis iiij. ad vj. cum aqua
Lupulorum.

In Italia, præsertim Neapoli, est vñta-
tissimus ad cutis vitia, luem venereã, epa-
is calidam & siccam intemperiem, quar-
anam ac lentam febriem. Educit pitui-
am falsam, & humores melancholicos.
Patauui addunt Hellebori nigri non nihil.

Syrupus de Scolopendrio, Fernelii.

℞. Polypodii quercini
Rad. Buglossi vtriusque
Cort. rad. Capparorum
Cort. Tamarisci ana ʒ ij.
Scolopendrii; veri, seu Ceterach, ma-
nipul. iij.
Lupuli Capillorum Veneris
Cuscutæ Melissophylli ana manip. ij.
Coquantur in aquæ libris nouem ad
resmanentiam librarum quinque: colaturæ
huic adde Sacchari albi lib. iiij. Perco-
quantur in Syrupum.
Crassam terrenamque melancholiam
extenuat, mollit, fluxilemque reddit:
menem obstructione liberat, tumentem-
que soluit.

Syrupus de Polypodio.

Varia sunt Syrupi de Polypodio de-
scriptio.

scriptiones. Sed quarum omnium vicem
supplere potest alteruter præcedentium
Syruporum duorum.

*Lohoch è Caulibus, seu Brassica,
Gordonii.*

℞. Succi Caulium rubeorum depurati &
clarificati libram vnam

Croci 3 ij.

Mellis despumati Sacchari analib. β.

Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris vtile: plurimumque
valet in omni raucedine & ablatione vocis.

Hydromel simplex.

℞. Mellis libram vnam

Aquæ pluuiæ vel fontis libras octo

Decoquantur donec Mel non ampliùs
spumet.

Hydromel compositum.

℞. Aquæ fontis libras viginti

Mellis despumati libram vnam

Saluæ Origani an. pug. semis

Anisi Coriandri ana 3 j.

Glycyrrhizæ 3 ij.

Cinnamomi 3 j. β.

Bulliant ad consumptionem quartæ par-
tis, & colentur.

Hydro-

Hydromel purgans.

℞. Hydromelitis ℥ xxxij.
 Caricarum pinguium num. viij.
 Fol. Senæ electæ
 Polypodii quercini ana ℥ β.
 Sem. Anisi ℥ j.
 Cinnamomi ℥ β.
 Zingiberis ℥ j.
 Coquantur ad dimidium : colaturæ adde
 Sacchari Candi rubei ℥ ij.
 Misce vt artis est.

Eccoproton felix ; pueris , senibus , ac
 iis quos sedes remorantur , familiare.

Oxymel elleboratum , Gesneri.

℞. Calamenthi Thymi. Pulegii
 Cardui Benedicti
 Rosarum rubrarum
 Menthæ crispæ ana p. j.
 Sem. Anisi Ocymi
 Sem. Vrticæ Romanæ
 Sem. Anethi ana ℥ j.
 Rad. Angelicæ
 Rad. Fœniculi Althææ
 Scillæ Iridis nostræ
 Turbith ana ℥ β.
 Ellebori albi
 Esulæ præparatæ ana ℥ ij.
 Bb Rad.

Rad. Asari ʒ j. β.

Galangæ Cinnamomi

Calami aromatici ana ʒ j.

Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. ij. vel q. s. triduo in sole vel ad fornacem in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium ferè; tum colabis, modicè exprimendo, addeſque Mellis deſpumati, Sacchari ana lib. j. & ad conſumptionem Aceti decoques in Syrupi conſiſtentiam. Doſis ad mouendam aluum ab ʒ β. uſque ad ʒ vj. cum decoctione Senæ & Polypodii, vel Syrupo Violato, aliòve ſolutiuo.

Confert Epilepſiæ, aſthmati, & omnibus morbis à materia frigida, craſſa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

Potus Hippocraticus.

℞. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ ij.

Nucis Moſchatae ʒ j.

Sacchari albiffimi ʒ xvj.

Vini albi potentis ac odoriferi lib. v.

Macerando probè teſta per horas octo vel decem, poſteaſque ſæpe ſæpiùs percolanda redigantur in potum Hippocraticum; tranſcolatum liquorem aromatibus in ma-

in manica Hippocratis contentis semper
affundendo.

Cerebrum & ventriculum roborat, spi-
ritus auger, vitales facultates fulcit, amif-
sas vires reparat, ac infirmę coctioni opem
præstat.

Cremor Ptisane.

℞. Hordei mundi excorticati lib. j.
Aquæ q. s.

Bulliat semel. Facta ebullitione re-
moueatür prima aqua, & affundatur re-
cens; quę iterum coquatur ad consumtio-
nem medietatis, ac per pannum cole-
tur.

Tabidis ex usu est; hecticis, consumtis,
& à prolixo morbo extenuatis idoneus ac
perutilis.

Mostarda, seu Diasinapi.

℞. Pul. seminis Sinapi lib. iiij. β.
Sulis communis albiß. lib. ij.
Vini rubei q. s.

Infundantur per noctem agitata in vase
lapideo aut testaceo vitreato amplo; ma-
ne addendo

Corticum Citri melle conditorum, &
trassiusculę incisorum ℥ iiij.

Conseruę pro Mostarda lib. xvij.

Melazii, id est, Spumę Sacchari nigrę
Bb 2 & li

& liquidæ [quam Syrupum vulgus vocat]
lib. xliij.

Caryophyllorum ℥ j. β.

Nucis Moschatæ ℥ ij.

Aromata etiam crassiusculè incidantur
ac cum prædictis omnibus misceantur.
seruenturque sic in vsum debitum.

Conserua pro Mostarda.

℞. Cydoniorum recentium in radula seu
tyrocnestide rasorum partes tres

Mellis despumati partes duas.

Coquantur s. a. & seruentur vsui.

Mostarda ventriculum laxum ac frigi-
dum corrigit, mollitiem eius aufert, co-
ctionem procurat, appetentiamque deie-
ctam erigit. Adhibetur potissimum ad
embammata seu intinctus mensis magna-
tum.

Passule Laxativæ.

℞. Fol. Senæ Alexand. ℥ iiij.

Cinnamomi electi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Aq. Endiuæ & Vini albi ana ℥ xiiij.

Infundantur per horas sex aut octo: de-
inde ebulliant, ac leniter exprimantur.
huic decocto post colaturam adde Saccha-
ri albi ℥ iiij.

Coquantur simul ferè vsque ad confi-
sten-

stentiam Syrupi; iniiciendo tum, vt adhuc simul leniter bulliant, Passularum minorum repurgatarum \mathfrak{z} xij. Atque sic lege artis post iustam coctionem reponatur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxatiua.

Quamuis à longinquis partibus ob facilitatem vix quicquam educere possint; dantur nihilo minùs pueris, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus. Adstrictam enim aluum leniunt, fecesque diutiùs detentas expellunt.

*Electuarium purgans,
de Pomo Citrio.*

\mathfrak{R} . Corticum Citrii Pomi conditorum
Conseruæ Boraginis
Buglossæ

Violarum ana \mathfrak{z} β . [al. \mathfrak{z} v.]

Specier. Diatragacanthi frig.

Diacrydii ana \mathfrak{z} β .

Turpeti opt. \mathfrak{z} vj.

Sacchari albi lib. j. in aquis cordialibus destillatis dissoluti.

Fiat Electuarium.

Plurimum in Gallia in vsu est: sed in confectiōe solida. Nonnulli additis foliis Senæ, & pauculo Zinzibere ac Croco tabellas conficiunt s. a. loco Electuarii.

Euacuat omnes humores.

B b 3

Holip-

Holippæ purgantes.

℞. Turbith electi ʒ v.
 Diagridii ʒ ij.
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ j.
 Hermodactylorum ʒ j.

Puluerisata infundantur per noctem
 aqua Rosarum fragrantissima : manè co-
 lentur & exprimantur. Cum hoc expresso
 accolato, & sufficienti Farina Triticæ
 candidissima, ac Sacchari albißimi ʒ iiii
 fiant Holippæ f. a.

Pituitosos biliososque humores edu-
 cunt, nec non serosa excrementa euacuans.
 Vñ sunt iis potissimum quibus appetitus
 peruersitas alterius medicamenti fun-
 ctionem dissuadet.

Diasarum Fernelii.

℞. Syr. de Mentha
 Violarum ana ʒ iiij.
 Coquantur ad Mellis crassitiem : sub
 nem, amoto igne, inspergantur
 Radic. Peponis aridarum
 Sem. Raphani, Vrticæ,
 maceratorum in aqua Rosarum, & rursus
 arefactorum ac tritorum ana ʒ ß.
 Rad. Asari contrit. & per cribrum excre-
 tarum ʒ j.

Cinna

Cinnamomi

Sem. Fœniculi ana ʒ i. β.

Fiat Electuarium liquidum.

Dantur ʒ iij. ex aqua Hordei, vel
Mussa, aut Sero lactis.

Omnis generis humores circa ventri-
culum & præcordia exuperantes vomitio-
ne ducit, non continuato, sed ex inter-
uallis facto impetu; vt senibus quoque
& aliis imbecilibus corporibus non ob-
sit. Eadem emendatiùs habebis infra.

*Puluis contra Hydropem,
Erasti.*

R. Pul. Foliorum Soldanellæ ʒ j. β.

Fol. Senæ ʒ ij.

Turpeti vel Rhabarbari ʒ j.

Sacchari ʒ j.

Misce, fiat Puluis.

Quidam addunt pulueris Lumbrico-
rum terrestrium præparatorum & exsicca-
torum ad pondus omnium.

Puluis contra Vermes.

R. Sem. Santonici ʒ ij.

Coriandri præparati ʒ j.

Cornu Ceruini vsti ʒ j.

Corallinæ ʒ β.

Sem. Caulium ʒ j. β.

Bb 4

Rha-

Rhabarbari opt. ʒ j.

Sacchari ʒ j. β.

Misce. fiat Puluis.

Cum Rhabarbarum pueris non semper sit acceptum, quidam loco Rhabarbari sumunt tantundem vel paulo plus foliorum Senæ.

*Pilule de Nitro, Alexandri
Tralliani.*

℞. Aloës Colocynthidos

Scammonii Bdellii

Hellebori nigri præparati

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii præparati Nitri ana ʒ j.

Cum Succo Brassicæ & Melle cocto fiat massa.

Valent ad omnem humorem euacuandum à partibus remotioribus. In doloribus luis Veneræ, Epilepsia, & aliis pertinacibus morbis plurimi in Italia & alibi vsus.

Pilule Iliacæ Rhasis.

℞. Colocynthidos

Sagapeni ana ʒ vj.

Diagridii ʒ ij.

Cum Succo Porri fiant pilulæ.

Cum iudicio vsurpandæ sunt hæc pilulæ. Dantur à ʒ ij. ad ʒ j.

Velo-

Velociter passionem solvunt iliacam.
Cephalalgicis, hemicranicis saluberrimæ:
nec in hydropè & cachexia contemnen-
dæ. De iisdem infra agetur.

Trochisci de Rosis simplices, Mesuæ.

R. Folior. Rosarum ʒ x.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Spicæ Aromaticæ, siue Indicæ ʒ ij. β.

Tritis omnibus fiant Trochisci ex vi-
no albo.

Ventriculum & hepar roborant, hu-
moresque detergunt; atque adeò phleg-
maticæ feбри conveniunt.

His si Scammonii opt. ʒ iij. adiciantur,
conficiuntur Trochisci purgantes.

Trochisci de Violis purgantes, Mesuæ.

R. Violarum purpurearum mundatarum,
& mediocriter exsiccatarum ʒ vj.

Turpeti albi & gummosi ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Manna ana ʒ ij.

Succus Glycyrrhizæ, Manna & Violæ,
simul benè conterantur: quibus addatur
pulis tenuissimus Turpeti: diu simul te-
rantur, & cum Syryo Violato, si opus
fuerit, formentur Trochisci. Validiores
autem efficiuntur si Diagridii ʒ viij. ad-
dantur.

Bb 5

His

His vtimur ad expurgandam pituita-
lentam in thorace, cui bilis vitellina e-
permista: faciuntque ad difficultatem spi-
randi.

Sief album cum Opio & sine Opio.

℞. Gummi Arabici Tragacanthæ
Amyli ana ℥ iiij.
Cerussæ lotæ ℥ vj.
Sarcocollæ nutritæ ℥ iiij.

Opii ℥ j. Cum albumine oui fiat Sief.
Paratur etiam sine Opio, vt vtrumque sit
in promptu. Rhases alibi sumit Cerussæ
℥: Mesue addit Tus.

Ad oculorum fluxiones, lippitudines
acres, & dolores inde natos leniendos ad-
hibetur, cum aliquo conueniente liquore.

Collyrium album, Galeni.

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutia præpa-
rate ℥ xvj.

Cerussæ ℥ j.

Amyli Gummi Arabici

Tragacanthæ ana ℥ iiij. Opii ℥ ij.

Excipiantur cum aqua pluuiæ vel Rosa-
cea, & fiat Collyrium siccum. Paratur
etiam sine Opio.

Ad Oculorum vstiones, pustulas, chy-
moses, fluxiones, lippitudines acres, ac
dolores inde natos leniendos faciunt hæc

Colly-

Collyria: maximè in his qui nullam mordacitatem ferre possunt, vtilia. Sed posterius in Italia est frequentius vsitatum. Vfus est cum ouo.

Pomum Ambrae.

℞. Santali Citrini ʒ vj. ʒ ij.
 Ligni Aloës ʒ β.
 Rosarum rubearum Basiliconis
 Lauendulæ Anthos
 Maioranæ ana ʒ iiij. ʒ j.
 Corticum Citri ʒ viij.
 Cinnamomi Nucis Moschatæ
 Macis Caryophyllorum
 Coriandrorum præparatorum
 Cardamomi ana ʒ iiij. ʒ j.
 Labdani puri ʒ viij.
 Styracis Calamitæ ʒ vj. ʒ ij.
 Styracis liquidæ ʒ iiij.
 Asæ dulcis ʒ x.
 Cere citrinæ ʒ j. β.
 Terebinthinæ Cypriæ ʒ iiij.
 Aquæ Rosarum ʒ ij. β.
 Moschi Alexandrini
 Ambre cin. ʒ ij. β.
 Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit.

Vfus est maximè cùm aliqua aëris inquinati suspicio viget: cui tunc temporis Anglica,

gelica, Zedoaria, Ruta, & praesertim
Camphora rectè adiicitur.

Candela pro suffitu.

℞. Styracis Calamitæ
Carbonum Salicis ana ℥ ij.
Benzoini ℥ j.
Caryophyllorum ℥ β.
Laudani ℥. vj.
Terebinthinæ Cypriæ, & Mucilaginis Tra-
gacanthæ cum Aqua Rosarum factæ q. s.
Fiant Candela, Tedæ, vel Auiculæ: qui-
bus pro delicatioribus Galliam Moscha-
tem aut Ambram addere licebit.

Oleum Ranarum, Mesuæ.

Ranarum fluuiatilium libra dimidia de-
coquitur in olei Sefamini sextario, in vi-
tro optimè clauso, vsque ad ipsarum dis-
solutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

*Oleum præstantissimum, vermes
pellens, aut necans.*

℞. Myrrhæ electæ ℥ viij.
Mastiches ℥ ix.
Aloës Epaticæ ℥ xvij.
Salis communis lib. j.

Con.

Contusa omnia per retortam igne lento destillentur magna diligentia. Exibit primò aqua, dein Oleum admirandum: cuius (inquit Melichius) vnica gutta preciosissimis etiam gemmis est precior. Siquidem infantes à vermibus infestatos inunctum liberat à morte. Vulnere etiam, nisi in ipsa vsque ossa penetrèt, guttula vna consolidat intra horas xxiiij.

Oleum Balsami.

℞. Terebinthinæ ʒ xvij.

Myrrhæ Cinnamomi

Caryophyllorum

Nucis muscatæ

Aloës

Cubebæ

Castorei

Zedoariæ

Mastiches

Galangæ

Ligni Aloës

Tormentillæ

Dictamni albi ana ʒ β.

Gummi Hederæ

Turis ana ʒ ij.

Olei Laurini

Galbani

Gummi Elemi

Olei Oliuarum

Aquæ Vitæ ana ʒ vj.

Rad. Chelidoniæ

Sarcocollæ

Matriçilux

Saluiæ ana man. j.

Bb 7

Terenda

Terenda tere, & cum aqua Vitæ permisce, atque cum Terebinthina in cucurbitam benè clausam immissa, in balneo Mariæ calenti quattriduum deponere. Dein super cineribus igne lento distilla, ita vt biduo opus soluas.

Valdè à Melichio hic liquor commendatur in paralyfi, neruis contractis, dolore dentium, pestiferis apostematibus, pauculis guttulis.

Oleum Cerae, ex descriptione Melichii.

Præstantissimarum esse virium, inquit, comperimus ad dolores hypochondriorū & Stomachi. Tussi medetur; vulnera simplicia; quæque in partibus facta sunt nervosis, curat. Quod intra corpus exhiberi solet, sic fit:

Cera liquata in aquam communem proicitur octies aut decies: dein per retortam, cui cineres non subsunt, destillatur igne moderato. Initio autem non Oleum, sed quiddam Butyro simile prodit: ideoque quinquies vel sexies repetita destillatione opus erit, donec non crescat ampliùs Oleum. Quod si coagulari videris, destillationem repete, donec sincerum prodeat Oleum.

Alio modo fit, vulneribus sanandis utile:

Cera

Cera liquata in vinum album quàm haberi poterit optimum, proiicitur octies deciesve, semperque diligenter subigitur. Deinde distillatione modò descripta Oleum elicitur.

Oleum Zanetinum, Melichii.

Patauinis & Venetis est in usu, & miracula præstat: calidum enim quantum tolerari potest vulnere instillatum, glutinando xxiiij horarum spatio perfanat.

&. Apii manip. ij.

Chelidonii M. iiij.

Rorismarini Sicilianæ [*seu Androsani quorundam*]

Plantaginis Absinthii ana M. ij.

Salviæ M. iiij. Millefolii M. ij.

Flor. Calendule M. vj.

Flor. Verbasci M. iiij.

Laurentine M. vj.

Laureolæ M. iiij.

Succi Rutæ \mathfrak{z} iiij.

Olei communis lib. vj.

Terebinthinæ

Resinæ Pini ana lib. iiij.

Galbani \mathfrak{z} iiij.

Viridis Æris \mathfrak{z} iiij.

Ex herbis contusis succus exprimitur, quo Galbanum dissolvitur. Additis postea Oleo & Terebinthina, in vase cooperato si-

to simul coquantur, donec omnis succus sit absumtus: quo facto per stamen fortissimè exprimuntur. Expresso adhuc calenti mox Viride Æris additur, & tam diu subigitur, donec exactè sit commixtum, & colorem viridem adipiscatur oleum.

*Vnguentum Alabastrinum,
Faentini.*

℞. Succi Chamæmeli recent. ℥ iiij.

Succi Rosarum recent. ℥ ij

Succi Rutæ recent.

Betonicæ ana ℥ j. β.

Succi radicum Althææ ℥ ij.

Olei Rosati Omphacini lib. j. β.

Alabastri opt. & puriss. ℥ iiij.

Pulueriscentur subtiliter, & per diem naturalem infundantur in oleo omphacino: deinde cum Cerae albæ q. s. ex omnibus fiat vnguentum.

Prodest in omni dolore capitis, siue per essentiam, siue per consensum; adsit febris, vel non: ac in omni tempore paroxysmi possumus vti, excepto principio.

*Vnguentum de Tabaco siue Peto,
Iouberti; quod Vnguentum
Nicotianum vocat.*

℞. Foliorum Peti lib. ij.

Pin-

Pingued. Porci recent. vel diligenter lota lib. j.

Herba maceretur per noctem in vino rubro. Manè bulliat igne lento cum pinguedine, ad Vini consumptionem; & coletur exprimendo: colato addantur

Succi Peti lib. β.

Resinæ Abiegnæ ℥ iiij.

Coquantur ad succi consumptionem; circa finem addendo

Rad. Aristolochiæ rotundæ puluerifata ℥ ij.

Ceræ nouæ q. s.

Fiat vnguentum. Si malis Ceratum, augeatur pondus Ceræ. Si magis siccare velis, & consolidare, addantur Mumia & Succini ana ℥ iiij.

Vsurpatur efficaciter ad scabiem, & præsertim tineam capitis; item ad vlcera & vulnera, tam recentia quàm antiqua; ad inflammationes & furunculos; adusta quoque & morphæam; ad tela item ac globulos extrahendos. Ad scrophulas admirandum esse, asserit huius Vnguenti inventor Ioubertus.

*Vnguentum ex succis,
Iul. Cesaris Arantii.*

℞. Olei Rosati opt lib. j.

Ceræ albæ nouæ ℥ viij.

Folio-

Foliorum Plantaginis Lapathii

Solani Centaurei minoris ana man ij
Herbæ pridie cælo sereno, orto iam sole, æstate aut autumnno ineunte collectæ bulliant donec probè coctæ fuerint, postea colentur, torculari exprimantur. Expressum verò, abiectis herbis, denuò moderate ferueat vnà cum oleo, in quo cera lento igne lique scat, donec omnis aquea absumatur humiditas, & solidam Vnguenti formam acquisierit; quo ferè iam refrigerato, adde Camphoræ puluerisatæ ζ β .

Vlceribus fœdis ac malignis opitulatur: mundificat, siccatur, abstergit, coquit, & consolidat, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimat, ac sinus cicatrice tegit.

Vnguentum Pediculorum.

\mathcal{R} . Sem. Staphisagriæ ζ ij.

Hellebori albi ζ j.

Salis ζ ij.

Argenti viui ζ ij.

Aceti vini ζ ij.

Axungia porcina lib. j.

Olei Laurini ζ ix.

Saponis Veneti lib. β .

Fiat vnguentum secundum artem. Quidam omittunt Saponem Venetum: quidam addunt oleum Spicæ.

Vnguen-

*Vnguentum ad verrucas seu carunculas
in meatu urinario natas,
Alphonſi Ferrii.*

℞. Mercurii præcipitati ℥ ij.
Vnguenti de Ceruſſa ℥ β.

Addatur his pro magnitudine affectus
aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, im-
mittendo de his parum ſupra candelam
ceream in canalem. Poſteſt autem loco
Vnguenti de Ceruſſa à principio ſumi
Vnguentum Anodynum, in æqua cum
Præcipitato portione.

Candele ſic ſiunt in hunc uſum.

℞. Cerae albæ lib. j.
Terebinthinæ Venetæ ℥ j.

Liqueſcat Cera; poſtea addatur Tere-
binthina, & in his liquatis intingantur
ellychnia, ſiantque candelæ iuſtam craſſi-
tiem habentes.

Vnguentum Anodynum.

℞. Olei Liliorum alborum ℥ vj.
Anethini Chamæmelini an. ℥ ij.
Olei Amygdalarum dulcium ℥ j.
Pinguedinis Anatis Gallinæ an. ℥ ij.
Cerae

Ceræ albæ parum. Misce.

Mitigat corporis quacunque parte dolores.

Ceratum ex Betonica, Augustanorum.

℞. Terebinthinæ Resinæ Pini

Ceræ flauæ an. ʒ ij.

Betonica puluerisatæ ʒ v.

Mastiches Turis an. ʒ ij.

Mumiæ ʒ j. β. Misce, fiat malagma.

Vsus huius cerati est in vulneribus capitis. Vulgo ita fit:

℞. Resinæ puræ

Ceræ nouæ ana ʒ vj.

Terebinthinæ lib. ij.

Succi Apii Betonicæ

Plantaginis an. ʒ vj.

*Ceratum Diachalciteos, Galeni,
sen Diapalma.*

℞. Axungie Porci veteris, à membranis per liquationem & colationem purgatæ, lib. ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti an. lib. iij.

Chalcitidis [vstæ,] siue eius loco Vitrioli stalactici ʒ iij.

Liquefactis igni Axungia & Oleo miscetur Lithargyrum & Chalcitis siue Vitriolum, mouendo continuò rudicula ex
ramo

ramo Palmæ recentissimo, dempto prius cortice, confecta: verum ubi pars rami medicamento immissa, calore exarescit, abscindatur, & reliqua adhuc recēs immitatur, & coquatur ad convenientem crassitiem, . iniectione inter coquendum ramo Palmæ viridis minutim inciso. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum ex eodem expressum. Alii, ubi propè excoctum est, addunt tenerorum Palmæ ramorum minutim incisorum, & in nodulo ligatorum manip. iij. In defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recenti succulentoque ramo Quercus. Alii sumunt ramum Pyri, aut Pruni siluestris, aut Salicis: Alii Caninis vtuntur.

Ambustis, ruptis & contusis, vulneribus cruenis, tumoribusque pestilentibus vtile.

Ceratum pro Herniosis, Noribergensibus vsitatum, ex descriptione Volkeri Coiter Frisii.

℞. Pul. Mastiches Mumia
Turis Electri siue Succini
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Aloës opt. Balaustiorum
Rosarum an. ʒ β.
Sanguinis Draconis

Boli

Boli Armeni

Lapis Hæmatitis an. ʒ vj.

Olei Rosarum ʒ iiij.

Myrtini Mastichini an. ʒ j.

Cum Cera & Resina q. s. Fiat Ceratum.

*Emplastrum ad Tophos, Angu-
stanorum.*

℞. Picis naualis

Colophonix an. ʒ iiij.

Mucilaginis Radicum Althææ ʒ ij. β.

Galbani Mastiches Myrrhæ

Turis Ammoniacy an. ʒ j. β.

Propoleos Visci Quercini

Aristolochiæ rotundæ Aeris vsti

Cera citrinæ

Terebinthinæ an. ʒ iiij.

Fiat secundum artem Emplastrum.

In tumoribus & nodis luis Venereæ fe-
lici successu vsurpatur.*Emplastrum de Ranis, Vigonis,
ex correctione Rondeletii.*

℞. Olei Chamæmelini Anethini

De Spica Liliorum an. ʒ ij.

Pinguëdinis Porci

Pinguëdinis Vituli an. lib. j.

Euphorbii Turis ʒ v.

Olei Laurini ʒ j. β.

Pin-

Pinguedinis Viperæ ℥ ij. β.

Ranarum viventium num. vj.

Lumbricorum lotorum in vino ℥ iij. β.

Succi rad. Ebuli

Enulæ Campanæ an. ℥ ij.

Schœnanthi Stœchados

Matricariæ an. manip. j.

Vini generosi lib. j.

Bulliant omnia ad consumptionem
Vini.

Colaturæ adde Litharg. auri lib. j. &
diu agitentur. Deinde adde Cera citri-
næ q. s. Terebinthinæ Abietis ℥ ij. Au-
ferantur ab igne, & adde Styracis li-
quidæ ℥ j. β. Agitentur fortiter. Post-
quam refrixerit aliqua ex parte, adde Ar-
genti viui extincti in salua hominis iei-
uni ℥ iiij. Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, inquit Rondeletius,
recipit quantitatem parvam Argenti viui:
quare efficacius reddetur ad omnia, si Ar-
genti viui ℥ vj. receperit, & Euphorbii
℥ β. Quod Argentum viuum extinguatur
saluâ, superstitiosum est & inutile.

*Lapis septicus, seu Cantherium poten-
tiale, Angustanorum.*

R. Cineris Clauellati

Calcis viuæ an. partes equales.

Macerentur per dies aliquot in aqua
com.

communi: postea colentur, & durum co-
quatur vt artis est.

Eo chirurgi in parandis emissariis se-
fonticulis ac abscessibus extrorsum ver-
gentibus communiter vtuntur.

Lapis Philosophorum, Augustanorum.

R. Aluminis Rochæ, seu communis
Vitrioli Hungarici an. lib. j.

Misceantur in olla non vitreatâ, affun-
dendo Aquæ fontanæ lib. iiij. Hæc per
petuò agitando ad ignem lentum, spumam
semper auferendo, liquecant.

Postea ad de

Boli Armeni ʒ j. β.

Cerussæ albæ & mundissimæ ʒ j.

Camphoræ ʒ ij.

Minutissimè puluerisata misceantur,
rudicula semper agitando, ac sub finem
addendo

Aceti vini albi lib. β.

Coque ad iustam lapidis consistentiam.

Mirabilis eius vsus in vlceribus fluidis,
ac putrida humiditate foedis: sinus & fi-
stulas extergit, ac consolidat: vlceribus
insuper malignis, quæ cacoëthe vocant,
cicatricem inducit.

LOBE-

LOBELIANÆ & RONDELETIANÆ
FORMVLÆ ALIQVOT,

omissæ, aut ab ipsis emendatæ;
cum aliis quibusdam.

Decoction Communis, Clysteris.

℞. Betæ Maluæ Parietarię
Brancę Vrsinæ Mercurialis ana m. j.
Furfurum p. j.

Fiat decoction in sufficienti quātitate aque.
*Quodsi addantur Anisi & Fœniculi ana ʒ ij.
melior erit decoction.*

*Decoction Communis Medicinæ,
ad dissoluenda solutina.*

℞. Hordei integri p. j.
Prunorum & Passularum ana p. x.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.
Violarum p. j.
Anisi ʒ j. Fiat decoction.

*Dicitur autem Communis, quod nulli parti
aut humori sit destinata, ut est Pectoralis,
qua utimur in affectibus pectoris; neque pitui-
tam, bilem vel melancholiam euacuet; sed
tantum leniens sit, ad omnia excrementa. Id-
circo Tamarindos expunximus, quia ladunt*

C c un-

ventriculū, & ad bilem praescribuntur.
Anisum addidimus, ut flatus à *Prunis* & *Hor-*
deo genitos discutiat; & quia odorata semina
 cum medicamentis laxantibus admiscenda im-
 perat *Hippocrates*.

Decoctio Pectoralis.

℞. *Hordei integri* p. j.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Capillorum Veneris *Hyssopi ana* m. j.
Ficuum *Dactylorum mundatorum*
Passularum enucleatarum an. p. vj.
Florum Violarum *Buglossi ana* p. j.
Anisi ℥ ij. Fiat decoctio.

Vsui erit ad medicamenta laxantia dis-
 soluenda; utilis ad deterfionem & expe-
 ctorationem in pleuritide.

Electuarium Caryocostinum.

℞. *Hermodactylorū* *Diagridii ana* ℥ vj.
Caryophyllorum *Costi* *Cumini*
Zingiberis ana ℥ iij.

Mellis despumati ex *Vino albo* aroma-
 tico ℥ ix. Misceantur, & fiat Conditum.
Vini autem vis, ut *Mellis*, longa deco-
 ctione valdè minuitur. Praestaret uti
 duabus *Mellis* despumati partibus, mol-
 lissimo igne; affuso paucō liquore, & *Vini*
Passi aut *Sape* parte vna.

Apud

Apud Londinenses quosdam in frequentissimo usu est, ad articulares affectus, podagricosque dolores: *materia tamen defluente*, ait Lobelius, prestaret uti Rhabarbaro & Myrobalanis; aut saltem Hermodactylis, permixtis Scammonio aut Diagridio, & reliquis.

*Pilula Sancta, Italarum,
ad Luem Veneream.*

R. Trochisc. Alhandal Scammonii
Salis Gemmæ

Sagapeni ana æquales partes.

Cum Rhodomelite fiat massa. Dosis ʒ β.
Ob Sal Gemmæ humida massa est. Quidam ex Succo Porri parandam iubent.

Chylisma Pilularum, Saccharo conditarum, Thomæ Plateri.

R. Specierum Diambarû, vel Diamargarit. frig. ʒ β.

Cinnamomi selectissimi ʒ j.

Spiritus Vini lib. iij. Macerentur per dies aliquot in vase vitreo, probè obli-
to, ne quid expiret. Vas quotidie agitari debet: deinde relictis in fundo vasis facibus, adde

Trochisc. Alhandal, Rhabarb. electi
ana ʒ vij.

C c 2 Senæ

Senæ mundatæ, & Gratiolæ præparatæ
contusarum ana ʒ vj. β.

Turbith & Dacrydii, (Italico more para-
ti,) ana ʒ vj.

Agarici candidissimi ʒ iv.

Veratri nigri legitimi ʒ iij.

Omnia incisa macerentur in eodem li-
quore per dies xiv. Colentur, & deinde
distillantur in balneo Mariæ, ad consisten-
tiam, secundum artis præcepta. Tunc ad-
de Aloës Succotrinæ selectissimæ, in pul-
uerem redactæ & præparatæ, ʒ x. Formen-
tur Pilulæ. Obuoluantur puluere Cina-
momi aut Glycyrrhizæ, & exactè siccen-
tur per se in umbra. Deinde accipe Albu-
men vnius Ovi, vel q. s. & in eo dissolue
Gummi Tragacanthi ʒ j. pul v. Sacchari
albissimi q. s. ex lib. β. operiantur primo
tegumenti involucro. Deinde conditura
absoluatur, vt cæterorum tragematum.

Dosis à ʒ j. ad ʒ β. vel ʒ j.

Si Extractum volueris conseruare in
formâ Opiatæ, tunc adime Trochiscos
Alhandal; quos vltimò miscere poteris.
Aufer item Aloën, & adde eorum loco Ca-
tholicum commune, eodem pondere. Da-
tur in ea forma ad ʒ j. vel ʒ j. β.

Hac artis lege pleraque alia Catapotia
& Medicamenta in gratiam molliculorum
& morosorum nitidè cōflabat Ludouicus
Myreus, Matthiæ Lobelii gener; Anisum
item

item laxatiuum, Cari semen, & similia;
vri Semen contra vermes, descriptum in-
ter pulueres à prædicto Myreo.

Cremor Tartari.

℞. Tartari subtilissimè triti lib. j.

Superaffusa aqua decoquatur terreo va-
se Inter coquendum Spumam colligito,
& siccatò; quam Tartari Cremorem
appellant. Per se exhibitus, blandè purgat.
Alii calculosis cum Dacrydio exhibent,
pro arcano magno.

*Trochisci è Minio, corrodentes,
Ioannis de Vigo.*

℞. Medullæ panis crudi, bene fermentati
℥ iv.

Sublimati electi ℥ j.

Minii ℥ β.

Aquæ Ros. q. s. Fiant Trochisci. Sic-
centur calore clibani tepidi.

His sæpiissimè vtuntur Chirurgi.

Oleum Rosatum completum.

Fit ex Oleo dulci & maturo, & Rosis
expansis, contusis, & soli expositis, & le-
uiter decoctis in duplici vase, vt Oleum
Ros. omphacinum componitur.

C 63

Hoc

Hoc ad dolores conuenit. Post annum
 valet adhuc ad confortationem & doloris
 mitigationem. Omphacinum verò post an-
 num inutile est ad refrigerandum & repellen-
 dum. Quare pro completo usurpari potest se-
 cundo & tertio anno. Regiones autem quæ ca-
 rent Oleo Omphacino, addere possunt Ompha-
 cium & Plantaginem, vel Succum Rosarum,
 in infusione Rosarum, vel iteratis infusionibus
 adstrictoriam vim oleo conciliare: aut tempo-
 re Vuæ acerbæ coquere in Oleo dulci quantitatem
 sufficientem prædictæ Vuæ, cum acinis, ad ad-
 strictionem.

*Syrupus de Hedera terrestri,
 siue Pulmonarius.*

℞. Hederae terrestris Hyssopi
 Veronica Pulmonariae Melissæ ana ʒ β.
 Vini optimi lib. ij. β.

In fusione facta per aliquot horas, co-
 quantur s. a. addendo Sacchari albissi-
 mi lb. j.

Vsitatus est in vitiis pulmonis, & phthisi,
 ac aliis fluxionibus ad pectus decumben-
 tibus.

Aqua Cinnamomi, contra Epilepsiam.

℞. Cinnamomi optimi lib. j.
 Sem. Pæoniae recentis ʒ j.

Gal-

Gallitrichi Caryophyllorum an. ʒ v.
Visci quercini Rad. Præniæ ana ʒ β.
Incisa & contusa omnia macerentur in
aq. Cinnamomi q. s. per dies octo. Dein-
de fiat destillatio per balneum.

Morselli Laxativi.

℞. Conseruæ Violarum Boraginis
Buglossi ana ʒ ij.
Corticum Citri ʒ j.
Zingiberis ʒ j. β.
Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ ij.
Dacrydii ʒ vj.
Fol. Senæ, Turpethi ana ʒ β.
Croci ʒ j.
Sacchari albißimi lib. j. Alii sumūt ʒ viij.
Fiant Morselli.

Passule purgantes, cum Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari optimi ʒ j.
Spicæ Indicæ ʒ ij.
Cinnamomi ʒ iiij.

Incisa infundatur in vino dulci recenti
quantū satis fuerit. Facta vna atque altera
ebullitione, & Saccharo pauco, vt dulce-
scat, addito, cum hac irrorentur Passularum
vnciæ octo, donec ad consistentiam perue-
niant, in loco calido, secundum artem.

Cc 4

Empla-

Emplastrum ad Hydropem.

℞. Stercoris colūbini aceto macerati ℥. j.
 Sulphuris viui ℥. j.
 Nitri, vel Salis Gemmei ℥. β.
 Pul. Rad. Enulæ Baccarum Lauri
 Anethi Florum Chamemeli an. ʒ. vj.
 Sem. Nasturtii ʒ. ij.

Decoquantur omnia in Vino ad consistentiam, & addantur

Mellis ℥. ij. Terebinthinæ ℥. j. β.
 Succu Ebuli ʒ. ij. Iridis ʒ. j.
 Farinæ Fabarum ʒ. j. β. Fiat Emplastrum.
 Patauii vñtatiſſimum est.

Emplastrum ad callos pedum efficax.

D. Iac. Cargilli Scoti.

℞. Gummi Ammoniacy Aceto soluti ℥. j.
 Vitrioli Romani, Calcis viuæ ana ʒ. vj.
 Viridis Æris ʒ. β.
 Auripigmenti, Cantharidum ana ʒ. j.
 Cera nouæ ʒ. iiij.
 Olei Chamemelini & Euphorbii ana q. s.
 Fiat Emplastrum.

Emplastrum è pelle Arietinâ, ad hernias, Arnaldi de Villâ Nouâ.

℞. Lithargyri Auri Lapidis Hæmatitis
 San-

Sanguinis Draconis Boli Armeni

Mumia Galbani Turis

Lumbricorum terrestrium ana 3 β.

Picis naualis Colophoniam

Cerae albæ & rubræ ana 3 j.

Rad. Consolidæ maioris, minoris & medice ana 3 iij.

Rosarum rub. Myrrhe Aloës ana 3 iij.

Stellæ marinæ combustæ

Gallarum combustarum

Aristolochiæ rotundæ ana 3 vj.

Visci Quercini Terebinthinæ ana 3 iij.

Sang. hominis rufi lib. j. minus quarta.

Conficiatur hoc modo: Pellem Arietinam, recenter detractam seu excorticatam, cum pilis, coque ad dissolutionem. Colaturæ lib j. misce Viscum Quercinum dissolutum. Cum spatulâ stanneâ agitur. Deinde Ceram, Picem, Colophoniam adde. Ammoniacum & Galbanum dissolvantur in Aceto, & colentur. Addatur deinde pulvis aliorum: Ultimo loco odorata, & quæ minorem calfactionem ferre possunt. Postremò Terebinthinæ Sanguis permisceatur. Vermes in Vino cocti, & diligenter triti, commisceantur. Coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis Ol. Rosato vel Cydoniorum; non Violaceo, vt vulgus facit. Malaxentur: fiant magdaleones. Ego, inquit Lobelius, tantum mutavi, quòd pro Palleam

C c s leam

610 FORMVLÆ SELECT. PHARM.

leam Marinam, Stellam legerim, qua est
ad id efficacissima. Quid Sanguinis hominis
rubi legitur, censerem potius hominis pitui-
tosi legendum, qui sanguinem viscosiorem &
tenaciorem habet. Satis siccant alia medicamen-
ta: sed parum refert. Nam oporteret accipere
sanguinem eorum qui truncantur capite, in
quibus fuit venalis & arterialis: & sic est satis
siccus & viscosus.

FRAN-

FRANCISCI DISSALDEI

D. Medici Parisiensis Regii

PHARMACONETES,

siue

PHARMACITIS BIBLOS:

Liber continens PHARMACA tant
Simplicia quàm composita, quæ
in Officinis parata habere debent
Pharmacopœi.

Apud Galenum lib. 6. Comp. Med. Gen.
 cap. 7. reperias Andromachum scripſiſſe
 librum *Φαρμακωνίτην*, de Remediis quæ ex-
 trinſecus corpori admoventur. Sed legen-
 dum, vocabulo non admodum uſitato,
Φαρμακωνίτην, ut ſit Liber comparātorum
 Remediorum: ad eum modum quo apud
 Pollucem citatur ex Dinarcho *αὐτωνήτης*:
 aut vocabulo uſitatiſſimo *Φαρμακίτην*.

POPVLO SALMVRIENSI

Fr. Diffaldeus Medicus

S. P. D.

CONQUESTI sunt apud me sapius vestri pharmacopœi (Cines optimi,) quod in tanto Medicamentorum, tam Simpli-
cium quàm Compositorum pelago harentes, quæ in medicum usum parare, quæ omittere debeant, ignorent. Vnde fit, ut Officinis, copiâ alioquin Remediorum laborantibus, ea sæpe defint quæ ad morborum curationem sint necessaria. Hinc quanta agris perniciës oriatur, Eïs p̄p̄s Iñ-
Téxxv̄ i x̄nnois non difficile dictu est; non paruo etiam ipsorum Pharmacopœorum damno, qui necessariis dum sæpe carent, multa inutilia sita sibi corrumpi experiuntur. Ego itaque ex longo usu, multumq̄ tritâ, quam vestri habeo, experienciâ, agrorum bono publico hac exaravi, ut in posterum nec medicis desit quod præscribant, nec pharmacopœis, quo medicorum præscripta exsequantur: Et venia locus non sit, si eorum Officine aut necessariis carent, aut pravis scient. Volo præterea, ut hoc perpetuò meminerint Pharmacopœi, hæc sibi Pharmaca tantum esse, hoc est, si ex suo arbitrio abutantur, venena præsentissima; sin ex arte ac methodo à peritis medicis in usum traducantur, remedia efficacissima: atque ut piè simul ac eleganter

Cc 7

ab He-

ab Herophilo olim dictum, ad restituendam sanitatem $\chi\epsilon\iota\gamma\alpha\varsigma$ $\delta\epsilon\omega\nu$. Ne ergo eorum usum sibi permittant temerarii; aut, si permiserint, tenerè in eos à iudicibus, quibus publica salutis cura tradita est, animadvertatur. Servavi autem in his scribendis eam temperiem, ut ex Simplicibus ea tantum enumerarem, quae in Officinis asservari solent, iis quae ex tempore colligi possunt omisissis, & iis etiam quae ad illustrum tantum & magni nominis Compositionum dispensationem comparanda veniunt; quod ea satius sit recentia habere, quam carie exesa & vetustate exsoluta, ex Officinis in usum producere. Ex Compositis autem, ea etiam sola in unoquoque genere recensui, quae & selectiora sunt, & usu frequentiora, & magis ad salutem agrorum comparandam necessaria; iis quae in vulgatis Dispensatoriis descripta habentur, solo digito, ut aiunt, indicatis: iis autem quae vulgò non extant, integris adscriptis. Sic factum spero, ut hic Medicamentarius libellus, & mole minor multò, & suis tamen numeris omnibus ornatior ac cumulatior prodeat. Notas etiam huc illuc adpersi, lecturis, nisi me animus fallit, non inutiles futuras. Hac si publicè profunt, satis superq; mihi est; qui in hoc mustaceo laureolam non quero. Vivite, ac Valete.

615
Φαρμακωνητης, η Φαρμακητης βιβλος,

hoc est,

MEDICAMENTARIUS LIBELLVS,

feu

LIBER CONTINENS PHARMACA,
TAM SIMPLICIA QUAM COMPOSITA,
quæ in Officinis parata habere
debent Pharmacopœi.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

TERRENA & MARINA

Bolus Armena.

Terra sigillata.

Fragmenta pretiosa.

Lapis { Bezaardicus

{ Sanguinalis

{ Iudaicus,

{ Lazuli.

Bitumen Iudaicum

Ambarum Griseum

Corallium.

Margaritæ.

Succinum.

Arsenicum.

Ærugo.

Cadmia, seu Lapis

Calaminaris.

Pompholyx.

Cerussa.

Sulphur { Viuum
Excoctum
Flores Sulphuris

Alumen.

Sal gemmæ

Chalcanthum

Vitriolum Romanū.

Chrysocolle nostra,

sive Borax, res fa-

ctitia.

Argen-

METALLICA.

Lithargy-
rum

{ Auri

{ Argenti

Argentū vium	{	Simplex	Salvia.
		Sublima- tum	Vitex, seu Agnus.
		Præcipi- tatum	Senna Epithymum Cuscuta.

P L A N T A R V M

R A D I C E S.

Folia, cum surculis.

Summitates Rubi	Angelicae
Equisetum	Asari
Herniaria	Aristolochiarum trium.
Absinthiū latifoliū	Altheae
Ceterach	Capparum, cortex.
Artemisia.	Acori vulgaris.
Calamintha.	Asari
Euphrasia	Galangae
Caryophyllata, cum radice.	Helenii
Mentha,	Pyrethri
Origanum.	Paoniae
Pulegium	Tussilaginis
Betonica	Ireos Florentinae.
Verbena	Acori veri, siue Ca- lam aromatici vul- garis.
Periclymenum seu Caprifolium.	Cyper.
Chamaedrys	Spicae Nardi.
Chamaepitys	Sinarum, seu Chinae.
Centaurium minus	Sassa Parilliae.
Hypericum	Ellebori { Albi.
Melissa	{ Nigri.
	Rha-

Rhabarbari.

Polypodii.

Agarici. *Fungus est
inter radices adnu-
meratus.*

Hermodyctylorum.

Turbiti.

Glycyrrhizæ.

Pentaphylli.

Bistortæ.

Tormenille.

Plantaginis.

LIGNA.

Aloës

Guaiaci

Nephriticum

Visci quercini

Sassafras

Santali { Albi
Rubri
Citrini

CORTICES.

Guaiaci.

Tamaricis.

Radicum Capparum.

Turis.

Cinnamomi.

Macis.

Fraxini.

Sambuci.

Mali Citrii.

Mali Aurantii.

Cupulæ Glandium.

Malicorium.

FLORES

Verbasci albi.

Rosarum Rubrarum

Violarum.

Cichorii

Nymphææ,

Balaustrorum,

Cytinorum

Buglossi.

Boraginis.

Croc.

Betonice.

Caryophyllorum.

Rorismarini.

Agni.

Pæoniæ.

Sambuci.

Anethi.

Chamemeli.

Meliloti

Geniste.

SEMI-

SEMINA.

Cydoniorum.

Psyllii.

Acetosę.

Hyoscyami { albi.
nigri.Quatuor { maio-
feminafrig. } ra.
 { mino-
 } ra.Capita Pa- { albi.
paueris. } nigri.

Hordei excorticati.

Berberis.

Malua.

Althæa.

Raphani.

Atriplicis.

Cnici.

Periclymeni.

Bombacis.

Coriandri.

Vrticæ.

Cumini.

Sinapi.

Ocimi.

Citri.

Nigellæ Romanæ.

Pæonia.

Agni, seu Viticis.

Lini.

Fœnigraci.

Lithospermon.

Saxifragæ.

Lupini.

Orobi.

Fabę.

Quatuor fe- { maio-
minacalida. } iora
 { mino-
 } ra.

FRUCTVS.

Amygdala { dulcia.
 } amara.

Ficus.

Gallæ

Nuces Cupressi.

Nuces Moschatę

Dactyli

Sebesten.

Iuiubæ.

Tamarindi.

Damascenæ.

Passulę { Corinthia-
 } cæ.

Vulgares.

Cassia

Cassia cathartica.

Falicacabi.

Quadruplex genus

Myrobalanorum:

ad bilem, Citrina;

ad melancholiam

Inda; ad phlegma

Cepula & Empe-

litica. *Quintum ge-**nus Beletzicorum ad**densanda tantum**coria usurpari ait**Garciae ab Horto.**Vetat tamen omitti**sincera sedulitas in**Compositionibus in**quibus prescribun-**tur.*

Colocynthis.

Lauri

Myrti

Bacce

Iuniperi, in

vino rubro

generoso

preparata.

Grana Kermes.

Rotū-

dum.

Piper

Lon-

gum.

al

bū

ni

grū

SVCCI INSPISSATI.

Absinthii latifolii

Græco-

rū, seu

Agri-

moniæ.

Eupatorii

Mesuæ,

seu A-

gerati.

Auicē-

næ, seu

Canna-

binæ.

Glycyrrhizæ.

Chelidonii maioris.

*Ex foliis, caule, radi-**ce, exprimatur suc-**cus ineunte æstate in**areo vase cum melle**prunis decoquatur.**Servetur ad ocula-**ria remedia.*

Cremor Tartari.

Sapa.

Ladanum.

Asa foetida.

Opium.

Aloë.

Manna Arabum, siue

Mel aërium.

Scam-

Scammonium.

Mel.

Saccharum

Cera.

SVCCI LIQUIDI,
superfuso Oleo.

Lupulorum

Rosarum

Cydoniorum

Berberis

Ribes.

Cichorii.

Citri, seu Limonum.

VINA.

Absinthites.

Euphrasiatum.

Passulatum.

GUMMI ET RESINÆ.

Tragacanthum.

Arabicum.

Caphura.

Sandaracha Arabum.

Bdellium.

Galbanum.

Myrrha.

Mastiche.

Tus.

Styrax { Solida.
 { Liquida.

Benzoinum.

Ammoniacum.

Terebinthina.

Euphorbium.

Sagapenum.

Opopanax

Pix.

ANIMALIA,

& eorum partes at
excrementa.

Cantharides.

Pulmo Vulpis.

Hepar lupinum.

Adeps { Gallinæ.
 { Anseris.
 { Anatis.

Castorium.

Dens apri.

Vnicornu.

Ebur.

Cerui { Genitale.
 { Cornu.
 { Sebum.
 { Medulla.

Ossordis { Bouis.
 { Cerui.

Cra-

Cranium hominis
non sepulti.

Hirci { Sanguis.
Sebum.

Sericum { Crudum.
Intinctū

iucco Ker-
mes. Sericū in quibus conficiendis

vulgarū Cra-
mesū ve-

nenatū est,
Arsenico

infectum.
Coagulū.
Pili even-
tre.

Vngula { Alcis.
Asini.

Moschus.

Zibertum.

*Reliqua sedulā diligē-
tiā comparabunt Phar-
macopœi in dispēsatione
singularū Cōpositionū:
in quibus conficiendis
advocabunt Medicos.*

*Quæ verò recentia, at-
que (ut vocant) viri-
dia colliguntur, ut re-
frigerantia atque hu-
meclantia ferè omnia,
ea ex tēpore, pro usu ac
necessitate parabuntur.*

COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis
nomine tenus indicantur.

Decoctio Clysteris carminativa.

℞. Seminum Anisi Fœniculi

Cumini ana ℥ β.

Maccharum Lauri contusarum ℥ iiij.

Œlorum Chamæmeli & Anethi ana m. β.

Coque in aquâ communi ad dimidias.

Deco-

*Decoctio communis Clysterum
remollientium.*

℞ Maluæ Violariæ Parietariæ
Betæ Mercurialis ana manip. j.
Foliorum Liliorum alborum m. β.
Seminis Fœniculi ℥ β.
Coque in aqua sufficiente.

Decoctum pectorale simplex.

℞. Hordei mundati ℥ j.
Capilli Veneris Scabiosæ Tussilaginis
ana m. j.
Hyssopi m. β.
Passularum mundatarum ℥ vj.
Sebesten, Iuiubarum ana num. xv.
Dactylorum num. vj.
Caricarum pinguium num. iiij.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Fiat decoctio ex arte in ℞. iij. Aquæ flu-
uiæ, ad consumptionem libræ vnus.

*Decoctum pectorale compositum,
cum Sena.*

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. β.
Parum bulliant in Decocti superioris
colati libræ vna & dimidia. Infundantur
sex horas; postea exprimantur leuiter.

Deco.

*Decoctum commune medicine,
cum & sine Sena.*

℞. Radicum Polypodii quercini ℥ β.
Passularum mundatarum ℥ ij.
Sedebsten · Prunorum ana num. xij.
Foliorum Boraginis Violarum Rosarum ru-
brarum ana ℥ ij.

Fiat decoctio secundum artem.

Vt fiat compositum,

℞. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij β.
Parum bulliant in decocti superioris
lib. j. β. addita Caryophyllorum ℥ j. In-
fundantur sex horas : postea leuiter expri-
mantur.

Lac Virgineum, ut est apud Weckerum.

℞. Aluminis crudi ℥ iiij.

Quæ fluuiæ lib. ij.

Decoquantur ad tertias. Postea

℞. Lithargyri lib. β.

Aceti optimi lib. j. β.

Coquantur, donec remaneat libra vna.
Admixtæ aquæ colatæ misceantur, & agi-
tentur, donec lactis colorem adipiscantur.

*Potio vulneraria, sine Decoctum
Sclopetarium, ut vulgo paratur.*

℞. Cancrorum fluuiatilium vstorum, &
subti-

subtilissimè puluerisatorum 3 ij.
 Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Conscida maioris

Foliorum Prunellæ

Baccarum Lauri ana 3 j.

Contundantur crasso modo: includantur linteis raro, & bulliant in Vini albi libris tribus, donec tertia pars consumpta sit: addendo circa medium decoctionis Vincæ Peruinæ pugillum vnum.

Fiat colatura.

ALIA COMPOSITA.

Saccharum Rosatum tabulatum.

Saccarum Penidiatum, ex aqua Hordei

*Baccilli Bechici, vulgo
 Rebecha dicti.*

℞. Pulueris Diaireos, Diatragacanthi frigididi ana 3 ij.

Pulueris Glycyrrhizæ 3 β.

Sacchari canditi 3 iij.

Sacchari Tabarzeth, hoc est albissimum lib. j. β.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Rosarum soluto fiat pasta, ex quâ parentur Bacculi, ad vsum reponendi.

Me

LIBELLVS MEDICAMENT.

62 9

Mel { Rosatum.
Violatum.
Anthosatum.
Mercuriale, ex succo non decocto pa-
ratum: quod quidam pessimè faciūt.

CONSERVÆ.

Rosarum { Liquida
Solida

Violarum.

Nymphææ

Cichorii.

Boraginis.

Anthos.

Radicum { Inulæ.
Symphyti.
Eryngii

Surculorum tenerorum Absinthii latifo-
lii excorticatorum.

Diacynorrhodon cū paucō Saccharo paratū
Cydoniatum.

Corticum { Arantiorum.
Citriorum.

Fructuum { Cerasorum, Berberis, Ribes,
Omphacii, Cornorum,
Mororum semimaturorum

SYRVI.

Rosarū pallidarū, nouem { Simplex &
ad minimum infusionum { Cōpositus cū
Agarico.

Dd

Rosa-

Rosarum rubrarum siccarum, ex libra vna
Rosarum, horis viginti quatuor infu-
sarum in aquæ tepidæ lib. iiij: & expres-
sione coctâ cū Sacchari albißimi lib. ij.

Violarum { Violatus,
Laxatiuus, ex nouem infu-
sionibus.

Floribus arborum Persicarum.

De Symphyto.

Florum Nymphææ simplex, *ex duabus in-
fusionibus, apud Ioubertum.*

Cydoniorum { Cum Saccharo.
Sine Saccharo excoctus.

Malorum granatorum *acido-dulcium: vel
ex aquis partibus acidorum & dulcium.*

Berberis.

Aciditatis Citri.

Syrupus è Corticibus Mali Citrii.

℞. Corticum Malorum Citriorum re-
centium, in aqua maceratorum & præ-
paratorum lib. j.

Coquantur in aquæ lib. vj, donec lib. ij.
superfint: & cum lib. iiij. Sacchari albi
fiat Syrupus.

Condiatur pars vna Syrupi Moschi gra-
mis duobus, Ambraë griseæ grano vno.

De Pomis Simplex, & Compositus, Sa-
boris Regis. Isque duplex: scilicet cum
simplici Senna, & cum triplicata Senna.
Iu.

Iuiubinus.

De Tussilagine

De Glycyrrhiza. *Sed pro aqua Rosarum accipe aquam infusionis Rosarum pallidarum, ex Fratribus Minorum consilio.*

Adiantinus { Communis.
 Monspeffulensis, prout haberi poterit.

De Althæa.

Syrupus de Stœchade, descriptionis Fernelii.

℞. Florum Stœchados ʒ iiij.
 Thymi Calaminthes Origani an. ʒ i. β.
 Saluæ Betonicæ Florum Rorismarinæ ana ʒ β.

Sem. Rutæ Pæoniæ Fœniculi ana ʒ iiij.

Coquantur in aquæ libris decem ad dimidias. In colatura adde Sacchari & Mellis ana lib. ij. Fiat Syrupus, aromatizatus Cinnamomi, Zingiberis & Calami aromatici ana ʒ ij. raro linteo ligatis, & in Syrupo appensis.

De Absinthio, Mesua. *Ex Absinthio nostrate latifolio, prius seorsim in aqua tepida macerato.*

De Artemisia. *In quo cur pro Buglossa necessario substituendum sit Albugilissa, ut voluit Iouberius, non video: cum Buglossum verum, quæ nostra Borago est, vel solo flora*

D d 2 men-

menes potenter moueat, & succo etiam secundinas deiiciat. Attamen Anchuse primæ radix (quæ Arabum Albugilissa est) apud Dioscoridem vulua indita etiam foetus mortuos extrahere dicitur. Ita ut parum referat, utram ponas, Anchusam aut Boraginem. Verum correctior multo est & melior descriptio Syrupi de Artemisia apud Fernelium: eamque sequendam puto.

Syrupus de Artemisia, Fernelii.

℞. Artemisiæ manipulos ij.

Rad. Helenii Rubiæ Pæoniæ

Leuistici Fœniculi ana ʒ ʒ.

Pulegii Origani Calaminthes

Nepitæ Melissophylli Sabinæ

Sampsuchi Hyssopi Prassii

Chamædryos Chamæpityos

Hyperici Parthenii Betonici ana
manip. j.

Seminis Anisi Petroselini Fœniculi

Ocimi Dauci Rutæ Nigellæ ana ʒ iiij.

Contusa macerentur horis viginti quatuor
in Hydromelitis libris octo.

Coquantur ad lib. v. & cum Sacchari
℔. v. percoquantur in Syrupum, conditum
Cinnamomi vnciâ vnâ, Spicæ drachmis
tribus.

De Mentha simplex, cum Saccharo paratus.

De Ci.

De Cichorio { Simplex, ex succo Cichorii,
& Sacchari dimidio.
Compositus, Nicolai Flo-
rentini, (non Prepositi, qui
Rheum octuplum ponit.)

Ex capitibus vtriusque Papaueris.

Papaueris Rhœadis.

Diamoron Mesuæ.

Oxysaccharum simplex.

Oxymel simplex dilutum.

Oxymel Scilliticum merum, & sine aqua,
aut saltem

Acetum Scilliticum, ex quo in rem presen-
tem posset Oxymel parari.

*Syrupus Diacheloncon, seu de Te-
studinibus.*

Rz. Carnis Testudinum ℥ iiij.

Hordei mundati ℥ ij.

Carnis Dactylorum ℥ j.

Passularum Damascenarum

Glycyrrhizæ rasæ ana ℥ vj.

Sebesten Iuiubas ana num. xij.

Seminis Bombacis Melonum

Cucumeris Citrulli ana ℥ β.

Sem. Lactucæ Papaueris albi ana ℥ ij.

Vngulæ caballinæ Pulmonariæ an. man. j.

Florum Violarum Nenupharis an. ℥ β.

Fiat decoctio, vt decet.

In colatura clarificata, ad lib. iiij. adde
D d 3 Sac-

Sacchari albiſſimi lib. ij. Sacchari Roſati & Diatragacanthi frigidi ana ʒ v.

Fiat Syrupus perfectè coctus.

Teſtudinum caro (amputatis collo, cauda & pedibus) à ſordibus repurgetur: incidatur in fruſta; ſimul cum reliquis coquatur. Deinde colaturæ adde Saccharum Roſatum, & Diatragacanthum. Loco Diatragacanthi quidam ſubiiciunt Saccharum Penidiatum. Vtrumque non malè.

PVLVERES.

Lumbricorum.

Diamargaritum frigidum	} Cum Ambra & Moſcho.
apud Siluium	
	} Sine Ambra & Moſcho.

Triſantali Nicolai.

Diarrhodon Abbatis, apud Nicolaum.

Aromaticum Roſatum Gabrielis, apud Meſuem.

Diambra.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Diairis ſimplex Meſuæ

Diacarthami Arnaldi de Villa noua apud Siluium.

E L E.

ELECTVARIA

PURGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi, *additis aquis
partibus Cassia & Mellis, ac non decoctâ
Cassia.*

Catholicum { Expulucibus
Ex infusione puluerum,
Senna & Rheo duplicatis
sic parandum, vt sequitur.

*Catholicum ex infusione puluerum,
Sena & Rheo.*

Rx. Rad. Polypodii semisiccati
Foliorum Senæ mundatorum ana \mathfrak{z} vj.
Violarum \mathfrak{z} iiij.

Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana \mathfrak{z} ij.
Glycyrrhizæ rasæ

Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-
datorum ana \mathfrak{z} j.

Contusa omnia (exceptis Senâ, Semi-
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-
larum) macerentur horis xxiiij in aquæ
fluuię quantitate sufficiente (vel lb. v.) po-
stea coquantur leuiter in balneo Mariæ.
Paulo antequam ab igne remoucantur, ad-
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-
larum

D d 3

larum Flores. Macerentur calidè aliquot horas in balneo. Vbi refrixerint, linteolo colentur, & exprimantur leuiter. Colaturę pars vna seruetur pro infusione Rhabbari: Altera iterum coquatur, donec in consistentiam Mellis crassescat: adiectis Sacchari albi lib. viij. & addendo in fine decoctionis infusionem vnciarum viij Rhei electi, seorsim factam in parte reseruata decoctionis Polypodii. Iterum coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum Cassiæ (extractæ ad vaporem decocti præscripti) & Tamarindorum an. ʒ viij Sacchari Candi, & Penidiorum ana ʒ ʒ.

Fiat Electuarium.

Tryphera Persica Mesuæ, ex correctione Fratrum Minorum, apud Ioubertum.

Diaprunis { Simplex.

Nicolai. { Solutius. *Et quia breui accescit, quo tempore Pruna recentia desunt, paratur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potius quàm ut acidum in vsum recipiatur.*

Confectio Hamech maior, apud Mesuem. Huic cur minorem, minùs efficacem, praeferat Ioubertus, non video. Ingrata est: sed non detur delicatis. Neque reprobandum pato Serum lactis, quod longis infusionibus aceasca (parcant mihi docti viri.) Nam Serum non idèò reuiculus, quod acidum. Tale enim & tenuius,

uius est, & magis refrigerat; ideoque magis
domat acrimiam acrimoniam, & felicius eorum
que infunduntur vires elicit. Denique cur in hac
Compositione improbabitur Serum acidum,
cum in Tryphera Persica & Diaphœnico fera-
tur Acetum? Verumtamen, si displicet quod
in hac Compositione multa sine arte & confusè
traduntur. Nam cur Rhabarbarum coquitur?
(coquitur quidem Mesue; sed recens, puta,
compactum ac validum: at nostrum inuetera-
tum, laxum, propterea que euandidum, constat
coctione vim catharticam amittere: Annon
Cassia & Manna cum Tamarindis cocta cor-
rumpuntur? Annon Dacrydii vires coctione ex-
soluuntur? praterquam quod sic aliis non fa-
cilè Dacrydium commiscetur, ita vt in omnibus
Compositionis partibus par facultas non repe-
riatur?) si cui, inquam, hac displicent, præ-
feratur ea, quæ ex Fernelii censura & artificio-
rior & efficacior est; cuius descriptio sequitur.

*Confectio Hamech, ex censura
Fernelii.*

℞. Corticum Myrobalanorum citrina-
rum ʒ ij.
Myrobal. Cepularum Myrobal. Indarum
Violarum Colocynthis
Polypodii querni ana ʒ j. β.
Absinthii Thymi ana ʒ β.
Seminum Anisi Fœniculi
D d 5 Rosa-

Rosarum rubrarum ana ʒ iij.

Tusa omnia macerentur per diem in lib. ij Seri lactis : deinde coquantur ad libram vnam. Fricentur manibus, & exprimantur.

Colaturæ adde

Succi Fumariæ Pulpe Prunorum, & Vuarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. ℥. j.

Coquantur ad consistentiam Mellis : inspergendo sub finem

Agarici & Senæ pulueratorum ana ʒ ij.

Rhabarbari triti ʒ j. β. Epithymi ʒ j.

Dacrydii ʒ vj.

Cinnamomi ʒ β. Zingiberis ʒ ij.

Sem. Fumariæ Anisi Spicæ Nardi an. ʒj.

Fiat Electuarium.

Benedicta laxatiua Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Galeni.

Hiera diacolocynthidos Pactii, ex Scribonio Largo, bono medico, in usum renocata.

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepsi.

Caryocostinum Garyopōti, apud Ioubertum capite de Benedicta.

Hydragogum Fernelii { Maius.
Minus.

Nullum vulgè extat Hydragogum in Officinis. Idè duo hæc hîc addēda existimaui. Minus minus est, ita ut grauidis etiam dari possit: Maius validius, & non nisi paulo robustioribus idoneum.

Hydra-

Hydragogum minus, Fernelii.

℞. Succi Rosarum pallidarum lb β.
 Sacchari albi Mellis optimi ana ℥ xv.
 Coquantur dum exspumaucrint & crasse-
 scant. Tum adde

Succi radicum Ebuli lib. j.
 Prassii sicci Sem. Fœniculi tritorum
 ana ℥ ij.
 Acinorum Ebuli & Sambuci ana ℥ ij.
 Cinnamomi ℥ vj.
 Macis Galangæ ana ℥ iij.
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-
 sitiem.

Hydragogum maius Fernelii.

℞. Seri lactis lib. vij.
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex
 aceto coctorum ana ℥ x.
 Mannę Calabrinę ℥ v.
 Coquantur igne lento, ad Mellis consti-
 tentiam. Sub finem adde

Foliorum Laureolę præparatę ex Oleo
 Amygdalarum dulcium & Aceto ℥ ij.

Præparatio Laureolę sic faciendā : Folia
 Laureolę macerentur horis xxiiij in Ace-
 to & Succo Portulacę, vel Mali Granati:
 modicę coquantur : exprimantur, siccen-
 tur, terantur. Deinde affunde Aquę Ro-
 sarum

D d 6

farum lib.ß. Olei Amygdalarū dulciū ʒj.ß.
 Bulliant rursus ad consumptionem aquæ.

Pulvis cum superstito Oleo addatur in
 Compositionem.

ELECTVARIA PURGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Noua,
 apud Siluium. *Hoc Electuario nullum in vſu
 frequentius; nullius descriptio in Dispensariis
 minùs constans.*

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi,
*cum suo Scammonio toto, contra sententiam
 Siluii; ut verè sit Calcar medicinarum.*

De Citro solutium Guidonis, apud Iouber-
 sum. *Nam in aliis ferè Sena omittitur.*

ELECTVARIA VOMITORIA.

Electuaria vom- { Mitius.
 toria. { Validius.

*Nulla extant in Officinis & Dispensatoriis
 vulgaribus vomitoria composita. Idè & hac
 hic addere, optimum putavi. Scio parari posse
 in rem præsentem, sed qua careant beneficio fer-
 mentationis.*

Mitius, Diasarou dictum Fernelio, sic
 paratur.

Dia-

Diasaron, Fernelii, vomituum mitius.

℞. Syruporum Menthae & Violarum
ana ℥ viij.

Coquantur ad consistentiam Mellis. Su-
finem, subducto igne, insperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani & Vrticæ, maceratorum in
aqua Rosarum, arefactorum & trito-
rum ana ℥ j.

Radiciis Asari tritæ & cretæ ℥ ij.

Cinnamomi Sem. Fœniculi ana ℥ iij.
Fiat Electuarium.

Validius, imò validissimum Dielleborou,
in morbis contumacibus, robustis corporibus,
ac thoracis ampli, facile vomentibus, atque cor-
pore rite preparato usurpandum.

*Dielleborou, Fernelii, vomituum
validum.*

℞. Caryophyllorum ℥ ij.

Fibrarum Ellebori albi siccarum & incisa-
rum lib. j.

Aquæ lib. xiiij.

Fiat infusio per tres dies. Hinc fiat deco-
ctio ad consumptionem mediæ partis:
& facta diligenti expressione, abijcia-
tur Elleborum. Tum adde

Mellis ℔ vij.

Dd7 Syru-

638 FR. DISSALDEI

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ℥ iij.

Repetatur coctio, donec reducatur ad
consistentiam Mellis.

Electuarium vitreo vase excipiat ; &
seruetur ad vsus.

ELECTVARIA ALTERANTIA.

Electuarium contra vermes.

℞. Farinæ Lupinorum ℥ ij.

Corallinæ Dictamni albi ana ℥ j. β.

Cornu Cerui, Sem. Caulium ana ℥ j.

Rhabarbari ℥ β.

Fiat pulvis, diuidendus in duas partes.

Utraque pars coquatur seorsim, cū Saccha-
ri in aqua Graminis dissoluti ℥ iij. Sed
vni parti adde Dacrydii ℥ ij. Trochisco-
rum Alhandal gr. vj.

Diacodium solidum.

℞. Capitem Papaueris albi cum suis se-
minibus, quantum voles : Coque: for-
titer exprime. Decocti expressi libra
vna coquatur cum altera libra Sacchari,
ad consistentiam Confectionis Manus
Christi, rudiculâ aliquamdiu agitando.

Serue-

Seruetur ad distillationes ferinas.

Potest parari candidius & suauius ex solo semine, sed minus efficax.

Philonium Persicum Mesuæ.

Philonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rafis.

Diasatyrium. (*Nam & huius vsus sapientulè necessarius est.*) Ex tribus autem eius descriptionibus, sequens præfertur Fernelio.

Diasatyrium, Fernelii.

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ

Radicis Pastinacæ satiuæ Rad. Eryngii

Nucis Indicæ Strobilorum

Pistaciorum ana ʒ j. β.

Caryophyllorum Zingiberis Anisi

Sem. Erucae Sem. Fraxini ana ʒ vj.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.

Moschi gr. vj.

Mellis optimi despumati ℥. iij.

Radices rusæ coquantur ex melle, & subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili & Pistaciæ rusæ similiter adiiciantur. Postremò etiam reliqua exquisitè trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Alkermes Mesuæ, ex infusione Serici crudi,

& Syrupo Kermesino, cum Ambrâ totâ. Ne cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, di-

midiatam

mediatam tantum ponunt, & Compositionem reddunt minus efficacem; & , ut ita dicam, minus spiritualement. Calor Ambra, inquiunt, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis calent. Ridiculè. Certè interna magis calent, sed calido innato, hoc est, temperato & humido; non acri & sicco. Quid si hac Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrior & siccior est, calore non nocuit, multo minus in nostris, ubi mitior calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens, non qualitate. Ni hac vera sint, astate quam hyeme calida convenientiora; & malè Hippocrates libro De diata idiotarum dixerit, Hyeme parcius & meracius bibendum; astate largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, qua temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti, que hac est.

*Electuarium de Hyacintho, Iouberti,
ad obstructions hepatis & lienis.*

℞. Limaturę Chalybis vstę in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario tritę, sine extinctione, ℥ iiij.

Diarrhodon Abbatis

Aromatici Rosati ana ℥ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ℥ β.

Ex vna parte, additis pulueris Hierę picrę ℥ vj. cū Syrupo de Artemisia fiat massa
Pilu.

Pilularum: ex altera, cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parcissima aqua. Vbi optimè despumatum fuerit, pulueres indantur, & continuè agitentur, ne Chalybs inimuma resideat. Mediocriter cocta, & paulo minùs quàm Saccharum Rosatum, defundantur supra marmor aut chartam; manibus subigantur, aut spatula agitentur; & formentur tabellæ; ne, si immotæ refrixerint, cauè reperiantur.

Restat Electuarium unum, Resumptium dictum, ad restorationem virium, in iis qui diuturno morbo contabuerunt. Sic autem descriptum à Fernelio.

Electuarium Resumptium, Fernelii.

R. Rosarum rubrarum

Glycyrrhizæ ana ʒ ij. gr. v.

Gummi Arabici

Tragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali rubri & albi ana ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Papaueris albi

Portulacæ Lactucæ Scariole ana ʒ iiij.

Quatuor seminum frigidorum maiorum

Sem. Cydoniorum Maluæ Bombacis

Violarum Strobilorum

Pistaciorum recentium

Amygda.

642 FR. DISSALDI

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebesten ana ʒ ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana ʒ j.

Croci gr. v.

Penidiorum ʒ β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo Vi-
laceo. Fiat Electuarium molle.

TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandaal, siue de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rafis { cum Opio
 { sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

Trochisci Andronis.

℞. Cytinorum ʒ x.

Gallarum ʒ j.

Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ʒ β.

Chalcanthi Aluminis scissilis

Misyos Cyprii ana ʒ ij.

Excipiantur passo. Antibalomenon, siue
Succedanem Mysios sit Vitriolum vetustum
ustum.

PILV-

PILVLÆ.

*Iliacæ Rasis, nono ad Almanforem,
capite de Colico dolore.*

℞. Colocynthis & Sagapeni ana ʒ x.
Scammonia ʒ iij. (aliis ʒ iij. & tertiam, ut
sint ʒ iij. ʒ j). Sed certè delendum est [&
tertiam,] & Arculanus Rasis Commenta-
tor non agnoscit.)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissoluendum, colan-
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Piotta-
uens dicta, ubi alius leuioribus Catharticis
surda non respondet, & vi paulo validiore
metastasis in brachia per aluum renocanda.

Indæ Haly, apud Mesuem. In quibus Lapis
Lazuli diligenter lauetur, sed non uratur.

Ex Pulvere Hieræ Pachii, incorporato cum
Syrupo Rosato solutio.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: qua
prima descriptio est apud Siluium, contra
sententiam Iouerti: ut habeas quas des ro-
bustioribus, & minore quantitate.

De Agarico, Mesuæ.

Lucis maiores, Mesuæ.

Ætidæ maiores, Mesuæ.

De Her-

De Hermodactylis maiores, Mesuæ.
De Thymelæa, Mesuæ, *vel potius* De Esula Fernelii; *quarum descriptio sequitur.*

Pilula de Esula, Fernelii.

℞. Corticum Radicum Esulæ minoris, maceratæ horis vigintiquatuor in Aceto Succo Portulacæ, 3 ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta num. xl.

Myrobalanorum citrinorum 3 j. β.

Chamædryos Chamæpityos

Spicæ Nardi Cinnamomi ana 3 ij.

Omnia tenuissimè trita excipiantur vna Tragacanthi Aqua Rosarum soluta & fiat massa. Esula menses octo antè collecta, non recens.

Valdè turbant: sed sunt efficaces in corporibus robustis. Minus exsiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur Syrupo Rosarum solutino, non mucagine Tragacanthi.

Aggregatiuæ Mesuæ; in quibus par quantitas Scammonii, Turbith, & Aloës, scilicet ana 3 vj.

De Hiera, cum Agarico.

Ruffi, seu communes, Melle Rosato comprehensa.

Pilula Scaligeri.

℞. Aloës (bis Succo Endiuicæ, & bis Succo Rosæ)

LIBELLVS MEDICAMENT. 645

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ
 expressione drachmarum sex Rhei electi
 infusi in Aqua Endiuia, cum tertia par-
 te Vini albi, & ʒ β. Spicæ Nardi ʒ ij. β.
 Galangæ ʒ ij.

Ucci Absinthii latifolii inspissati, &
 alis Gemmæ ana ʒ β.

Fiat massa.

*Mercuriales (si quando usus venerit) paran-
 da in modum sequentem, ut sunt apud Re-
 modeum.*

Pilule Mercuriales.

Hydrargyri in Succo Limonum pri-
 mum extincti, & postea in Succo Saluiæ
 nutriti ʒ vj.

loës optimæ ʒ v. Rhabarbari ʒ iij.

Dacrydii ʒ ij. Agarici ʒ j.

Tyracis calamitæ Cinnamomi Macis

antali citrini Salsæ Parillia

assafras Moschi ana ʒ β.

bellis in decocto Guaiaci despumati, &

ad aquæ consumptionem cocti, quod

sufficit. Fiat massa, digitis paucis

Oleo Terebinthinæ imbutis tractanda

aliquamdiu, ac postea vsui reponenda.

Pilule ex Aristolochia, Fernelii.

Radicum Aristolochiæ rotundæ ʒ j.

Radi.

Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iiij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ β.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissimè trita excipiantur
Oleo Amygdalorum dulcium recenti.

Paranda in rem presentem.

De Cynoglossò, Mesuæ, addendo Syrac
ʒ iiij. Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-
runt, humores attenuant, quos incrassat
consilium est; ideoque omittenda. Nostrum
Cynoglossum non est malum veri Cynoglossi
antibalomenon.

AQVÆ DISTILLATÆ.

Tartari	Nymphææ.	Euphragiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ
Sulphuris.	rubri.	Maioranç
Vitæ.	Graminis,	Melissæ
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiviæ	Plantaginis.	Cardui bene-
Acetosæ.	Herniariæ	dicti.
Cichorii.	Buglossi.	Ulmariæ
Violarum.	Boraginis.	Cruciata.
Rosarum.	Tussilaginis.	Aluminosa.
Lactucæ.	Betonice.	Cinnamomi.
Pimpinellæ.	Abinthii	
Portulacæ.	Fœniculi.	

Aqua

Aqua Theriacalis optima.

Rad. Gentianæ Enulæ Campanæ
 Tormentillæ Angelicæ
 Imperatoriæ ana ℥ j.

Cyperus Ireos Florentinæ ana 3 vj.
 Sedoaria

Corticis Citri sicci, & Arantiorum

Cinnamomi Caryophyllorum

Seminis Cardui benedicti

Corymborum Hederæ

Granorum Iuniperi ana 3 β.

Dictamni Scordii Melissæ

Calendulæ ana manip. β.

Macerentur diem integrum super cineres calidos, in vase oris stricti, optimè obstruati, cum Vini albi lib. vj.

Die sequente adde decoctionis Vlmariæ,

Veronica & Nenupharis libras ij. Deinde

bulliant parum, lento igne. Postea fiat

expressio: in qua dissolue & infunde per

octem Theriacæ optimæ ℥ iiij. Ponan-

tur in alembico vitreo, & fiat distillatio

in balneo Mariæ.

Aqua distillata seruetur.

Facultates omnes recreat: qualitates

estilentas & venenatas domat: synco-

pæ, cordis palpitationi, vertigini, lethar-

gicæ, epilepsiæ, apoplexiæ, & paralyfi suc-

currit.

Aquæ

Aqua vitæ aurea, magna & verè Empiricæ compositionis (Thomæ Erasti:) quam nos, rebus non immutatis, in paulo meliorem ordinem rede-
gimus.

Aqua vitæ aurea, Thomæ Erasti.

R. Rosarum ʒ j. β.
Caryophyllatæ Baccarum Juniperi
Florum Lauendulæ ana ʒ j.
Salviæ minoris Origani Bistortæ
Rutæ Radicum Petroselinæ ana ʒ vj.
Betonicæ Rorismarini Maioranæ
Pulegii Bismalvæ Valerianæ
Pimpinellæ Succisæ Menthe crispæ
(an Mentha hortensis ? Certè non errabit qui
eam accipiet)

Menthæ silvestris Verbenæ Keiri
Radicum Leuistici Tormentillæ
Polypodii ana ʒ β.
Absinthii Hyssopi ana ʒ ij.
Magistratæ (hoc est Mei, seu Imperatricis) ʒ i.
Contusa omnia crassiusculè, maceren-
tur in tribus mensuris spiritus Vini (acci-
pe quantitatem sufficientem, ad iam præscriptorum
& sequentium infusionem ritè peragenda) quin-
quies distillati in vase bene obturato, per
dies tres. Postea diligenter distillentur.

Aquæ huic distillatæ infunde

Anisi Glycyrrhizæ
Conseruæ Rosarum ana ʒ i β.

Cin-

Cinnamomi Caryophyllorum Malo-
rum Granatorum (*corticis scilicet*)

Zingiberis albi

Nucis Moschatae Macis

Galangae Calami aromatici

Zedoariae Aristolochiae rotundae

Mechoacae Foliorum Lauri

Seminis Coriandri Cardamomi

Nigellae Romanae Sacchari Candi

Manus Christi Perlatæ ana ʒ ʒ.

Cubebarū Baccarum Lauri excorticatarū

Cumini (*seminis scilicet*)

Rhapontici (*radicis*) Corticis Arantiorū

Theriace ana ʒ ij.

Granorum Paradisi Rhabarbari

Croci ana ʒ j.

Piperis longi Piperis nigri ana ʒ ʒ.

Mellis optimi despumati lib. j.

Contusa omnia crassiore modo in vase
stanneo obturato relinquuntur per dies
decem. Singulis diebus agitentur bene.
Postea distillantur denuò: & huic aquæ
distillatæ adde

Sacchari albissimi, tenuissimè pulue-
rati ʒ j.

Moschi Alexandrini

Ambrae griseæ an. ʒ j.

Caphuræ ʒ ʒ.

Relinquantur ita per triduum aut qua-
triduum. Postea colentur per pannum ra-
rum, & in loco frigido, vase argenteo aut
Ec stanneo

stanneo purissimo (nam vitrea vasa vis aquæ
eximia frangit) vsu referuetur.

Mirè confortat partes principes: Præ-
stantissima ad apoplexiam, epilepsiam,
conuulsionem. Præseruat à peste. Venenis
aduersatur. Syncopæ præsentissimum re-
medium.

Aqua diuina, ad ulcera; Fernelii.

℞. Sublimati optimi (ex Mercurio scilicet)
gr. xij.

Aquæ Plantaginis ℥ vj.

Coque super calidos cineres in phialâ
vitreâ ad dimidias.

OLEA.

Philosophorum
Sulphuris
Terebinthinæ
Ceræ

Tartari
Caryophyllorum
E Nucibus moschatidis
Laurinum Mesuæ.

Oleum contra vermes, præstantissimum.

℞. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiches ℥ ix.

Aloës hepaticæ ℥ xiiij.

Salis communis lb. j.

Contusa omnia per retortam igne len-
to di-

LIBELLVS MEDICAMENT. 651

to diligentissimè distillentur. Exibit primò Aqua, deinde Oleum admirandum.

Guttulâ arteriæ in carpis manuum, & regio vmblici irrigantur. Etiam præstantissimum Balsamum est ad vulnera recen-
tia. *Manavit hoc Oleum ab Italis.*

E Spica Lauendulæ.

Gagatinum.

Keirinum.

Chamæmelinum.

Anethinum.

Liliorum, simplex.

Perforatæ, compositum.

Abfinthii.

Rutaceum, cum Oleo simplici, non omphacino
*contra sententiam Siluii. sic enim ἰπταρσελασος
melius respondebit.*

Castorei simplex, Nicolai Præpositi.

Irinum Mesuæ.

Lumbricorum.

Scorpionum simplex, Mesuæ.

Capparinum compositum.

Mastichinum Mesuæ, apud Ioubertum.

Myrtillorum

E floribus & capitibus vtriusque Papaue-
ris, Oleo infusis.

Vi olatum.

Rosatum { Simplex
Completum
Omphacinum

E e 2

Om.

Omphacinū artificiale, apud Bauderonē.
Cydoniorum, Mesuæ.

CERATA & VNGVENTA.

Santalinum Mesuæ.

Stomachicum Galeni, apud Ioubertum
cum Opio.

Rosatum {
Mesuæ { sine Opio.

Populeum Nicolai.

De Tutia, pro oculis.

Desiccantium rubrum.

Nicolai Præpositi, duplicato Oleo Rosaceo om-
phacino, & omisso Oleo Violato.

Resumptium primæ descriptionis apud
Ioubertum.

Comitissæ.

Album, Rasis, sine additamentis.

Diapompholygos, ex Siluii castigatione.

Citrinum: ubi pro Amentho reponere La-
pidem Amiantum; pro Gersâ Serpenta-
riâ, Cerussam Serpentariam, seu Amy-
lum Serpentariæ, ex Siluii consilio.

Cerussam autem Serpentariam sic parabis:
℞. Radices Ari, initio Veris, antequam folia
mittant, collectas, ablutas, & exteriore corti-
ce mundatas. Contunde in mortario lapideo.
Succus per expressionem extrahatur: linteote-
ctus, sole exsiccet, aquâ Rosaceâ lauetur.

Rur-

LIBELLVS MEDICAMENT.

653

*Rorsus exsicceetur & reponatur. Verum satius est
huius Vnguenti puluerem paratum habere, ut
possit ex tempore Vnguentum confici in usus ne-
cessarios. Inueteratum enim, minus idoneum est.*

Aureum Mesuæ.

Nutritum, seu Triapharmacum simplex,
Mesuæ.

Basilicum, seu Tetrapharmacum minus,
Mesuæ.

Mundificatiuum de Resina, Iouberti.

Martiatum Nicolai, ex censura Iouberti.

De Althæa, Nicolai.

Enulatum { Cum Mercurio.

{ Sine Mercurio.

Ægyptiacum Mesuæ.

De Arthanita maius Mesuæ, vel potius

De Lathyride, Fernelii, cuius descriptio se-
quitur.

Vnguentum de Lathyride, Fernelii.

℞. Succī Lathyridis lib. β.

Succi Esulæ ℥ iiij.

In quibus dissolue

Radicum Cyclaminis ℥ ij.

cammoniæ ℥ β.

Granorum Ricini & Lathyridis expurga-
torum ana ℥ j. β.

mem. Fœniculi Rutæ & Anethi.

Macassarum Lauri ana ℥ j.

Ee 3

Trita

Trita omnia macerentur in succis diem
vnum. Postea Axungia 3 viij Ceræ 3 iiij.
liquefiant : & in his sensim omnia dis-
soluantur, & coquantur igne non acri, do-
nec totus humor absumptus sit, & omnia
in Unguentum coëant.

EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Ioubertum.

De Cerussa, ex æquis partibus Olei Rosacei,

Cerussa, prout emendata est à Iouberto.

Contra rupturam, Nicolai.

Album.

Diachylum { Ireatum, ex Oleo Irino,
Magnum.

Cum Gummis.

De Mucilaginis, Nicolai Præpositi.

Diapalma Galeni, *agitando cum baculo Quercino recenti, pro Palmeo.*

De Meliloto, Mesuæ.

Oxycroceum, Nicolai.

De Ianua, Nicolai.

Apostolicum, Nicolai.

cum Mercurio.

De Ranis,

Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

*Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum
libro quarto de Compos. medicam. general. quo-*

runt

rum sapientule mentionem facimus Commentario nostro in librum Hippocratis De vulneribus capitis, à paucis annis, magno medicina commodo ab Italis in usum reuocata; Emplastrum Isis, & Emplastrum Barbarum.

Isis Emplastrum vide apud Galenum libro 5. medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. & apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. secundum locos, ex Asclepiade, ubi dicitur Isis cephalica. Sic autem descriptum est ab Aëtio.

Emplastrum, Isis cephalica Galeno dictum, ex descriptione Aëtii.

Viride, quod Isis appellatur, à quibusdam Hermoni sacerdoti Isis tribuitur.

Rx. Cerae ℥ xij. β.

Terebinthinae ℥ xxv. (al. xij. β.)

Ammoniaci Aëris vsti

Aristolochiae longae

Squamae Aëris vsti Aëruinis

Turis Salis Ammoniici ana ℥ j.

Myrrhae Aloës

Galbani ana ℥ j. β. [al. ℥ β.]

Aluminis scissilis (vel Aluminis Rochae) ℥ vj.

Olei antiqui ℥ x. Aceti quod sufficit.

Emplastrum hoc Polychrestum est, ad omnia vulnera, præcipuè capitis, cum ossium fractura: Item ad puncturas & aculeos infixos extrahendos: Ad hominum

E e 4

& ca.

& canum morsus, item viperæ, ac scor-
pionis: Ad artuum fracturas cum vulne-
re, quia citius callum obducit: Ad fistu-
las recentes & inueteratas: Ad mamma-
rum & axillarum abscessus, tum ne fiant,
tum ut facti curentur: Ad strumas: Ad si-
stendas oculorum fluxiones, fronti im-
positum: Ad ecchymoses, gangrænas, &
putredines carniū arcendas.

*Hoc Emplastrum, inquit Aëtius, absolute Isis
appellatur (vel Isis Hermonis:) sed aliud est Em-
plastrum Isis, quod Epigono tribuitur; quod etiam
recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque
Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi ra-
dix, per se trita, ac probe trita in pulverem, ma-
ligna ulcera curat. Ad ulcera sordida adhiben-
tur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liqui-
di partes duæ: Ad ulcera verò quæ modica
extersione opus habent, Emplastri pars una, Ce-
rati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Ro-
saceum sic paratur: ℞ Olei Rosacei ℥ xij. Cera
candida ℥ iv. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum
& Emplastrum proportionē dicta liquantur,
miscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu,
ne coloris gratia pereat. Eico Cerati Rosacei po-
test sumi Vnguenti Rosati Mesue tantumdem.*

Ut formetur Emplastrum Isis, Cera, Te-
rebinthina, & Oleum simul liquefiant:
dein addantur Galbanum & Ammonia-
cum, Aceto soluta: atque ad ignem com-
mixtis addantur ceteri pulueres. Vel, me-
tallica

tallica cum Aceto in mortario terito; deinde reliqua trita & cribrata adiccito: liquabilia liquata in mortarium affundito, subigito, vnito; & forma magdaleones.

Ne putes (inquit Galenus) Emplastrum variare, pro varia inscriptione, cum scribet inscribitur $\Gamma\epsilon\gamma\alpha\mu\alpha\lambda\epsilon\omicron\varsigma$, vel $\eta\ \text{H}\epsilon\mu\omicron\varsigma\ \text{I}\epsilon\gamma\gamma\alpha\mu\alpha\lambda\epsilon\omicron\varsigma$, vel $\eta\ \text{E}\pi\gamma\omicron\upsilon\upsilon$. Nam idem est. Certe Epigoni Emplastrum ab Hermonis Emplastro variat sola radice Dracunculi, quam accipit. Itaque male Londinenses eius radice adiectionem tribuunt Fallopio: & male quoque Isim sine Dracunculi radice Isim Epigoni vocant, quum Hermonis sit potius. Addit Galenus, quibusdam putari hoc Emplastrum ex adytis templi Vulcano in Aegypto dicati desumptum. Disces ab eodem Galeno, Epigonum, cui postrema Isidis Emplastri descriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc Emplastro quendam diuitem curasset, fuisse dimissum.

Aliud etiam est Isis Emplastrum apud Galenum lib. 4. Compositionis medicamentorum per genera, $\nu\iota\pi\pi\omicron\upsilon$, hoc est, flauum dictum, cum superius viride dicatur Aëtio.

*Emplastrum Isis, flauum dictum,
Galeno.*

R. Argenti Spumæ 3 c.

Minii Synopici 3 viij.

Diphrygis Ceræ Chalcitidis combustæ ana 3 j. (al. 3 ss.)

E e j

Chal-

Chalcitidis crudæ ʒ ij.

Olei heminas, seu cotylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio efferuescant : postea Aquæ modicum digitis adspargitur : mox Diphryges, Chalcitis tosta, puluerata insperguntur, sub manu aquam instillando, donec non amplius medicamentum inter coquendum strepat. Vbi constiterit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium ex Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continuè mouendo. Tandem in mortarium coniicito, atque subigito. Repone, ac vtere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad vlcera diuturna fluentia, maligna, ac vix curabilia, maximè in tibiis & partibus extremis.

Barbara Emplastra dicuntur Galeno, quæcumque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimum commemorat, quibus uti solitus erat: Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ad minora. Ideò primum Maius dictum, alterum Minus.

*Emplastrum Barbarum Maius,
Galeni.*

℞. Picis lib. viij.

Cera

Cerae lib. vj. \mathfrak{z} viij.
 Resinae Pini lib. v. \mathfrak{z} iiij.
 Bituminis lb. iiij.
 Olei puri lb. j. \mathfrak{z} vj.
 Spumae Argenti Cerussae
 Aeruginis ana \mathfrak{z} ij. β .
 Turis \mathfrak{z} vj.
 Aluminis liquidi \mathfrak{z} j. β .
 Aluminis scissilis \mathfrak{z} iiij.
 Opopanacis Squamae Aëris
 Galbani ana \mathfrak{z} j. β .
 Aloës Opii Myrrhe an. \mathfrak{z} β .
 Terebinthinae \mathfrak{z} xxiiij.
 Succu Mandragorae \mathfrak{z} vj.
 Aceti heminas vj. Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari
 Maioris, est cum viget Mandragora; circa
 mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulueratum, & cribro trans-
 actum, ponatur super chartam. Postea
 Tus, Squamma Aëris, Aloë, & Myrrha
 trita per stamen excutiantur, & seorsim
 seponantur. Squamma autem super mar-
 more accuratè laugetur.

Opopanax & Galbanum, Aceto soluta,
 ita vt parte Aceti combibitâ, lentore suo
 adhuc cohaereant, per linteum exprimantur.

Alumen tum liquidum tum scissile in
 puluerem tenuissimum lauigentur.

His ita preparatis, Pix, Cera, Resina
 E c 6 Pini

Pini ad ignem liquecant : & siquæ sordes sunt , per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro ad consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix, & Cera, ac superignæ non acri commisceantur.

Calentibus adhuc, Bitumen iniicito, & spathula diligenter subigito.

Posthæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accuratè commisceantur. Fiant magdaleones.

Ærugo cum Oleo, Lithargyro & Cerussa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Coctione enim Ærugini coloris gratia augetur potius, quàm minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera cruenta & recentia : ad vlcera antiqua & sinuosa : ad canum & hominum morsus ; & ad podagram incipientem.

*Emplastrum Barbarum Minus,
Galen.*

℞. Picis Resinæ Pini
Resinæ coctæ, Bituminis ana ℥b. j.
Spumæ Argenti ʒ x.
Cerussæ Æruginis, ana ʒvj.
Opopanacis ʒ iij.

Olei

LIBELLVS MEDICAMENT. 661

Olei, tempore hyberno, ʒ ix; æstiuo ʒ vj.

Liquanda liquefiant: & tritis terendis,
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ Maius, sed non
tam efficaciter.]

Quodsi mitius, & magis anodynum
desideras, adde Succi Hyoscyami ʒ ʒ.
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

*Ceterum Pharmacopœi, ad dispensationem &
confectionem Compositionum tum purgantium,
tum alterantium, itemque Unguentorum & Em-
plastrorum, aliorumque magni nominis medica-
mentorum, quæ in Officinis asservari debent, Me-
dicos aduocabunt; ut eos suæ fidei & diligentis te-
stes oculatos habeant, & operis directores.*

FINIS.

INDEX IN VAL. CORDI RECEPTARIUM.

A.		
ABIETINA re-		Amaracus. 144, 255,
gina 535		256, 324, 328, 520.
Abrotonum 113		544.
Abfinthium Ponticu		Amarena cerasa. 181
146, 305.		Ambra. 277, 278
Abfinthium Roma-		Ambra pomum.
num. 146		587
Abfinthium rusticum		Amentum dulce. 335
305		Amomi loco quid 51
Acacia 112, 121, 406.		70, 112, 131, 208,
Acaciz succedanea		246, 259.
112, 118, 121, 368,		Amomum verum.
369, 541.		87, 88.
Acini. 339		Amomum falsum. 87,
Acori loco quid 53,		88, 131, 539.
62.		Amylum. 36.
Acorus. 125, 249, 539.		Anchusa. 296
Acorus verus quid.		Angelica 64, 125.
68, 112.		Anguria 193, 194
Adiantum nigrum. 191		Animalium partium
Adipum preparatio.		delectus, 405, 406
366.		Anthera. 272
Adulteria simplicium		Antiballomena. 456
medicamentorum.		Antimonium, pro Ar-
406, & seqq.		timon. 93.
Aëromeli. 239.		Anthophylli. 22
Aerugo. 333		Aphace. 516
Agaricus Trochisca-		Apium. 537
tus. 267		Apparine. 315
Ageratum. 43		Aqua Cinnamomico-
Agresta. 141		tra epilepsiam. 606
Albatecha. 269		Aqua diuina ad vlce-
Alexiterium contra		ra, Fernelii. 650
pestem. 567		Aqua theriacalis op-
Alleluia. 321		tima. 647
Allium siluestre. 522		Aqua vitæ aurea,
Aloë abluendi mo-		Thomæ Eraſti. 648
duſ cum aromati-		Aquæ marinæ loco
bus. 359		quid. 288
Aloëſ preparatio. 359		Archeutida, ſeu Ar-
Alum, aut Halum. 92		ceuthis 223, 259.
Alypias 96.		Aristoloch. rotunda,
eius loco quid. 95		112, 119, 277.
Alypum. 95		287, 542.
Alzanahan, alcha-		Ariſtol. tenuis. 113,
nach, alzanach,		118, 542
Ichthyocolla. 349		Aromaticum Garyo-
		phyllatum 17
		Aromaticum Roſa-
		tum Gab. 19
		Aromatum Indico-
		rum libellus Gar-
		ciz. 19
		Arthanita 341.
		Artimonium 93.
		Arum 121.
		Aſarum 40.
		Aſpalathi loco quid
		254, 255, 257, 259
		Aſpalathus 254.
		Aſphaltum 103, 541.
		Aſpis 517
		Aſplenium 153, 156.
		289.
		Aurea Alexand. 84.
		Auri & argenti lima-
		tura 23.
		Aurum aut argent.
		foliatum meru 59.
		Aurum coctum 86
		B.
		Bacilli Beehici, vul-
		go Rebecha. 624.
		Balanus Myrepica
		308.
		Balaustium 91, 132.
		Balsami fructus 116
		Balsami loco quid
		84, 163.
		Balsamita. 47, 48, 319
		Balsamum quid ſi-
		gnificet. 87, 263.
		525, 526.
		Bardana 337
		Batega 269
		Baucia 101
		Bedeguar. 162, 203.
		Beben albi & rubri
		succedanea 508
		Benedicta laxativa,
		208
		Biforta 536
		Bitomen Iudaicum
		103, 541.
		Blarta

INDEX.

- Blatta Byzantia. 259
528
Bolus Armena 538
Boraginis succuscla-
rificandus 170.
Borax 335
Branca vrsina 95
Brassica siluest. 95.
Britannica 536.
Buglossa domestica
210.
Buglossa siluestr. 296
Buglossa vulgaris
170
Bulbi sem. loco 98
Bunias 110. 114.
Bupthalmum 321
Burungi 83, 84
C
Achrys. 125
Calamintha cā-
pestris 25
Calamintha dome-
stica 150
Calamintha mōtana
24
Calamintha sil. 151
Calami aromatici
veri loco quid 254.
255, 256, 259, 281
Calamus arom. 249
Calamus odoratus
543
Calamus vnguenta-
rius 259
Camphorata 321
Candelæ pro carun-
culis in meatu
vrinario natis. 595
Candelæ pro suffitu
588.
Capillus Veneris ve-
rus 192
Carabe 278
Cardamomum 20, 21
Carduncellus 320
Carduus benedictus
320
Carneola, aut Cor-
neola. 55.
Carolina 162
Carota 101
Carpesium 540, 541.
Carpobalsami suc-
cedanea 23, 47, 297
540
Carpobalsamus 297
540.
Caryocostinum 602
Caryon myrsicon
298
Carydion 298
Cassia flos 442
Cassia, vel Cassia. 115.
281. fistula. 47. 110.
535. extracta, seu
Flos Cassiæ. 442.
extracta communis
443 extracta sine
fol. Senæ 189. ex-
tracta cū fol. Senæ
190. extracta pro
clysterib. 190. li-
gnea 20. 21. 47.
523. 535.
Cataputia maior 309
Catharticum hydra-
gogum 438.
Catharticum Impe-
riale 221.
Cathengit, seu Ebu-
lus. 341.
Catholicon 198
Catholicum ex infu-
sione puluerum.
Sena & Rheo 631
Caulis agrestis 95
Cauterium poten-
riale 599
Celtica, Spica. 221
Centaurium maius
528, 529 tenue
542
Centumneruia 320
Cere oleum 590
Cerares 517
Ceratum, vide Ce-
rotum.
Cerota vel Cerata
345
Cerotum infrigi-
dans Gal. 345
Rosaceam. 656.
Santalinum 345
Stomachale 346
Cerotum ex Betoni-
ca 596
Diachalciteos, vel
Diapalma 596
pro Herniosis 597
Cerussa serpentaria
vt fiat 653
Ceterach 153. 192
Chalcanthum 538
Chalcitis 112, 113
538
Chalcitidis assatio
538
Chalcu cecaumenæ
356
Chamadrys 53, 54
Chamæmelum 348
Chamæpitys 111
144. 203
Cherua 309
Cheyri 263. 303.
Cholagogum rosa-
tum clemens 434
Chylisma Pilula-
cum. 603
Cicuta 521
Cinnamom. 523, 536
Cinnamomum cras-
sum 27.
tenue 27, 28.
Cinnamum 28, 296
Citri semen 526
Collyrium album,
Galenii 586
Colocynthis præ-
paratio 363
Comæ. 25. 110.
in Compositionibus
quid obseruan-
dum 547, 548.
Condita varia 132,
133.
Confectio cordia-
lis 58
Hamech 447
Hamech ex cēsu-
ra Fernelii 633.
Hamech maior 201
Ha-

I N D E X.		
Mamecha minor 203	loco quid 48. 73. 35. 112. 118.	Diarris Salomonis 36. simplex 36.
Liberans 57	Daucus Creticus quis 48.	Dialacca maior 42
Anacardina 83	Decoctio Clysteris carminatiua 622	Diamarenatum cōp. 182. simpl. 181
Confectiones aro- maticæ. 17.	Decoctio communis Clysterum remol- lientium 622	Diamargaritum ca- lid. 30. frigidū 29
Opiatæ 70. & seq.	Decoctum commu- ne medicinæ, cum & sine Sena 601. 623.	Diambron 180
Conseruarum facie- darum ratio 133	Decoctum pectorale simplex 602. 622	Valerii Cordi. 180
Conseruæ variz 133, 134	Decoctum pectorale compositum, cum Sena. 623	Diamoschum ama- rum. 33. dulce 32
Conserua pro Mo- starda 580.	Decoctum sclopeto- rum. Vide Potio vulneraria 623	Dianisum Mesur. 10.
Consolida maior 92	Denarius 220	Dianthos 29
Conyza 316. 317	Dentalium 335	Diaolibanum 70
Corallium rutilū 91	Diacalaminthos Gal. 25. Mesur. 24	Diapalma 596
Cordumeni, idem quod Cardamo- mum 281	Diacameron 22	Diapapauer 184. 185
Corticū delectus 403	Diacarthamum 213.	Diapenidion 35
Costus 22, 23. 40. 532. hortensis 316	Diacatholicum 198. 443	Diaphœnicon. 204. 441.
Cocula maior 417	Diacasia cum Man- na 188	in forma solida 206.
Crassula 320	Diacastorium 92	Diaprasium 45.
Cremor Peisanæ 579	Diachalcitis 596	Diaprunum comp. laxat. 197
Cremor Tartari 605	Diacinnamomum 27	comp. non laxat. 195.
Crethamus agrostis. 133.	Diacitonium sim- plex 134 & succo cydoniorum 136	Diarrhodon abbatia 41.
Crinon 296.	compositum. 135	Diasarum Fernelii 582
Crispula 321	Diacnicum cum citro 439.	Diasarou aliud Fer- nelii 637.
Crithmum spino- sum. 69.	Diacodium Aduarii 91. cōp. Mesur. 90	Diasatyriion Fernel- lii 639
Crocus Cilicius 110	simpl. Mesur. 89	Diasatyriion Mesur. 99
Coricius 217	solidum 638	Nicolai 98
Croton 309	Diacorum 67	Diascordium Fraca- storii 566
Cubebæ 258	Diacostum 40	Diassebesten 446
Cuminum præpa- ratum quid 26	Diacuminum 26	Diasena 207
Cyanea glycyrrhiza 417.	Diacurcuma maior 44.	Diasinapi 579.
Cyclamen 341	Diadamascenum 196	Diathamaron 21
Cymbalaris 337	Diagalanga 34	Diatragacathum ca- lid. 38
Cyminum Carme- um 232	Diahyssopu 39	frigid. 37
Cyperis 51		Diatrion pipereonis 49
Cyperus rotundus & longus 50. 51		Diatrion satalon 49
Cyphi trochisci 120		Diaturbith cum rha- barb. 212
		minus 213

312-

INDEX.

- maius 213.
 Diaxyloaloës 50
 Diatingiber 52
 Diaminus Creticus 110. 533
 Diaminus vulgaris 252
 Dielleboru Fernelii 637.
 Diploma 280
 Diosis Sacchari ad conseruas 134
 Diosis Specierum ad libram vnam sacchari in confect. solidis 17
 Diosis Specierum ad libram vnam mel- lis 71.
 Diosmeli 239.
 Dulcis radix. 92
 E.
 Elaterium 235
 Elect. Caryoco- stinum 602
 contra vermes 638
 De baccis Lauri. 27
 De Hyacintho Iou- berti. 640.
 De limatura Cha- lybis 568
 aliter 569
 De ouo, Maximil. Imp. 567
 De pomo Citrio 581
 Diascordium 566
 Diapzonias 65
 Ducis 52
 Elefchof 209
 Episcop. 209
 Laticiz Gal. 59.
 de Gemmis 34
 Indum 442
 Indum maius 199.
 Indum minus 200
 Iustinum 56
 Lactificans Rasis 60.
 Lenitiuū 191. 446
 Lenitiuum de Ma- 192
 Opticum 569
 contra Pestem 565.
 Plurifarcoticum 61
 de Psyllio 209
 Purgans, de Po- mo Citrio 581.
 Resumptiuum 66
 Resumptiuum Fer- neli 641
 Rosatū Mesuz 211
 de succo Rosarum 211 in forma so- lida 212
 de Sebeke 193.
 Elelisphacon 25. 312
 Ellebori nigri extra- ctio. 374.
 Elops 517
 Emplastra 346, 347.
 & seqq.
 Emplastrum ad cal- los pedum 608
 ad hydropem. 608
 album coctum 356
 Apostolicon 353
 Apostolicon aliud 355
 de Baccis Lauri 358
 Barbarum Maius, Galeni. 658
 Barbarum minus, Galeni. 660
 Basilicon magnum 357
 de Cerussa 654
 de Crusta panis 358
 de Lapide Calami- nari. 357
 Diachylon comp. 347.
 Diachylon ma- gnum 348
 Diachylon paruum 349
 Diachylon simpl. 346
 Griseum 357
 Ibis cephalica, di- ctum 655
 Ibis flauum dictum Galeno 657
 de Meliloto 350.
 de Mucilag. 347.
 Oxycroceum 352
 de Ranis 598
 è pelle arietina, ad hernias 608
 ad tophos. 598
 Triapharmacū 352
 E Viride 357
 Endiuia vera 352
 Entalium 334
 Epatis lupini præpa- ratio 366
 Epitaphium Valerii Cordi 397.
 Erucæ semen 83, 84
 Eruum verum quid. 516
 Esbrium 324.
 Eldræ Antidotus Aquarii 138
 Antidotus Aëtii. 128.
 Esulæ præparatio 364
 Eupatorii, eiusque succi succedaneum 43. 162.
 Eupatorium 43. 130.
 Extractions purgan- tium medicament. artificiosæ 373, 374
 & seqq.
 Extractum melanz- gogum, sangui- nem defecās. 436
 F.
 Felix 343
 Fisticum seu Phi- sticum 101.
 Flores Casie fistulæ solutiue 187. 447
 Florum delectus 402
 Flos æris 315
 Fœniculus porcinus 48. 64.
 Folia Garyophyllo- rum. 207
 Folii succedaneum 17, 18. 50. 61. 66.
 126, 127, 128. 162.
 255.
 Fo-

I N D E X.		
F olium 118, 119.	Iudaica. 320	arthritica 3
Indum 112	Sandæ Mariæ 320.	moschata 20
Malobathri 113, 120	325	Iulep Rosatum 11
Forax quomodo fa- cienda 385	Moschata 321.	Violarum 21
Fraxinella 252	Paralysis 134, 320.	Iuncus Arabicus 1
Fructus Balsami 116.	Turchia 320.	odoratus, 128. 1
Fructuum delectus 403.	Venti 324	534.
G Alanga magna	Herbarum delectus 401.	Iuniperus magna 28
17. rufa. 17.	Hermela vel Harna- la 249.	L Ac Virgineus 6
Galbanum 528	Hiera Pachii 219.	V Veckeri 6
Gallæ cupressi 272.	Aromatica 454.	Laccæ ablutio. 30
Gallion, 127. 319.	picra composita 216	Lachryma Terebi- thi 11
320, 325	picra cum Agari- co 215	Lachrymarum del- ctus 40
Gemma Populi 307	picra simpl. 215	Lapathiolum 31
Gentianæ radix 117.	picra Rasis ad pi- lulas cochias. 231	Lapis Armeus 20
Gerfa serpētaria 335	Hieralogedum 217	cancrorum 27
Gerfani facienti mo- dus 364.	Hippocras, seu Potus Hippocraticus. 573	philosophorum 600.
Glandes sine suppos. 224.	Holippæ purgantes 582.	Lapis septicus 599
Glans vnguentaria. 308, 309.	Hydragogum maius, Fernelii 635.	Lappa maior 33
Gleba Armena 538	Hydragogum minus, Fernelii. 635.	Lassulata 320
Gluten Alchanach, alzanahā, alzanach 349.	Hydromel simpl. 576	Lauendula 310
Glycyrrhiza 18	Compositum 576	Laureola, 317
Glycyrrhiza cyanea, 117.	Purgans 577	eius præparatio 63
Glycyrrhizæ succus 524	Hyoscyamus Anti- dotis additur. 521.	Laurus & Laurinum oleum 525, 526
Gnaphalium 542	Hypocistis 90. 537	Lemnia terra. 538
Grana Solis 208, 228	Hyssopus humida 342	Lenitiua à Cassia. 44
Granum Ben 308, 309	Iarus 316	Lenitiua, & Solutiu 187
Gratiola. 43. 230.	Iasme 303	Lepidium maius 235
Gummī splendidum. 117, 118.	Iasmini flos 303	Lepis chalcu 356
Arabicum. 112. 118	Indicorum aroma- tum libellus Gar- ciz 19	Leucopiper 28
vermiculatum 112	Imperatoria 64	Libanotidis species 125
H alus, aut Halum, siue Alum 92.	Infusio Rosarum 147	Libanum 353
Hedychroon magna 520.	Violarum 148	Libra medicinalis 17
Helenium 296.	Interpretes bonos, etiā rerum peritos oportet esse, non solū Latinè, aut Græcè doctos. 542	Lichen 192
Hepatis lupini præ- paratio 366	Iris Illyrica 77. 523	Ligustrum 302
Hepatica 192.	Iua 111. 144. 203.	Limatura auri, argen- ti 23.
Heptaphyllon 530, 531.		Limaturæ ferri præ- paratio 361, 362
Herba crassula 320		Lingua auis 80. 100.
		cervina 157. 325.
		Lithontribon 62.
		Lohoch 182 & seqq.
		Lohoch ad asthma 186
		è Caulibus 576
		de Pa-

INDEX.

de Papauere 184.
de Pino 183
de pulmone Vul-
pis 186
fanum & expert.
182

de Scilla 185
Luph planum 100
Luph crispum 100

M Abathematicum 95

Macedonicum 54.63.

Macropiper 182

Magna Hedychroum 117. 520

Maiorana 254. 324.

Malabathrum, vel
Malobathrum 111.
537.

Malobathri folium 115

Succedaneum 111.
117. 256. 257.

Malua terræ 220

Mamerzlocoquid 132

Mandragora 521

Mandragoræ poma-
rum succi paucuria
quid 284

foliorum locoquid
337.

Manna Orientalis 239

Manus Christi perla-
ta 38

Marathrum 325.

Marum 254. 521. 545

Mari locoquid 254
256. 520

Matricaria 324.

Mastiche 21. 535.

Maturella 321.

Medulla Ceraforum 181.

Medulla prunorum 194.

Medulla prunorum
acerof. 194.

Medullarum præpa-
ratio 367

Mei locoquid 62. 117

Mel Anacardium 176

Emblisorum 176.

176.

Odoratum aroma-
ticum Dantisca-
num 150. 151

Rosatum 173

Rosatum aliud ef-
ficacius. 173

passularum 176

Tabarzer. 184.

Melanagogum extra-
ctum 438.

Melanopiper 182.

Mellis Attici loco
quid 124

Melon Magnus In-
dus 269

Mentha aquatica 293

crispa 323.

Græca 326

Romana 326

Saracenicæ 320. 326

Menthastrum. 269

Men 64. 86.

Men loco quid 71.
86. 111.

Meum 48. 64. 86.

Mezerei præparatio.
364.

Michleta 96.

Milium Solis 208. 228

Mira solis, aut Mira
Sole. 109.

Mithridates Rex. 114.

Mithridatium 54.

Andromachi 126.

Damocratis 119

ex Cleopatra &
Antipatro 122

Mina cytoniorum
arom. 172

Cytoniorum simp.
172

Morselli laxatiui 607

Moschocaryon 298

Moschus 18. 20. 521.

Mostarda seu Diasina-
pi 579

Mucharus 148

Muria 228.

Musa Enea, siue
Egetea, vel Zaze-
aca. 71

Murus sapor 149. 170

Myrob. nigri 232. 235

Myrrha 527.

Troglodytica 110.

Myrtha 325. 328

Myrtus 292. 328.

N N. 178

Napus 86. 101.

110. 522.

Narcissus 540.

Nardi Indicæ loco
quid 125

Nardus Celtica 77.
120. 121. 537

Galarica 115

Indica 125. 127. 536

Nardus quid 56. 65

Nasalia 223

Nasturtium album.
232.

Nenuphar. 30. 166.

Nepita, vel Nepeta.
531.

Neremisch 61.

Nerion 131.

Nigra spinæ 118

Nihil album 338

Notæ ponderum 372

Nucleus seminum
quid 30

Nux Indica moscha-
ta 298

Myristica 53

Voguentaria 298

Nymphæa, alba &
lutea. 30. 167

O Bolus 125 eius
nota. 125

Oculi cæcorum 278

Ocimum citratum 33.

Oesypus. 347. 349.

Oesypum faciendi
modus 367

Oleander 131

Olea 279.

Oleorum natura &
vires 380

Oleorum distillatio
artificiosa 377. 378
& seqq.

Oleum Absinthii 305

Amyg-

Amygd. amar. 308	INDEX.	
Amygd. dulciū 308	Populinum aliud. 232	
Anethinum 300.	307	
Balaninum 308	Ranarum 588	Oxymel comp. 312
Balsami 589.	Rosaceum 305	simp.
de Cappare 289.	Rosarum comple-	Elleboratum
Castorei 285	tum & ompha-	Scillit. comp.
Cerz 590	cinum 605, 606	Scillit. simpl.
Chamæmelinū 301	Rutæ 299	Oxyfaccaracōp.
de Cherua 309	Sambucinum 302	simp.
Cheyrium 303	Sampfuchinū 292	P.
contravermes 588	Scorpionum comp. 287	PAEONIA
aliud. 650	Scorpionum simpl. 286.	Palma Christi
Costinum 281	Sesaminum 311	Pancratium
Cytioniorum 291	Spicæ 310	Panis porcinus 3
de Euphorbio 285.	Tartari 290	Papauer rubrum 3
Formicarum 287	Terebinthinæ 290	Paralyfis herba 3
Hyoscyami 310	contraVermes 588	Parietaria 191. 3
Hyperici 293	aliud 650	Passulæ laxatiuæ 5
Iasininum 302, 303	Violaceum 306	purgantes cum R
Irinum 294. aliud 295.	Vitellorum ouo- rum 293	barbaro 6
ex Iuniperi baccis 280	Vitrioli 381	Pastilli Scillitici 5
ex Iuniperi ligno 279.	Vulpinum 288	Theriaci 101. 51
de Lateribus 289	Zanetinum 591	517, 518.
Laurinum 311, 525	Olusatrum 25, 54, 56 63	Pastinaca marina 6
Ligustrinum 302.	Omphacinum Ole- um 292	Pelecini pænuria
Lilinum 301	Omphacium 141	quid 12
Lumbricorum terr. 288.	Onyx 259, 278	Pentaphyllon 53
Mandragorz 283.	Opis 518.	Perficaria 32
Mastichinum 284.	Opium 521.	Periclymenum 32
Menthæ 304.	Opium in oleo dis- solui nō potest 284	Perfici flor. & fo
Moschelinum 297	Opobalsamum succe- daneum, Euritii Cordi 312	vapor & destilla
Myrrillorum 303	Opobalsam. succeda- neum 23, 45, 63, 94, 102, 110, 119, 254, 324	aqua aluū soluū 188
Myrrinum 304.	Opobalsam. 87, 525	Petroleum clarum
Narcissinum 301	Orchis 100, 101	sanum 31. 90
Nardinum cōp. 281	Origanum Creticum 78.	nigr. & crassum 312
Nardinū simpl. 280	232 Orientale	Petrofelinum 53
Nenupharis albi 306.	Origanum Persicum 78, 232. eius loco quid 78, 232	Agreste 47
Citrini 306		Macedonicum 25, 54
ex Nymphæa ci- trina 306		Pharmacopœus qua- lis esse debeat 10, 11
Nymphæatum al- bum 306		Pharmacorum parād- tempus 423
Omphacinum 292.		Philonium ex Gal. & Aegin. 74
Papaueris 340		maius, siue Roma- num 72
de Piperibus 282		Mesuar 73
Populinum 307		Persicum 75
		Phisticum 52, 101.
		Phu. 86, 117, 321, 540
		Phyllitis 157
		Phyllon. 130.
		Pilul.

I N D E X.

luis 214 & seqq.	Myrob.	248	Prunus siluest.	330.	
le Agarico.	218	de Rhabarbaro	143	Pseudodictamnus	
aggregatiuz	230	Rufi	244	252	
elephantinz.	224	de Serapino	249	Prifanz cremor	579
elephag. Val. Cor-		de Sarcocolla	244	Pulegium	533
di.	251	de Tribus, seu Rufi	244	ceruinum	269
le Aloë & Maſti-				Pulicaria	316, 317
che	242	ex Aristolochia,		Pulmonis Vulpini	
le Aloë lota	243	Fernelii	645.	preparatio	366
Arabicæ	227	Sanctæ, Italorum	603	Pulpa Caſiz fiſtulæ	
Arthriticæ	227	Scaligeri.	644.	ſolut. 187, 188, 189	
Affaieret	226	Sine quibus	244.	Ceraſorum	182
Auræ.	229.	Stomachicæ Al-		Prunorum	194
le Bdellio	250.	kindi	245	Sem. Aſparagi &	
Bechicæ	250	Stomachicæ Meſuz	246	Ruſci	208, 212
Benedictæ	231.			Thamarindorū	189
Cochiz Rhafis.	231	Pillularum maſſæ ex-		Pulvis ad Epithema-	
le Colocynthide.	232.	traſt.	376	ta cordis	69
le Cynogloſſa	250	Pimpinella Germa-		ad Epithemata he-	
le Eſula, Fernelii.	644.	nica	320, 325	patis	70
le Eupatorio.	233.	Pimpinella Italica	324, 325	ad Glandes vel	
le Euphorbio.	233	Pinguetinum præpa-		Suppositoria	224
foetidæ maiores	234.	ratio	366	Pulvis aut Tragea	
foetidæ Rhafis	234	Piper album	521, 532	laxat.	222
le Fumo terræ.	235	nigrum	25, 109, 521	medicaminis Tur-	
le Hermodactylis.	236.	longum	533	bith.	222
le Hieræ comp.	237	Piſtacium	52, 101.	Senæ præparatæ	222
le Hieræ cum Aga-		Plantago maior	320	Sernutatorius	223
co	238	Plumbi præparatio	361	Pulvis Epilepticus	
le Hieræ ſimplex.	237	polium mōtanum	110	570	
liacæ	584. & 643	polytrichon	320	pro Gutturis vlce-	
imperiales	246	pompholyx	338	ribus	572
indæ	236.	Pomum Ambræ	587	contra Hydropem.	
le lapide Armenio	239	Ponderum ratio	369	Eraſti	583.
le lapide Lazuli.	238	Potio vulneraria ſeu		ad Partum, Helidei	
lucis maiores	240.	Decodum Sclope-		570	
lucis minores	241	tarium	623	contra Scabiē	572
maſtichinz	241	Potus Hippocrati-		contra Vermes	583
mercuriales	645	cus	578	Violarum odora-	
le Mezereo.	239	Præparationes quo-		tus	572
le Nitro	584	rumdam ſimpl.	359	Punicæ ſilueſt. floſ	91
le Oſto rebus	248	& ſeqq.		132.	
le Opopanace	247	Præſium viride	356	Purpureus color, pro	
reſtilentiales	244	Primula veris	134.	intensè ſplendido.	
le Quinquæ gen.		Propolis	354	541, 542.	
		Prunorum ſilueſt. va-		Q Vid pro quo	456
		por & aqua deſtill.		& ſeqq.	
		alium ſoluunt	182	R Adicum delectus	
				398	
				Radix concava	276
				Ramich	90
				Rapæ ſemen	523
				Raued	

I N D E X.		
Raued 265.	Salpetre 335	Creticum 42.62.6
Raued Seni. 162.230.	Salvia Romana 326	80. 117
233.240.255.	Sampfuchus 254.281	tenue 111
Rebecha. Vide Bac-	Sanguisorba. 320	Seta cruda 3
cilli Bechici. 624	Sanguinis Hircini	Sextarius. 90.32
Requies Nicolai 76	preparatio 366	olei. 29
Resina Abietina 535	Santalū Machoziri. 17	Sicilicus 92. eius no
Terebinthina 535	Moschatellinum. 29	ta 91
Rhabarbarum 529	Sapa. 165.229.	Sief album 526
Ponticum 528.529	Sapphirilocoquid. 58	Sigilli Lemnii loc
Rha siue Rheu Pon-	Sapphirus 55.	quid. 102.111
tici pœnuria quid	Sarda, gemma 55	Sigillum Lemniū 11
sumi possit 22.129	Satyrion. 98.100.101	Siler montanum 25
255.	Saxifragia 47.56.145	111.
Rhabarb. extract. 375	221.325.326.	Simpl. absolutē scri
Rha Ponticum ve-	Scammonex præpa-	ptum quid deno
rum 88.110. 113.	ratio 362.	tet 414 & seqq.
Rheoponticum 22	Scariola 42. 49. 166.	Simplicium delectu
255.328.	Scatuncellum 337.	398
Rhodostagma 263	Schœnanthum 40.43	Simpl. Adulteria 40
Rhusculinarium, ob-	102.534.	Simplicium legen
soniorum 92.130.	Schœnon 119. 124.	dorum tempus 42
Ricinus 309	256.258.	Sinapi album 81.8.
Rob 179. 180. 181.	Scilla, & Pastilli scil-	Sinnus. 8
Rob de Berberiscōp.	litici 515	Sinon. 8
179	Scillæmuccilagoquo-	Sinonum 47. 87. 88
de Berberis simp.	modo colligēda 186	Sirupi. seu Syrup
179.	Scillæ præparatio 363	137. & seqq.
Ceraforum 181.	Scincus 98	de Absinthio maio
Nucum 180	Scolopendria 157.	145
de Ribes comp. 179	192.289.325.	Acetositis Citri
de Ribes simp. 179	Scolopendria. 261.	139.
Rosa afinina 61	Scordion 109. 512	Acetositis Limo.
Rosa Hierichōtis 539	Scoria ferri 79	num 140
Rosata nonella 65	Scoriæ ferri præpa-	Acetosus cōp. 138.
Rosmarinus 125	ratio 361	Acetosus simp. 138
Rubricæ Lemniæ lo-	Secacul 67.68.69.80	de Agresta 141
co quid 123	Seitaragi Indum 81.	Althææ Fernelii
Rubus Idæus 181	235.	572
Ruscus 208.	Selinon 531.	Aranciorum aceto-
S.	Semen rosarum. 272	forum 140
Sacchari libra in	Seminū delectus 402	de Artemisia 144.
Scōfessionibus quā-	Semperuiua minor	de Artemisia, Fer-
tum specierum re-	357.	nelii 628
quirat 17	Sericum crudum 34	Augustini Niphi
Saccharum Tabarzet	Seris. 129.	574
27.211.	Serpentes 517	Byzantinus comp.
Sagapenum 97. 112	Serpentaria. 100.316	142
Sal Hammoniacū 94	Serpentariæ locoquid	de Byzantiis simp.
Salis Indi loco quid	364	143.
236.239	Sesamum. 311	de Calamintha 150
Salinca. 23. 77. 85.	Seseli. 25. 86. 111.	de Cichorio cum
		Rha-

habarb. 153, 154	I N D E X.	Succed. Lobelii 466
e Cichorio Nicol.	simplex 151	& seqq.
Florentini 154	de Succo Endiuiz	Suchaha 163
e Cichorio, Val.	comp. 152	Succinum 252, 278
Cordi 177	de Succo Fumiter-	Succorum delecta. 403
e corticibus mali	rz maior 148	Succus Borag. 169.
Citrii. 626	de Succo Myrtillo-	& Buglossa. 170
dinarii 142	rum 168	Eupatorii. 43. 230
e Duabus radici-	de Succo Viola-	Scilla. 349. 348
bis 137	rum 159	Violarum 159
e Endiuiz comp. 152	de Testudinibus,	Samach 92
e Epithymo. 164.	seu Diachelonon	Suppositoria, seu
e Eupatorio. 162	629.	Glandes 224
e Fumaria maior.	e Rosis siccis 572	Symph. petrum 92
148	Granatorum aceto-	Synodontes lap. 272
e Glycyrrhiza 160	forum 142	Syrupi. vide Syrupi.
e Hyssopo 161	dulcium. 142	
e Hedera terre-	In fusione Ros-	
stri, siue Pulmo-	rum 146	
monarius 606	Infusionis Viola-	
e Iuinibis 158	rum. 146	
e Lupulo 170	Myrtinus comp. 168	
e Melissa, Fernellii	Refectiuus, Cordi	
573	177	
e Methamajor 149	Violarum comp. 158	
e Mentha minor	Sifer 68	
150	Sifimbriū vid. Sifym.	
e Nymphaea 165	Sifon 87, 88, 131.	
e Papauere comp.	Sifra 64	
167	Sifymbrium. 51. 292.	
e Papauere simp.	Smaragdilo loco quid 57	
167	Smaragdus 55	
e Polypodio 575	Solanum 338	
e Pomis 141	Sorba. 339	
e Prassio 160	Spargula 319, 320	
e Pyris Val. Cordi	vera 323	
176	Species ad supposi-	
e Quinque radi-	toria 224	
cibus 137	Spica Celtica 77-79.	
e Scolopendrio	102. Lauedula 310	
575	Romana. 77-85. 121	
e Stoechade comp.	Spina nigra vel cr-	
163.	rulea 118	
e Stoechade simp.	Spodii loco quid 67	
163 Fernellii 627	69. 262 272.	
e Succo Acetosa	Spodii preparat. 365	
169	Spodium 264.	
e Succo Borag-	Squamatis 354, 355	
inis 169	Stache 526. 525	
e Succo Buglossa	Styrax, seu Storax	
170.	111. 115. 284.	
e Succo Endiuiz	rubea. 94. 266.	
	Succedanea 456.	

T.

T amariscus 76
Terebinthinā co-
quendi modus 368
Terebinthus & Resi-
na Tereb. 534, 535.
Terebinthi loco
quid 362. 468.
Terra vel Rubrica
Lemnia 112. 538
Sigillata 521. 538
Terræ Cimoliz loco
quid 131
sigillata loco quid
57, 58. 75. 112.
Testiculi vulpis, her-
ba. 100, 101
Tetrahit 320
Thamar 22
Thereniabin, vel Te-
reniabin. 239. 246.
262. 271.
Theriaca 101 & seq.
512.
eius descriptiones
variz 512. præpa-
ratio. 553
vide dicta 514
CUR γαλβαν
514
eius vires, quando
recens danda, quā-
do antiqua, qua
dos 515. 559. & seq.

The-

Theriaca Londinensium 563, 564
 Theriacæ Mospeliensis formula 545
 Theriaces præparatio, ex Lobelio, 562
 Theriaca Rusticorum 522
 Theriaca Andr. 101.
 Andr. senioris. 114
 R Diatesaron. 118
 Theriaca pauper. 565
Onciæ. 13. 517
 Thlaspi 11. 332, 536.
 Thymbra. 26. 39.
 Thymiana. 94. 267
 Hammoniacum 131
 Thus, vide Tus
 Tirus 253
 Tormentilla 530, 531
 Tragea laxat. 22
 Tribulus aquatic. 314
 Trifolium acetos. 322
 Trochisci. 253, & seq.
 Trochisci de Absinthio. 273
 de Agarico. 267
 Alhandal 273
 Alkekengi. 269
 Alindaracaron 117
 Alistæ mosch. 266
 Andronis 642
 Bechii albi 274
 Bechii nigri 275
 de Berberis. 265
 de Camphora 270
 de Cappare 261
 de Charabe 268
 de Corallo 520, 521
 Cyphi 257
 Diaui 263
 Diaion 263
 Diarrhodon 264
 de Eupatorio 262
 Gallie moschatæ 266
 Hedychroi 253, 255, 256, 257.
 de Lacca 264
 de Lacca, Valerii Cordi 276

I N D E X.

de Myrrha 268
 Ramich 259
 de Rhabarb. 265
 de Rosis 270
 De Rosis simp. 585
 Scillitici 253
 de Spodio 272
 de Succino, Valerii Cordi 277
 de terra sigill. 271
 Theriaci 109
 de Tiro 253
 de Violis purg. 585
 de Viperis 253
 de Minio, corro-
 dentes 605
 Tryphera magna 77
 minor 78
 Persica 81
 Saracenica 79
 Trypherarum differ-
 rentiæ 449, 450.
 Tus albi aut flauu 71
 masculum 72
 Tusilago 166
Valeriana 321, 540
 Valerii Cordi
 epitaphium 197
 Vas duplex 280
 Venter Mergi 131
 Vermicularis 337, 336
 Vesicaria 153
 Vicia 516
 Vini Falerni loco
 quid 462
 Viperæ 587, 518
 Viola 190, 263
 Violaria 190
 Viperæ 109, 253, 513
 Vitriol. 381 & seq.
 Vlmus 348
 Umbilicus marinus
 278, 335
 Veneris 337
 Vaguenta 313 & seq.
 Vnguent. Aegyptia-
 cum 333
 Agrippæ regis 313
 Alabastrinum 592
 Album 331
 Album caphur. 344
 Anodynum 595

Apostolorum
 Aregon
 de Arthanita
 ius 3
 de Arthanita
 nus 3
 Aureum 3
 ad Carunculas
 pene 5
 Citrinum 3
 Comitissæ 3
 De Lathyride, Fe-
 nelii. 6
 Dialthæa cōp. 3
 Dialthæa simp. 3
 Diapomphol. 3
 Fuscum 3
 Martiatum 3
 Martiatum
 gum 3
 Martiatum paruum
 328
 Nicotianum 59
 Pectorale 3
 Pediculorum 5
 Populeum 3
 Potabile 34
 Rosat. Mesuræ 34
 Rubeum caphur-
 rum 34
 ex Succis Arati
 de Tabaco 59
 Vngula caballina 16
 Vomitiuum mitium
 Fernelii 542, & 63
 Vomitiuum validum
 Fernelii 63
 Vua Lupina 33
Xylaloës 4
 Xylobalsamum
 543, 544.
 Xylobalsami loco
 quid 59. 62. 544
 Xylocasia 21, 23
 Xylocinnamomi loco
 quid 29
Zambach 59
 Zarnabum lon-
 gum, & rotund. 31
 Zedoaria 31. 55. 75.
 312. 544.
 Zuzumbeth. 55. 311

F I N I S.

